



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.


Nous vous demandons également de:


- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>








H616.08

J25m

L



J25m
L



NOTICE AVOIR
MÉDECINE HOMÉOPATHIQUE

PARIS

MATHEU DE WATTELLÉ, ÉDITEUR

PARIS, 1870, 24000

TOME PREMIER

A PARIS

chez M. DE WATTELLÉ

ÉDITEUR, 10, RUE DE LA HARPE, 10
PARIS

TABLE DES MATIÈRES.

XV

265	Ligament annulaire postérieur ou dorsal du carpe
ib.	Aponévrose dorsale du métacarpe
ib.	Ligament annulaire antérieur du carpe
ib.	Aponévrose palmaire
266	Quinze tendineuses des doigts
268	Muscles de la main
ib.	Lombriques
ib.	Muscles de l'éminence thenar
270	Court abducteur du ponce, 270. — Opposant, 271. — Court fléchisseur du ponce, 271. — adducteur du ponce
273	Muscles de l'éminence hypothénar
ib.	Palmaire cutané, 273. — Adducteur du petit doigt, 273. — Court fléchisseur du petit doigt, 274. — (Opposant du petit doigt
274	Muscles, interosseux
ib.	1° Interosseux dorsaux
275	2° Interosseux palmaires
276	Aponévroses interosseuses
277	Muscles de la région fessière
278	Grand fessier, 278. — Moyen fessier, 279. — Petit fessier, 281. — Pyramidal, 282. — Obturateur interne, 282. — Carré crural
284	Jumeau inférieur, 283. — Jumeau supérieur, 283. —
ib.	Muscles de la région ano-coccygienne
286	Ischio-coccygien, 284. — Relèveur de l'anus, 285. — Sphincter externe de l'anus
287	Muscles de la région génito-urinaire
ib.	1° Chez l'homme
289	Ischio-caverneux, 287. — Bulbo-caverneux, 288. — Transverse, 289. —
ib.	Ischio-urétral, 291. — Muscle de Wilson
291	2° Chez la femme
293	Ischio-caverneux, 293. — Consilicteur du vagin, 293. — Transverse, 293. — Ischio-bulbaire
2	Aponévroses du bassin
294	Aponévroses pelviennes
ib.	Aponévroses péritonéales
296	Muscles de la région crurale postérieure
298	Biceps crural, 298. — Demi-tendineux, 299. — Demi-membraneux
301	Muscles de la région crurale externe
ib.	Tenseur du fascia lata
ib.	Muscles de la région crurale antérieure
302	Coulier
303	Triceps crural
304	1° Longue portion du triceps crural, ou droit antérieur
305	2° Portion externe, ou vaste externe
306	3° Portion interne, ou vaste interne
307	Muscles de la région crurale interne
309	Droit interne, 307. — Pectiné, 308. — Premier ou moyen adducteur, 309. Deuxième ou petit adducteur, 309. — Troisième ou grand adducteur, 310. — Obturateur externe
310	Aponévrose crurale
312	Muscles de la région jambière antérieure
313	

W M

NOUVEAU MANUEL

DE

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE



II

CET OUVRAGE SE TROUVE AUSSI CHEZ LES LIBRAIRES SUIVANTS :

AGEN,	chez BERTRAND, CHAIROU ET C ^o .
BORDEAUX,	— CHAUMAS, CH. LAWALLE.
BRUXELLES,	— J. B. TIRCHER.
FLORENCE,	— PIATTI, RICORDI ET JOUHAUD.
GÈNES,	— A. BEUF.
GENÈVE,	— A. CHERBULIEZ.
LIÈGE,	— J. DESOER.
LEIPZIG,	— L. MICHELSEN, BROCKHAUS ET AVENARIUS.
LISBONNE,	— ROLLAND ET SEMIOND.
LYON,	— CH. SAVY.
MADRID,	— C. BAILLY-BAILLIÈRE.
MARSEILLE,	— V ^e CAMOIN, L. CHAIX.
MILAN,	— DUMOLARD FRÈRES.
MONTPELLIER,	— SEVALLE.
MOSCOU,	— GAUTHIER, CH. URBAIN, RENAUD.
NAPLES,	— GUETANO NOBILE.
NEW-YORK,	— W. RADDE.
ODESSA,	— SAURON.
PÉTERSBOURG,	— BELLIZARD ET C ^o ., HAUER ET C ^o ., J. ISSAKOF.
ROME,	— P. MERLE.
TOULON,	— MONGE ET VILLAMUS.
TURIN,	— J. BOCCA, TOSCANELLI, SCHIEPATTI.

L'auteur, désirant donner à son ouvrage toute la perfection possible, recevra avec reconnaissance tous les renseignements qu'on voudra bien lui communiquer. S'adresser, FRANC DE PORT, à M. le docteur G. H. G. JAHR, rue de la Bienfaisance, n^o 45, à Paris.

NOUVEAU MANUEL
DE
MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

Première Partie

MANUEL DE MATIÈRE MÉDICALE

OU

**RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX EFFETS DES MÉDICAMENTS HOMŒOPATHIQUES
AVEC INDICATION DES OBSERVATIONS CLINIQUES**

Par le Docteur G. H. G. JAHR

CINQUIÈME ÉDITION, REVUE, ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

TOME SECOND

A PARIS

CHEZ J. B. BAILLIÈRE


LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RUE HAUTEFEUILLE, 21, CI-DEVANT RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, 17

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET

A MADRID, CHEZ C. BAILLY-BAILLIÈRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11

1850



MANUEL

DE

MATIÈRE MÉDICALE HOMŒOPATHIQUE.

127. — LACHESIS.


LACH. — Le venin dentaire du Trigonocéphale à losanges. — HERING. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : Plusieurs semaines dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES : Alum. ars. bell. caps. cham. chin. cocc. hep. merc. natr-m. nitr. n-mos. n-vom. phos-ac. rhus. samb. veratr. — *Contre les suites de la morsure* : Ars. bell. caps. natr-m. samb.

COMPARER AVEC : Alum. ars. bell. bry. caps. carb-v. caus. cham. cocc. con. dulc. hep. hyos. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. n-mos. n-vom. phos-ac. puls. rhus. samb. selen. sulf. veratr. — C'est surtout après : Ars. con. hep. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. que le lachesis fait du bien, lorsqu'il est indiqué. — Après le lachesis, conviennent quelquefois : Alum. ars. bell. carb-v. caus. con. dulc. merc. n-vom. phos-ac.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections des personnes maigres, épuisées, d'un tempérament mélancolique, ou colérique, avec teint maladif; Souffrances par un temps chaud et humide, ainsi que par les changements du temps et le vent; Suites fâcheuses d'un chagrin, d'une affliction (mortification) et d'une frayeur?; Souffrances des ivrognes; Souffrances par l'abus du mercure; Rhumatismes aigus et chroniques; Affections arthritiques; Douleurs ostéocopes; Paralysies; Faiblesse par perte d'humeurs (pollutions, hémorrhagies)?; Accès d'évanouissement; Syncope et asphyxie?; Atrophie; Anévrisme; Convulsions et accès de tétanos, principalement chez les enfants et les jeunes gens; Épilepsies chroniques; Hémorrhagies; Anévrismes; Gale; Lèpre; Érysipèles simples, phlegmoneux et vésiculeux; Scarlatine maligne?; Panaris; Ulcères carcinomateux; Gangrène?; Ulcères mercuriels;

Fièvre des enfants; *Fièvres quotidiennes et tierces*; *Mélancolie*; Folie religieuse?; Aliénation mentale à la suite d'études forcées; Imbécillité?; *Hydrophobie*?; Accès d'apoplexie (dans l'âge viril); Congestion cérébrale avec perte de connaissance; Affections cérébrales des enfants; Encéphalite?; Hydrocéphale?; Suites d'un coup de soleil?; Fatigue nerveuse par des travaux de tête; Céphalalgies nerveuses, hystériques, congestives; Ophthalmies aiguës et chroniques; Obscurcissement et ulcères de la cornée; Amblyopie amaurotique?; Ozène?; *Coryza chronique avec obturation du nez*; *Coryza* supprimé par des émotions morales?; *Erysipèle à la face*; Proso-palgies et odontalgies congestives et nerveuses (principalement chez les jeunes filles); *Angines aiguës* (principalement chez les enfants); *Angines mercurielles*, avec ulcération; Boulémie; Dyspepsie avec vomissement des aliments; Affections gastrico-biliaires?; Hématémèse?; Vomissement des femmes enceintes, des ivrognes?; Choléra?; Affections hépatiques, aussi chez les ivrognes; Abscès hépatiques; Ramollissement du foie; *Ictère*; *Fièvre jaune*; Coliques spasmodiques; Coliques des femmes enceintes?; Tympanite?; *Disposition chronique à la constipation*; Diarrhées de plusieurs espèces; *Dysenteries*?; Lienterie?; Affections vermineuses des enfants; *Coliques hémorroïdales*; Hémorroïdes fluentes, ou avec flux muqueux; Indurations dans le ventre avec selles purulentes; sanguinolentes; Hémorrhagie intestinale?; Impuissance?; *Dysménorrhée et autres souffrances dans l'âge critique*; Souffrances hystériques?; Avortement?; Induration et ulcération des ovaires; Affections catarrhales (et inflammatoires) des voies aériennes; Coqueluche?; Croup?; *Dyspnée*; *Souffrances asthmatiques*; Asthme de Millar?; Asthme thymique de Kopp?; *Pleurésie*; Pneumonie?; Grippe?; Phthisie?; Hémoptysie; Hydrothorax?; Orthopnée paralytique?; *Battements chroniques du cœur*, principalement chez de jeunes filles; Anévrismes, polypes, inflammation et autres maladies du cœur? Cyanose?; Coxalgie?; Ulcères aux jambes; *Panaris*, etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs voluptueuses, ou épouvantables, ou fortement pressives, à plusieurs parties du corps. — Sensation de luxation et de paralysie dans les articulations. — *Roideur et tension dans les muscles, comme s'ils étaient trop courts. — *Douleurs ostéocopes. — *Douleurs rhumatismales vives et tractives aux membres, ou douleurs rongeantes, avec sensation de meurtrissure en se remuant. — *Douleurs nocturnes qui paraissent insupportables et ne permettent pas de rester au lit. — Les douleurs affectent alternativement l'un ou l'autre côté du

corps, ou tantôt les membres, tantôt le corps, et se montrent souvent en croix. — **Souffrances intermittentes et périodiques, *souffrances accompagnées de péril de suffocation*, et souffrances avec besoin de se coucher. — **Aggravation et renouvellement des souffrances après le sommeil*, ou la nuit, et principalement avant minuit, ou *quelques heures après le repas*, ou par un temps humide et chaud, ainsi que par les changements de temps et le vent; soulagement de beaucoup de souffrances par le grand air. — Les émotions morales, telles que les contrariétés, la peur, la frayeur, etc., renouvellent souvent toutes les souffrances. — **Paralysie avec lourdeur et roideur des membres; *paralysie semi-latérale. — *Grande faiblesse de corps et d'esprit; *épuisement comme après une perte de sang; chute rapide des forces; relâchement des forces musculaires. — *Accès de défaillance, avec dyspnée, nausées, sueur froide, vertiges, pâleur du visage, vomissements, étourdissements, obscurcissement des yeux, douleurs et point dans la région du cœur, convulsions et épistaxis. — *Accès d'asphyxie et de syncope, avec perte des sens et du mouvement, insensibilité comme dans la mort, serrement des dents, roideur et gonflement du corps, pouls tremblant et sans nul battement. — Tremblement des membres, palpitations musculaires et tressaillement dans plusieurs parties du corps. — *Accès de convulsions et d'épilepsie, avec cris, mouvements des membres, chute sans connaissance, yeux convulsés, écume devant la bouche, poings fermés; avant l'accès, pieds froids, rapports, pâleur du visage, vertiges, tête lourde et douloureuse, battements de cœur, ballonnement du ventre; après l'accès, sommeil. — Accès de tétanos avec distorsion des membres. — *Hémorrhagies et extravasation du sang dans différents organes.*

PEAU. — Ecchymoses; saignement facile et abondant des plaies et des ulcères; sortie de masses de sang par les pores de la peau. — Tumeurs variqueuses. — Gonflement hydropique de tout le corps. — Tuméfactions dures et pâles. — **Peau jaune, verte, plombée, ou rouge bleuâtre, ou noirâtre*, principalement autour des plaies et des ulcères. — **Taches jaunes, rouges, cuivrées. — Taches pâles, livides, avec accès de défaillance. — Gale sèche, miliaire, avec éruption de grosses vésicules jaunes ou d'un noir bleuâtre, avec gonflement des parties affectées, et douleurs qui poussent au désespoir. — Éruption miliaire qui, par la suite, devient semblable aux urticaires, à la scarlatine, aux morbilles. — Érysipèle et éruptions vésiculeuses, avec auréole rouge. — Plaques excoriées, avec douleurs brûlantes en les touchant. — Ulcères entourés de boutons, de vésicules et d'autres petits ulcères. — *Ulcères superficiels à fond sale, avec auréole rouge. —*

— *Ulcération carcinomateuse* (des plaies), ou putréfaction de la chair qui se détache des os et tombe en lambeaux. — *Gangrène des plaies*, avec fièvre inflammatoire, pouls faible, accéléré et intermittent; défaillance, nausées, vomissements spasmodiques et bilieux, convulsions et sueurs froides. — Papules; verrues; *tumeurs dures. — **Panaris*. — Bosses et tubérosités rouges et pruriantes.

SOMMEIL. — *Grande envie de dormir le jour*, et somnolence, *principalement après le repas*. — *Insomnie*, principalement avant minuit, avec *surexcitation nerveuse*. — Somnolence et insomnie alternatives, tous les deux jours. — **Sommeil léger*, avec *réveil fréquent et facile*, agitation et jactation, gémissements et soupirs, sursauts et effroi. — **Rêves continuels et fréquents*, tant poétiques et méditatifs, que voluptueux; rêves de querelles, de choses horribles, de spectres et de mort. — **La nuit*, chaleur, agitation, brûlement à la paume des mains et à la plante des pieds, douleurs ostéocopes, ou rhumatismales, diarrhée, émission d'urine, exaltation mentale, et beaucoup d'autres souffrances. — *Après le sommeil*, sensation de roideur et de courbature dans les membres, érections avec désir vénérien, douleurs au dos et aux reins, congestion de sang, lourdeur et douleur de tête, pression à l'estomac, mal à la gorge, bâillement nerveux et aggravations de toutes les souffrances.

FIÈVRE. — *Froid glacial de la peau ou des membres*, ou seulement des pieds, avec grand désir du feu, et quelquefois avec perte de sentiment, sueur visqueuse, faiblesse et grande fréquence du pouls. — *Frissons*, quelquefois seulement partiels, souvent avec douleurs dans les membres, maux de reins, agitation et jactation, coliques, trismus et mouvements convulsifs des membres, douleur à la poitrine, soif, claquement de dents. — **Horripilation pendant la chaleur et principalement en soulevant la couverture du lit*. — Frissons, principalement après le repas ou dans l'après-midi. — *Chaleur sèche, principalement la nuit ou le soir*, et surtout aux pieds et aux mains, accompagnée souvent d'agitation et de jactation, de mal à la tête, délires, soif inextinguible, rapports, vomissements bilieux, cris, gémissements, sécheresse de la bouche et de la gorge, et selles fréquentes. — **Chaleur alternant avec froid*, frissons ou horripilation. — **Fièvres nocturnes ou vespertines*, par accès quotidiens, tierces, ou quarts, et accompagnées souvent de mal à la tête, chute rapide des forces et faiblesse qui force à se coucher, manque d'appétit, hoquet, vomissement, sensibilité du cou au toucher, palpitations du cœur, angoisse, urines jaunes, diarrhées, douleurs aux membres, au dos, aux reins, bâillements nerveux et spasmodiques, pandiculaisons, gonflement du corps, taches et ulcères. — **Fièvres chroniques*; fiè-

*vres lentes ; *fièvres typhoïdes. — °Renouvellement des fièvres par des aliments acides. — *Sueur fébrile, principalement après la chaleur, vers le matin ; °sueurs abondantes ; sueurs fétides ; *sueurs froides ; sueurs sanguinolentes. — *Pouls intermittent, ou faible et fréquent, °ou irrégulier, ou à peine sensible, ou tremblant.*

MORAL. — Grande angoisse, anxiété insupportable et *inquiétude qui porte à chercher le grand air.* — Crainte et pressentiment de la mort. — **Accablement moral et mélancolie, avec appréhensions, inquiétude sur sa maladie, trop grande disposition à s'abandonner au chagrin, à voir tout en noir, et à se croire persécuté, haï et méprisé des siens. — *Tristesse et dégoût de la vie. — *Méfiance, soupçons et grande disposition à prendre tout en mal, à contredire et à critiquer. — Jalousie frénétique. — Paresse avec *Déplaisir et inaptitude à un travail quelconque de corps ou d'esprit. — *Caractère peureux, avec incertitude et indécision. — *Grande apathie et faiblesse de mémoire extraordinaire ; °tout ce que l'on entend est comme effacé ; on ne se rappelle plus même l'orthographe, et on oublie jusqu'à ce que l'on allait dire. — On se trompe en parlant et en écrivant, ainsi que sur les heures du jour et les jours de la semaine. — *Imbécillité et perte de toutes les facultés de l'esprit. — *Surexcitation et trop grande irritabilité nerveuse, avec disposition à s'effrayer, état d'extase et d'exaltation qui va jusqu'aux pleurs, besoin de méditer et de composer des travaux intellectuels, °avec une sorte d'orgueil. — *Loquacité frénétique, avec discours sublimes, mots choisis, et idées qui passent rapidement et constamment d'un sujet à un autre. — Délires nocturnes avec beaucoup de paroles ou avec murmures. — Démence et perte de connaissance.*

TÊTE. — °Fatigue de la tête par des travaux intellectuels. — *Vertiges principalement le matin au réveil, ainsi que le soir, après s'être couché, en allant au grand air, en levant les bras, et souvent avec défaillance, pâleur du visage, °nausées, vomissements, congestion à la tête, saignement de nez et lassitude des membres. — Ivresse, stupeur et perte de connaissance. — *Accès d'apoplexie, °avec face bleuâtre, mouvements convulsifs des membres et extravasation de sang dans le cerveau. — Ramollissement du cerveau et de ses membranes. — Douleur violente à la tête avec face jaune et rougeur des joues. — *Mal de tête, avec congestion de sang, scintillement devant les yeux, somnolence, frissons et besoin de se coucher, °ou avec nausées et vomissements ; °Céphalalgie par la chaleur du soleil ; *douleurs profondes dans le cerveau, °ou dans les orbites, °ou au-dessus des yeux, ou à l'occiput, avec °roideur de la nuque. — Douleur de meurtrissure dans le vertex, ou *sensation de térébration, avec coups

et battements en remuant la tête. — **Pesanteur et pression à la tête*, comme si elle allait éclater; ou **tension* comme par des fils tirés de l'occiput vers les yeux, ou *élançements comme par des couteaux* dans différentes parties de la tête et jusqu'aux yeux. — Douleurs qui de l'intérieur de la tête se propagent jusqu'aux oreilles, au nez et au cou. — **Maux de tête tous les matins au réveil, ou toutes les après-dînées*, ou bien à tout changement de temps. — Gonflement de la tête; palpitations musculaires aux tempes, tension à l'occiput jusqu'à la nuque; sensibilité douloureuse du cuir chevelu, avec prurit pénible, forte desquamation et chute des cheveux.

YEUX. — *Yeux jaunes*, ou troubles, ternes et abattus, ou *brillants et convulsés*, avec regard fixe. — *Pupilles très-dilatées.* — Ecchymose et hémorrhagie des yeux. — *Sécheresse des yeux, comme s'ils étaient pleins de poussière*; ou **écoulement de larmes* qui, quelquefois, paraissent froides. — Photophobie. — Prurit et *élançements comme par des couteaux* dans les yeux, ou **pression violente comme si le globe allait sortir de l'orbite*, aggravée en remuant les yeux. — *Yeux rouges*, enflammés, avec rougeur de la conjonctive et de la sclérotique, chaleur brûlante et larmolement. — Sensation comme si les yeux étaient trop gros ou les orbites trop petits. — Gonflement et inflammation des paupières, ou de leurs bords. — Convulsions, pesanteur et paralysie des paupières. — *Faiblesse de la vue* et presbyopie. — Confusion des caractères en lisant. — Trouble de la vue comme par un voile. — Obscurcissement et perte de la vue. — Flammes et étincelles, ou voile bleu devant les yeux, ou cercles bleus autour de la chandelle. — Yeux petits et sans expression.

OREILLES. — Oreilles froides, sensibles au vent. — Gonflement douloureux de l'intérieur de l'oreille. — **Sécheresse des oreilles.* — **Cérumen trop peu abondant, trop dur et trop pâle*, ou comme de la bouillie, **et blanc avec diminution de l'ouïe.* — Battements très-désagréables, **résonnement*, **bruissement*, tintement, craquement, bourdonnement et roulement, ou bruit comme si on battait le tambour, dans les oreilles. — Oreilles comme bouchées. — Sensibilité excessive ou *dureté de l'ouïe.* — Hémorrhagie par les oreilles. — Gonflement des parotides. — **Excoriation et croûte derrière les oreilles.*

NEZ. — Douleurs nocturnes au dos du nez. — *Obturation du nez comme par un gonflement intérieur*, principalement le matin, ou avec le coryza. — *Gonflement*, **rougeur* et *excoriation des bords du nez avec croûtes dans les narines.* — Mouchement de sang. — *Saignement abondant par le nez*, d'un sang rouge clair ou épais et noir. — *Écoulement de pus par le nez.* — **Coryza sec, chronique,*

avec obturation du nez; ou *fluent*, avec *écoulement abondant de mucosités séreuses*, larmoiement, *éternument fréquent* et inflammation et érosion des narines. — ° *Coryza incomplet*, avec beaucoup de souffrances de la tête et de l'esprit qui disparaissent toutes dès que le *flux catarrhal* s'est établi. — *Boutons chroniques rouges sur le nez.

VISAGE. — **Face pâle, malade, dé faite, cadavéreuse; teint plombé, ou terreux, décoloré, jaunâtre*. — **Rougeur circonscrite des joues*, avec couleur jaune de la face. — Cercle bleu autour des yeux. — Petites veines rouges sur les joues. — Bouffissure, quelquefois effroyable, tension et *gonflement rouge du visage*. — Chaleur et rougeur du visage (pendant le délire). — **Erysipèle à la face*, quelquefois avec prurit, boutons ou vésicules, gerçures et suintement corrosif, douleurs brûlantes et gonflement. — Miliare et boutons au visage. — ° Dartre avec croûtes épaisses dans la région des favoris. — Douleurs tensives et formicantes au visage; douleurs dans les os de la face; prosopalgie avec vomissement des aliments. — Lèvres sèches et gonflées; boutons aux lèvres; tremblement des lèvres. — Faiblesse et paralysie de la mâchoire inférieure, avec distorsion des traits. — *Trismus*, avec serrement et grincement des dents; claquement des dents.

DENTS. — *Douleurs térébrantes dans les dents cariées*, principalement après le dîner, et quelquefois avec gonflement des joues et sensation comme si les dents étaient trop longues. — *Maux de dents, tous les matins après le réveil, ou toutes les après-dînées*, avec douleurs déchirantes, tractives et lancinantes dans la racine des dents (de la mâchoire inférieure). — *Mal aux dents, avec douleurs à la tête, frissons, chaleur et jambes lourdes. — *Les douleurs de dents se propagent jusqu'aux oreilles*. — Agacement et vacillement des dents; *les dents cariées se ramollissent et s'ébrèchent*. — Gonflement et sensibilité douloureuse des gencives. — Les boissons chaudes et froides renouvellent les douleurs.

BOUCHE. — Gonflement inflammatoire de la cavité buccale. — Bouche et palais excoriés et très-douloureux. — *Sécheresse de la bouche et de la langue, ou *accumulation d'eau dans la bouche*, et *salivation. — Langue luisante, rouge et fendillée; ou enflammée, gonflée, brunâtre ou noirâtre. — Roideur, immobilité et paralysie de la langue. — Aphonie ou parole confuse, indistincte; voix nasillarde; difficulté de prononcer telle ou telle lettre et tel ou tel mot; parole plus haute et plus précipitée qu'on ne le voudrait. — Bégayement.

GORGE. — **Chatouillement continuel dans la gorge*, comme par une miette de pain, ou quelque chose de semblable qui s'y serait arrêté. — *Sécheresse partielle ou générale de la gorge, s'étendant

souvent jusqu'aux oreilles, au nez et à la poitrine. — Brûlement et douleur d'excorsion à la gorge, principalement en avalant. — **Excorsion douloureuse et-gonflement inflammatoire de la gorge*, avec rougeur des parties affectées, comme par du cinabre. — °Gonflement des amygdales. — Grandes et **petites tumeurs dans la gorge*, qui empêchent la déglutition. — **Besoin continuel d'avaler*, et sensation en avalant, comme s'il y avait une tumeur, un morceau, ou un tampon dans la gorge. — Sensation de rétrécissement, de strangulation et de constriction à la gorge. — Gorge comme roide et paralysée. — Convulsions et spasmes dans la gorge. — **Déglutition empêchée*, avec horreur des boissons, qui souvent sortent par les narines. — Hydrophobie. — *Aggravation des maux de gorge par le plus léger contact et la moindre pression du cou*, ainsi qu'après avoir dormi et en avalant la salive; soulagement en mangeant. — *Maux de gorge qui n'affectent qu'une petite partie, ou qui, au contraire, se propagent jusqu'aux oreilles, au larynx, à la langue, aux gencives, souvent avec dyspnée et péril de suffocation, salivation et renâchement de mucosités. — **Accumulation abondante de mucosités tenaces dans la gorge*. — °Maux de gorge alternant avec obturation du nez, ou avec souffrances en parlant. — °Ulcères au palais, dans l'arrière-bouche et à la gorge, avec odeur fétide, suppuration abondante, et vives douleurs en avalant les aliments.

APPÉTIT. — Goût désagréable ou sucré, acide, âpre, astringent ou métallique. — **Manque d'appétit et de faim*; inappétence complète pour les aliments ou les boissons. — *Répuissance pour le pain*, qu'on ne peut pas avaler. — *Appétit irrégulier, tantôt anorexie, tantôt boulimie. — **Faim malade*, avec nausées, bâillements convulsifs et accès de défaillance si l'on ne mange pas de suite, ou avec pression rongante dans l'estomac, se renouvelant peu après avoir mangé. — *Soif inextinguible*. — *Désir du vin* ou du lait, qui l'un et l'autre cependant incommodent. — **Après avoir mangé, pression à l'estomac, rapports, vertiges, flatuosités, envie de vomir, ou vomissement des aliments*, faiblesse dans les genoux, paresse et lourdeur du corps, fatigue de l'esprit, malaise, régurgitation, diarrhée, gêne de la respiration, mal à la tête et aux dents, et exacerbation de toutes les souffrances.

ESTOMAC. — Hoquet après avoir bu, ou fumé du tabac. — Rapports à vide, violents, avec péril de suffocation. — **Rapports qui soulagent les souffrances*. — Renvois acides, avec goût des aliments. — Pyrosis depuis la gorge, comme si tout l'œsophage était plein de choses rances. — *Nausées et envie de vomir*, principalement le matin, ou après le repas, ainsi qu'à la suite de beaucoup d'autres souffrances. — *Vomissements violents et convulsifs de tout ce que*

l'on prend, ou de matières bilieuses, amères, verdâtres. — Vomissement de sang pur, ou de mucosités sanguinolentes. — Vomissements avec diarrhée, obscurcissement des yeux, douleurs d'estomac et diurèse. — **Sensibilité excessive de la région précordiale au moindre contact*; les vêtements serrés sont insupportables, et *la moindre pression est très-douloureuse.* — **Grande faiblesse de l'estomac*; il ne peut supporter ni les aliments ni les boissons. — Sensation comme si quelque chose embarrassait le cardia, et empêchait la déglutition. — *Pression dans l'estomac* et jusque dans la poitrine, et sensation comme si un ver s'y remuait et le rongerait. — (Tous les soirs) *crampes et douleurs violentes à l'estomac*, avec rapports, vomiturition et vomissement de glaires.

VENTRE. — *Douleurs hépatiques*, brûlantes, tractives, ou incisives. — Inflammation et ramollissement du foie. — Abscesses hépatiques. — *Douleurs et points dans la région splénique*, quelquefois en allant en voiture, ou en marchant. — Grosseur du ventre chez les jeunes filles. — *Sensation de vide dans le ventre.* — **Douleurs abdominales à la suite d'un tour de reins.* — **Douleurs généralement pressives, dans la région ombilicale*, quelquefois avec gêne de la respiration, aggravation une heure après le repas, et soulagement par les rapports. — *Tranchées violentes à rendre fou*, ou **tiraillements aigus, avec contraction du ventre.* — Brûlement dans le ventre, avec pression sur la vessie. — Inflammation des intestins. — Extravasation de sang au péritoine. — **Ventre ballonné, dur, avec coliques flatulentes*, mal au dos, vomissement, diarrhée et diurèse. — Émission fréquente des vents; les vents pénètrent quelquefois dans l'anneau inguinal. — Douleur comme si une hernie allait sortir.

SELLES. — Selles tardives. — **Constipation opiniâtre, avec selles dures, difficiles.* — Selles petites, insuffisantes et tenaces. — **Constipation alternant avec diarrhée.* — *Diarrhées, avec coliques violentes*, nausées, vomissements, angoisse, douleurs au rectum pendant le passage des selles, ténesme et excoriation de l'anus. — **Selles diarrhéiques, principalement la nuit, ou après le repas, ou par un temps chaud (et humide), ou pour avoir pris des fruits et des acides.* — Selles involontaires et sans qu'on s'en aperçoive. — *Evacuation de matières fétides*, ou de selles molles, de la consistance de la bouillie, ou liquides ou gluantes, comme de la poix, ou sanguinolentes et purulentes, ou de matières non digérées, ou de sang pur, ou de mucosités sanguinolentes. — Pendant les selles, douleur, ténesme et brûlement à l'anus; après la selle, congestion de sang à la tête, vertiges, faiblesse, douleurs et battements à l'anus. — Constriction douloureuse de l'anus et du rectum. — *Chute du rectum pendant la selle.* — Sortie de mucosités

et de sang par le rectum, quelquefois avec coliques violentes. — **Hémorroïdes avec coliques*, ou avec brûlement et tranchées dans le rectum, ou avec congestion sanguine à l'anus, et diarrhée. — **Hémorroïdes saignantes*.

URINES. — **Pression sur la vessie, avec envie d'uriner*, ou avec tranchées et brûlement dans le ventre. — **Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante, même la nuit*. — Douleur violente, comme si une balle roulait dans la vessie, et de là dans l'urèthre. — Ténésme violent, avec urines peu abondantes. — Paralyse de la vessie. — *Elancements incisifs, continus*, dans l'urèthre. — Petite tumeur de l'urèthre, avec rétention d'urine. — **Urines troubles et brunes*, ou rouge, ou jaune foncé, et quelquefois avec émission fréquente, mais peu abondante, ou avec sédiment brun et sablonneux, ou rouge, ou couleur de brique. — Urines écumeuses. — Émission involontaire et inaperçue des urines. — Pendant le besoin d'uriner, douleurs au dos et aux reins. — **En urinant, sensation de brûlure dans l'urèthre*, et beaucoup d'autres souffrances qui viennent toutes par le mouvement de la voiture et après avoir bu du vin. — Douleur d'excoriation à l'urèthre et au gland. — Pissement après la selle et après avoir uriné.

PARTIES VIRILES. — Pression sur les testicules, comme si une hernie allait sortir, en faisant des efforts pour uriner. — Boutons aux parties velues. — *Beaucoup de désirs vénériens, sans besoin physique et avec flaccidité de la verge*. — *Érections* sans désirs vénériens. — Pollutions nocturnes et diurnes, quelquefois avec faiblesse et sueur. — Écoulement de liqueur prostatique en urinant ou après avoir uriné. — Sperme d'une odeur pénétrante. — Dans le coït, l'éjaculation tarde à avoir lieu, ou manque entièrement. — Sécrétion abondante derrière le gland. — Taches et boutons rouges sur le gland et sur la couronne. — Amincissement du scrotum et dureté des testicules. — Épaississement du prépuce.

RÈGLES. — Sensation d'une boule qui monte du ventre à la poitrine, comme dans l'hystérie. — ° Douleurs depuis l'ovaire jusqu'à l'utérus, avec évacuation de pus pendant les selles. — Enflure des parties, avec prurit et désirs vénériens. — **Règles faibles, tardives* et de trop courte durée, souvent avec hémorroïdes et beaucoup d'autres souffrances. — **Spasmes abdominaux pendant les règles*. — Avant les règles, douleurs et battements dans la tête, vertiges, épistaxis, pression à l'estomac, renvois, tranchées dans l'hypogastre, écoulement muqueux par l'urèthre et crampes de poitrine. — **Avant et après les règles, diarrhée avec fortes coliques*. — **A l'apparition des règles, maux de reins*, avec douleur de brisement dans les hanches et la poitrine. — ° Pendant les règles, maux de reins, comme pour l'enfantement, battements à la

tête et tranchées. — Avortement. — Le lait des personnes mordues par ce serpent devient venimeux et se caille.

LARYNX. — Catarrhe, avec toux, coryza, douleurs lancinantes à la tête, roideur de la nuque et affection de poitrine. — **Enrouement continué*, avec sensation, comme s'il y avait quelque chose dans la gorge qui empêchât de parler et qui ne pût se détacher. — Étranglement et constriction du larynx, avec sensation de gonflement et de tension. — *Sensibilité douloureuse du larynx et du cou, au toucher et à la plus légère pression, avec péril de suffocation en tâtant le gosier et en renversant la tête.* — Sensation de pulsation et d'étouffement entre le larynx et la poitrine. — Sécheresse, brûlement et douleur d'excoriation au larynx. — Sensation d'une boule dans le larynx. — *Voie faible, creuse, nasillarde.* — **Toux* souvent *fatigante*, dont tous les efforts ne peuvent rien détacher, excitée le plus souvent par un chatouillement dans le larynx, dans la poitrine et au creux de l'estomac, ou par la pression du gosier, ainsi que par la conversation, la marche et tout ce qui peut augmenter la sécheresse de la gorge. — **Toux* toujours après avoir dormi, ou la nuit, en dormant, ou le soir après s'être couché, ainsi qu'en se levant de la position couchée. — **Toux sèche et courte*, suffocante et croassante, quelquefois avec vomissement. — Crachats muqueux, tenaces ou acides, et d'un goût désagréable, ou sanguinolents. — Hémoptysie. — En tousant, accumulation d'eau dans la bouche, douleurs vives au creux de l'estomac, secousses dans la tête et tension aux yeux.

POITRINE. — Respiration courte, fréquente, ou convulsive, ou râlante, ronflante et croassante, ou suspicieuse, gémissante et profonde. — Besoin fréquent de respirer profondément. — **Dyspnée* et oppression de poitrine, avec de grands efforts pour respirer. — **Haleine courte*, principalement après le repas, en marchant, après un effort des bras, et quelquefois avec tristesse, ou avec toux asthmatique. — **Accès d'asthme*, et gêne de la respiration, principalement après avoir mangé, ou le soir en se couchant, ou la nuit, pendant le sommeil, et quelquefois avec angoisse, soif, nausées, vomissement, défaillance et sueur froide. — **Accès de suffocation*, surtout en étant couché, le soir ou la nuit au lit, et principalement lorsque quelque chose vient se placer devant le nez ou la bouche. — Orthopnée paralytique. — Haleine d'une odeur très-désagréable. — *Pression à la poitrine, comme par un poids*, ou comme si elle était remplie de vents, et principalement la nuit. — Douleurs violentes, avec grande angoisse et mouvements continuels dans la poitrine. — Brûlement et douleur d'excoriation dans la poitrine, comme si tout était à vif, principalement après le repas. — Points dans le côté et dans la poitrine,

aggravés en respirant, et quelquefois avec toux et crachats sanguinolents. — Extravasation de sang dans les poumons. — Gangrène des poumons. — **Battements de cœur, avec anxiété, °excités* quelquefois par des douleurs crampoïdes avec toux et accès d'étouffement. — °Spasmes au cœur (avec anévrisme de la carotide droite) et pulsation désagréable aux oreilles. — Points dans la région du cœur, avec haleine courte, accès d'évanouissement et de sueur froide.

TRONC. — Enflure et bouffissure des téguments de la poitrine. — Prurit, plaques rouges et éruptions miliaires à la poitrine. — *Nuque et cou excessivement sensibles à la moindre pression.* — Roideur rhumatismale de la nuque et du cou. — Points au dos et entre les épaules. — Petite tumeur près de l'épine dorsale. — Brûlement au dos. — Spasmes des muscles du dos. — **Roideur douloureuse depuis les reins, jusqu'à la hanche, comme si les muscles étaient trop courts.* — °Douleurs nocturnes, insupportables, au dos, aux reins, à la hanche et au genou. — °Manque de force dans le dos et les genoux, qui force à marcher courbé. — Douleur de luxation dans les reins, comme après des efforts. — Papules, vésicules, dartres, boutons et taches écarlates sur le dos et les omoplates.

BRAS. — Douleurs rhumatismales, arthritiques et ostéocopes, aux bras, aux mains, aux doigts et aux poignets. — °Ulcère malin au haut du bras. — Tension comme par raccourcissement des tendons, depuis le coude jusqu'aux doigts. — Inflammation érysipélateuse au coude. — Élevures aux bras, après avoir gratté. — Sensation de fatigue ou de paralysie, et douleur de luxation dans les bras. — Paralysie des mains. — **Tremblement des mains.* — Mains sèches et brûlantes. — Bouts des doigts engourdis, douloureux. — °*Piqûres au bout des doigts.* — Prurit, **éruptions galeuses*, plaques rouges avec vésicules, furoncles, excroissances et verrues aux mains et aux doigts. — °Gonflement noir, bleuâtre, dur et froid, au dos de la main et des doigts. — °Gonflement dur de la main jusqu'au coude, avec douleurs excessives. — **Parinaris.*

JAMBES. — **Sensation de raccourcissement, et raccourcissement des tendons du jarret.* — Douleurs nocturnes dans la hanche et la cuisse. — Douleurs vives et tractives aux jambes pendant les changements de temps et un temps venteux. — Furoncles aux cuisses. — Sensation de pesanteur, de paralysie, d'engourdissement, et tremblement aux cuisses et aux genoux. — *Genoux comme disloqués, roides et faibles.* — Crampes et douleurs dans les mollets. — Élevures rouges aux cuisses et aux jambes après s'être gratté. — °Plaques excoriées et ulcères superficiels à fond

sale aux jambes. — **Gonflement douloureux, rouge ou bleudtre, des pieds et des jambes.* — *Pesanteur, engourdissement, froid glacial, sueur des pieds.* — Prurit, **éruptions galeuses, papules et taches de brûlure aux pieds et aux jambes.* — *Gercures et rhagades entre les orteils.* — *Abcès aux talons.*

128. — LACTUCA VIROSA.

LACTUCA. — Laitue vireuse. — JOURNAL F. A. M. L. II, 1. — *Durée d'action ?* 24 heures.

ANTIDOTES : Les acides végétaux et le café.

N.B. Les symptômes suivis d'un (s) appartiennent au lactucarium, préparé avec le suc du *lactuca sativa*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Semble agir de préférence sur les organes de la respiration.* — *Tiraillements* dans les membres et le dos, ou bien périodiques, à diverses parties (s); *déchirements qui voyagent* d'abord dans l'articulation de l'épaule et du coude droit, puis tantôt dans le poignet, tantôt dans les genoux, la cuisse, l'articulation du pied, à la nuque, dans les tempes, etc.; *bouillonnement douloureux* dans les membres, l'après-midi, en étant assis tranquillement; *tressaillement aigu, crampoïde*, près des articulations (à la nuque, les hypochondres, les coudes, les hanches), le plus souvent le soir, et dans le repos, quelquefois aussi pire le matin, et surtout du côté des extenseurs; *douleurs crampoïdes*, qui reparaissent bientôt à d'autres parties et gênent l'usage de ces parties (surtout aux coudes, aux mains, aux doigts, aux jambes); *brisement de tous les membres*, forçant à passer tout le jour au lit. — *Démarche mal assurée, on bronche en marchant* (s); *convulsions dangereuses* chez les femmes (s). — *Abattement général*, quelquefois avec lassitude et immobilité; *forte fatigue; grande lassitude* (aussi s); quelquefois avec besoin de dormir, ou bien le matin, après s'être levé, avec inaptitude au travail; après la moindre occupation, irritation et lassitude, comme après de grandes fatigues. — *Sensation indicible de légèreté dans le corps* (s); sensation de force vivifiante chez une personne hystérique (s); besoin de se tenir droit, en étant assis. — *Au grand air*, bien-être plus grand et surtout la poitrine plus libre; *légèreté inaccoutumée* dans le corps (s); *allègement des symptômes*, surtout par le mouvement au grand air; *désir du grand air*.

PEAU. — *Pincement lancinant et cuisson sous-cutanée* çà et là, ou bien aussi *élançements.* — *Inflammation et éruption* (par des ap-

plications sur des parties délicates de la peau). — *Gonflement œdémateux de tout le corps*, avec affections asthmatiques, tête entreprise, position sur le dos pénible, horripilation, absence d'appétit, toux courte et pouls petit et plein.

SOMMEIL. — *Bâillements fréquents*; bâillements et pandiculations (s); — *Grande envie de dormir* pendant le jour (s aussi); avec fatigue et lassitude; avec bâillements fréquents (s aussi), le soir de bonne heure, obligeant à se coucher tôt; sommeil invincible (s); on s'endort en travaillant; *coma*, quelquefois avec dégoût (s); envie de dormir sans pouvoir s'endormir, *sommeil profond, de plusieurs heures*, quelquefois même avec pouls un peu fréquent. — *Sommeil nocturne: paisible, réparateur* (s aussi); solide, rempli de rêves, ou bien aussi sans rêves; solide, avec écoulement de sperme inaperçu (s); *sommeil nocturne étourdissant*, avec difficulté de se réveiller le matin; *agité, non réparateur* (s aussi); sommeil long, agité (s); réveil fréquent, presque tous les quarts d'heure. — *Impossibilité presque complète d'être couché sur le dos* (à cause de symptômes asthmatiques) et en même temps tension dans le creux de l'estomac; on aime à être couché la tête haute et du côté droit. — *La nuit au lit*: forte oppression de poitrine, qui réveille pendant le sommeil et oblige à se mettre promptement sur son séant, avec anxiété, sensation de grande fatigue le matin (s); gêne de la respiration, avec douleurs pressives et saisissantes dans la poitrine, qui ne permettent que peu de sommeil; *gêne de la respiration qui empêche de dormir*, avec battement pulsatif dans la tête, et en même temps, battement de cœur, suivi de douleurs déchirantes dans la tête, avec pesanteur et hébétude, douleurs de tête; toux spasmodique et chaleur fébrile, avec rêves dont on n'a pas conscience et sommeil agité. — *Rêves*: fantastiques, pendant un sommeil agité; vifs et quelquefois *anxieux* (de suicide par arme à feu), *pendant un sommeil profond; vers le matin*, quelquefois singulier et comme s'il décrivait un cercle en tournant sur un pied; sommeil toute la nuit avec une foule de rêves. — *Le matin au réveil*: sensation comme si la tête était vide; difficulté à chasser le sommeil; grande lassitude, après un sommeil agité, avec oppression (s).

FIEVRE. — *Froid parcourant souvent le dos et la tête* (s aussi), quelquefois avec chaleur de la face (s), ou bien avec frisson dans la chambre chaude, et froid aux pieds et aux mains; *frisson facile* pendant la journée, même dans la chambre chaude; *horripilation*, qui, quelquefois, semble glisser sous les cheveux. — *Fievre*, avec fortes douleurs de tête, sensibilité douloureuse du cuir chevelu au toucher, déchirements dans les articulations des membres (de même que dans la nuque et la face), grande pesanteur de la

tête, le soir, qui force à la pencher en avant, *chaleur pénible et très-sèche à la tête et à la partie supérieure du corps*, avec froid glacial des pieds, et en même temps ardeur et larmoiement des yeux, quintes d'une toux sèche, suffocante et spasmodique, avec ébranlement violent dans la poitrine et la tête et contractions spasmodiques et douloureuses des vertèbres lombaires et de la région des hypochondres. — Sensation de *chaleur*, d'une sécheresse insupportable, surtout aux jambes, qui sont douloureuses, comme après une très-grande course, le matin de 3 à 6 heures. — *Pouls lent* (s aussi); lent et tendu; *rare*, même jusqu'à 10, 12 pulsations (s). — Transpirations abondantes; *fortes sueurs* (s); sueur nocturne générale et douce (s).

MORAL. — Humeur mélancolique, chagrine; semble favoriser la tristesse, avec idées exaltées et exagérées, de telle sorte que de la chose la plus simple, il redoute les conséquences les plus terribles et les plus inquiétantes; après un chagrin, le soir, douleur étourdissante dans le front et contractions violentes dans la gorge, avec envie continuelle de pleurer. — Angoisse et agitation intérieure. — *Mauvaise humeur* excessive, à la moindre contrariété; *mauvaise humeur*, *humeur chagrine*, avec *inaptitude au travail* et impossibilité de rester au lit; *humeur acaridtre*, la moindre des choses suffit pour le monter.

TÊTE. — Difficulté de réfléchir (s), inaptitude aux travaux de l'intelligence, parce que les idées s'embrouillent et qu'il lui est impossible d'embrasser l'idée générale; il cherche de côté et d'autre avant de trouver quelque chose. — *Embarras de la tête*: le matin, quelquefois avec pesanteur, comme par plénitude; dans le front, quelquefois avec sensation de chaleur de cette partie, quelquefois dans la bosse frontale droite, quelquefois dans la gauche (extérieurement), avec élanement qui traverse celle de gauche, en se baissant; sensation d'étourdissement et de vertige; tête embrouillée, quelquefois le matin, en se levant. — *Sensation comme si la tête était vide*: avec hébétude, comme si on n'avait pas assez dormi, avec vertige à faire tomber; le matin, comme après une débauche nocturne, ou bien avec pression qui semble vouloir sortir par le front et les orbites. — Ivresse. — *Vertige* (s aussi): tournoyant, avec lourdeur des jambes, avec pesanteur de la tête, surtout à l'occiput, avec assombrissement devant les yeux; les fils se confondent, en cousant; dans la chambre chaude, avec plénitude de la tête, avec sensation comme si on nageait dans le lit, avec sensation comme si la tête était trop grosse, ou que son volume eût augmenté, par un mouvement rapide du haut du corps. — *Douleur dans la région du vertex*, quelquefois à une place circonscrite, comme le *clavus hystericus* (chez une jeune

personne; tantôt par-ci, tantôt par-là, dans la tête, surtout dans l'occiput; céphalalgie l'après-midi. — *Douleur sourde*: dans le front; *dans toute la tête*; avec grand accablement et paresse corporelle; dans la région temporale gauche, en branlant fortement la tête (en se débarbouillant) et aggravée toutes les fois qu'on la remue. — *Pesanteur de la tête*: dans l'occiput, avec douleur sourde, ou bien avec pression, ou bien l'après-midi; dans le front, avec élancements, surtout dans la bosse frontale gauche. — *Céphalalgie pressive*: quelquefois avec sensation, comme si le cerveau se balançait dans la tête, ou bien aggravée à la chaleur de la chambre, ou bien encore lancinante, comme avec des instruments obtus, ou (le soir) brûlante, avec front ardent extérieurement; très-sensible dans la glabella; aiguë d'un côté de la tête, comme sur l'os; dans l'occiput, tensive, avec front ardent et mains froides. — *Pression dans le front*, le matin, en se réveillant, ou bien encore après une légère tension d'esprit, s'emparant aussi des yeux, *comme voulant sortir par les tempes*, surtout la gauche, et de là parcourant quelquefois toute la tête. — *Compression* douloureuse dans l'occiput. — *Douleur tirillante* des tempes vers le front; déchirement dans la région temporale droite; secousses sourdes dans les deux. — *Ébranlement* douloureux dans la tête, pour peu que l'on toussé, avec balancement et pression qui durent longtemps après. — Tressaillement et pulsation dans la tête, pendant le repos; bourdonnement dedans et devant les oreilles, avec sensation de plénitude dans la tête; résonnement dans le côté droit du front, le matin. — *A l'extérieur de la tête*: place douloureuse, près du vertex, aggravation au toucher; douleur sourde et fixe à une place circonscrite de l'os coronal, à gauche; douleur tirillante à une place circonscrite de l'os coronal, à droite, avec douleur au toucher.

YEUX. — Prurit au-dessus des sourcils; pression avec sensation d'écartement dans le globe de l'œil droit; cuisson dans les yeux, surtout dans les angles externes, aggravée en les frottant, ou bien seulement dans l'angle interne gauche; brûlement dans les yeux, surtout aux paupières (quelquefois seulement le jour en écrivant, ou bien surtout à l'œil droit, avec trouble de la vue et pupilles dilatées). — Rougeur de la conjonctive, avec augmentation de la sécrétion muqueuse, chez des hommes d'un âge avancé, avec pléthore abdominale. — Paupières recouvertes de chassie. — *Pupilles dilatées* (s). — *Trouble de la vue*; vue faible, quelquefois avec ardeur dans les yeux; vue faible, trouble (s); vue empêchée, comme par un nuage ou un voile qui quelquefois se dissipe en fixant attentivement un objet; mouches volant devant les yeux, en se baissant, après le repas.

OREILLES. — Tiraillements dans les oreilles; élancements suivis de tension dans l'oreille gauche. — Bourdonnement dans les oreilles; résonnement devant les oreilles, le soir, au lit.

NEZ. — Sensation d'écartement dans le bout du nez. — *Odeur spécifique* devant le nez et goût analogue dans la bouche. — *Éternument fréquent*, avec aggravation des symptômes de la poitrine, ou bien avec *poitrine douloureuse* (quelquefois comme une excoriation qui plus tard se transforme en pression.) — *Coryza* qui laisse de l'excoriation et de la sécheresse dans le nez.

FACE. — Mauvaise mine (s); visage pâle, défat; chaleur de la face, avec tremblement et sensation de gonflement des lèvres (s). — Fourmillement tensif dans la face; tiraillement picotant depuis la glande sous-maxillaire droite jusque dans l'oreille et la langue; élancements au menton, à la sortie du nerf sous-maxillaire. — *Dans les lèvres*: frémissement; gonflement des glandes lymphatiques.

DENTS. — Douleur rapide dans les molaires gauches de la mâchoire inférieure, comme si on tournait la dent affectée. — *Gencive douloureuse*, en mâchant à la place où était une dent.

BOUCHE. — Sensation de tension dans le fond de la bouche et au palais, qui force à cracher constamment; *accumulation de salive plus abondante*, quelquefois d'un goût acidulé; sécheresse de la bouche, sans soif. — *Langue: chargée d'un enduit blanc* (s aussi), enduite de mucosités épaisses (s); douloureuse comme si elle était brûlée à la pointe; contraction au-dessous de la langue.

GORGE. — *Brûlement léger dans la gorge*, quelquefois le soir; sensation dans la gorge comme si cette partie était exposée à la chaleur d'un feu ardent. — *Déglutition gênée*, avec sensation comme si la luette était à vif, avec brûlement, ou bien comme si les muscles du pharynx refusaient leur service. — *Accumulation de mucosités dans la gorge*; mucosités visqueuses dans la gorge, le matin (s aussi).

APPÉTIT. — **GOUT.** — *Goût*: fade dans la bouche (s); amer, quelquefois après avoir mangé des tartines de beurre; °amer comme du fiel, dans la gorge. — *Absence d'appétit* (s aussi); *l'appétit est nul à midi*, le manger répugne; appétit nul pour le pain et la viande. — *Appétit augmenté* (s aussi); quelquefois surtout à midi. — *Soif augmentée*. — °Après le repas, sensation de plénitude d'estomac, qui pèse vers le bas.

SYMPTÔMES GASTRIQUES. — *Renvois: fréquents*; répétés, qui soulagent plus tard l'oppression de poitrine; *à vide, °quelquefois hauts; avec goût de l'extrait; répugnant, avec sensation de froid dans le gosier et amertume persistante dans la bouche; *acres*, quelquefois aussi acide. — *Dégoût* (s aussi); *nausées* (s aussi);

quelquefois avec gêne dans le creux de l'estomac. — Vomissements et dégoût (s).

ESTOMAC. — *Douleurs d'estomac, avec contraction du creux de l'estomac et aggravées en appuyant dessus*; sensation dans le creux de l'estomac et le sternum, comme si on avait longtemps été courbé en étant assis; *gêne dans le creux de l'estomac, avec véritable angoisse précordiale*; sensation de mollesse dans l'estomac. — *Pression dans l'estomac* (s aussi): avec plénitude à éclater et suivi de fourmillement au-dessous du sein droit, avec sensation comme s'il se formait là une vésicule; sensation comme si tout se portait vers le dehors, la grandeur de la paume de la main, suivi de ténésme; pression à l'orifice de l'estomac; pression et plénitude dans le creux de l'estomac; la pression dans le creux de l'estomac se transforme en angoisse au milieu de glouglous dans l'estomac, de renvois, de borborygmes dans le ventre et d'émission de vents qui soulagent; elle se rencontre davantage au-dessous du sternum, et alterne avec une sensation de brûlement ou de froid. — *Sensation de froid* dans l'estomac (s aussi): fourmillant, dans l'estomac et le creux de l'estomac, avec renvois fréquents; *comme par de la glace dans le gosier et l'estomac*, à la suite d'une sensation de chaleur dans l'estomac, avec nausée qui remonte dans la gorge, et goût fade à la racine de la langue. — *Élancements* dans le pylore. — *Amélioration* des douleurs d'estomac en se courbant lorsqu'on est assis, ou bien par l'émission de vents fétides.

HYPOCHONDRES. — Coups sourds ou bien élancements dans les hypochondres, surtout dans le droit. — *Dans la région hépatique*: brisement, le matin; tiraillement périodique; douleur fouillante; *pression*, quelquefois le soir; *élancements*, quelquefois après le repas, ou bien se dirigeant vers le dos, ou bien encore avec sensation de pesanteur; *gonflement du foie*, quelquefois avec pression, ou bien avec tension en appuyant dessus. — *Dans la région splénique*: élancements rapides; serrement, surtout pendant le repos.

VENTRE. — Sensation de relâchement dans le ventre. — *Pincements dans le ventre*: pendant et après le déjeuner; avec besoin d'aller à la selle, bien qu'il ne sorte que des vents; *dans la région ombilicale*, aggravés en croisant les jambes; *dans le haut du ventre*, le matin, au lit, ou bien avec tranchées et aggravés pendant et après le repas, jusqu'à forcer à se tordre. — *Douleurs incisives dans le ventre* (tranchées): à diverses parties, avec pincements; dans tout le ventre, avec borborygmes douloureux et suivis d'une selle diarrhéique muqueuse. — Sensation de *chaleur* désagréable dans le ventre; *bouillonnement* fréquent, remontant du ventre dans la poitrine. — *Sensation de pesanteur*

dans le ventre qui presse vers le bas, après le déjeuner; sensation comme si on avait un fardeau sur le ventre, principalement sur l'ombilic et le creux de l'estomac, pire étant debout. — **Affections du système de la veine porte?* — *Hydropisie abdominale* (à la suite d'une fièvre intermittente avec constipation), avec gonflement très-volumineux du ventre, des pieds et de la face; ou bien avec induration du foie et asthme. — *Sensation de plénitude dans le ventre*, quelquefois avec borborygmes et émission de vents; *sensation de plénitude dans le côté droit*, avec gêne de la respiration et soulagement par des renvois et l'émission de vents (s); *tension* du ventre, surtout dans la région hépatique, le soir. — Mouvement de *flatuosité* dans le ventre; *borborygmes abondants dans le ventre*, quelquefois pendant le repas, ou bien après (avec élançements au-dessous du précord, ou bien avec pincement dans le ventre), ou encore principalement dans la région ombilicale; *émission de vents abondants*, quelquefois fétides (à la suite de borborygmes), ou bien le soir, précédée de pincements.

SELLES. — ANUS. — *Constipation*; point de selle le premier jour, ou bien elle ne vient que plus tard et est dure; la constipation habituelle diminue. — Selle seulement à la suite de besoins et de pincement; besoin d'aller à la selle, avec sensation de lassitude extrême, et avec évacuation difficile et rare; selle précédée de ténésme, dure, et ne s'évacuant qu'avec effort, avec douleur persistante de meurtrissure à l'anus; selle insuffisante. — *Selles dures*; dures et tardives, sèches, dures, difficiles, et seulement avec efforts; dures, noueuses, avec brûlement à l'anus, à la suite d'une constipation de deux jours; selles au total plus rares et plus fermes. — *Provoque des selles faciles* (s?), facilite les évacuations intestinales (s?); selles molles, ou bien aussi en bouillie les premiers jours; évacuations fréquentes, en bouillie (s); *Diarrhée* (s); quelquefois diarrhée, une fois constipation (s). — *Pendant la selle*: lassitude générale, fatigue au point de s'endormir, bâillement et accumulation d'eau dans la bouche; après la selle (molle), pression à l'anus. — *À l'anus*: tiraillement; picotement, vers le soir; *boutons hémorroïdaux* autour de l'anus, avec ténésme dans le rectum et nouvelle évacuation d'une selle liquide après chaque selle ferme.

VOIES URINAIRES. — Besoin d'uriner, avec tiraillements fréquents dans le gland qui parcourent tout le corps. — *Sécrétion d'urine augmentée* (s aussi); *émission d'urine plus fréquente et plus abondante*; il faut se lever la nuit pour uriner; pression sur la vessie, vers le matin, par l'accumulation de l'urine, qui est plus abondante. — *Urine, claire comme de l'eau*, et en même temps plus abondante et plus fréquente; jaune clair, avec odeur de violette;

brune, chaude et brûlante dans l'urèthre. — *Dans l'urèthre*, sensation continuelle, en étant assis, comme si une goutte y coulait; ardeur à l'orifice. — *Dans la région de la vessie*, pression comme par besoin d'uriner.

PARTIES GÉNITALES. — *Dans la verge*, gonflement d'un vaisseau lymphatique à la suite d'érections matutinales; tiraillements à la naissance de la verge, ou bien aussi au cordon spermatique droit et le long de la face interne de la cuisse. — Appétit vénérien diminué; chasse la lascivité et les rêves voluptueux (s); *érections* douloureuses, dans le sommeil du matin; *pollutions*, quelquefois pendant des rêves lascifs dans le sommeil du matin, ou bien deux, dans une nuit, sans en avoir conscience, pendant un sommeil profond. — *Règles trop hâtives*, de 6 jours, ou bien de 4 (avec douleurs crampoïdes dans le ventre). — Favorise les règles (s). — *Augmente le lait dans les seins* (s).

LARYNX. — **TOUX.** — *Voix* beaucoup plus étendue. — *Rudesse dans la gorge*: après la lecture à haute voix; dans le pharynx; dans le larynx, forçant à respirer profondément; avec grattement dans la gorge (s); sécheresse et grattement dans le pharynx et dans le haut de la poitrine; *enrouement*, le soir, ou bien aussi le matin, avec rudesse dans la gorge; sensation de plénitude dans le larynx, diminuée en renversant le tronc en arrière; besoin fréquent de toussoter; **Sensation continuelle de plénitude dans le larynx*, avec irritation de toux suffocante, parole gênée et toux fréquente avec expectoration. — *Toux par chatouillement dans la gorge*: quelquefois avec sensation d'oppression de poitrine; avec sensation de sécheresse brûlante dans la gorge; fréquente; sèche de temps en temps, ou bien par *mouvements courts*, avec ébranlement de la poitrine, de même que du ventre et de l'occiput; sèche, *aboyante*, douloureuse, provenant d'une toux déjà existante, avec expectoration facile à détacher; spasmodique, creuse et sèche, ou bien *excessive et menaçant de briser la poitrine, provoquée par un chatouillement dans le gosier*; *la toux sèche provenant d'une toux déjà existante et paraissant surtout selon les variations de l'atmosphère, disparaît complètement. — Excrétion de *mucosités* par la toux (qui était sèche auparavant?) et les mouvements sont plus vigoureux et plus longs; expectoration abondante de mucosités par une toux courte. — *Pendant la toux* ou la toussiculation, aggravation des douleurs de poitrine; **toux suffocante, sèche*, chez une personne hystérique, avec insomnie persistante et sensation rongearde de froid, dans l'estomac et le creux de l'estomac.

POITRINE. — **RESPIRATION.** — *Dyspnée*; respiration courte, gênée (s); *gêne de la respiration*, avec élancements dans l'aile du pou-

mon gauche, ou bien avec pression dans le creux de l'estomac; respiration rapide, par affluence et bouillonnement dans la poitrine; *besoin fréquent de respirer profondément*, surtout en étant assis replié sur soi-même; respiration comme insuffisante, en marchant et en se tenant debout à cause d'une constriction spasmodique dans les régions ombilicale et précordiale, avec besoin fréquent de respirer profondément; en respirant profondément, sensation comme si la respiration ne remplissait pas la poitrine. — *Asthme, gêne de la respiration ou de la poitrine* (s aussi): *comme si le bas de la poitrine était trop étroit, avec crainte de respirer profondément, parce qu'alors on éprouve chaque fois une secousse; forte, la nuit, tirant du sommeil, et forçant à se mettre promptement sur son séant, avec angoisse (s); fréquente, avec pesanteur sur la poitrine, besoin de respirer profondément, et soulagement momentané en bâillant et en s'étirant; comme par des exhalaisons corrosives, le soir au lit, avec toux suffocative, creuse; avec besoin continuel de se replier sur soi-même en étant assis, parce que sans cela tout gêne, comme si c'était trop étroit; comme si le thorax était trop étroit, comprimé ou resserré, surtout en étant assis replié sur soi-même, ou bien avec fréquente gêne constrictive dans la partie inférieure de la poitrine; sensation de constriction spasmodique dans la région des hypochondres, surtout à droite. — Oppression de poitrine, ou gêne de la respiration* (s aussi): *obligeant à respirer profondément* (s aussi), quelquefois avec besoin de bâiller et anxiété, ou bien soulagée en se levant après avoir été assis plié ou en effaçant le haut du corps; avec douleur sourde au-dessous du sternum; forte, avec gêne fréquente à des parties circonscrites de la poitrine; légère des deux côtés et au-dessous du sternum, suivie de sensation de chaleur à la paroi opposée de la poitrine. — *Sensation de plénitude dans la poitrine*: anxieuse; aggravée vers le soir; au-dessous du sternum et vers la clavicule gauche, avec besoin de respirer profondément; dans toute la poitrine, avec tressaillement léger et douleur de brisement dans la poitrine. — *Sensation de pesanteur sur la poitrine*: avec gêne de la respiration; *comme si on avait un quintal sur la poitrine, avec besoin d'écarter les vêtements*; le soir, avec sensation de plénitude dans le pharynx; en se promenant au grand air, comme si on avait un fardeau étranger sur la poitrine; périodique, augmentant et diminuant, avec serrement, oppression et augmentation de chaleur dans la poitrine. — Les symptômes de la poitrine sont soulagés lorsqu'on se met sur son séant, on ne peut supporter rien de serré sur le thorax (parce que cela gêne la respiration). — *Asthme convulsif*, quelquefois dans une affection organique du cœur; *accès de suffoca-*

tion, dans une hydropisie de poitrine; *hydropisie de poitrine*, avec gonflement général, anxiété, manque de respiration en étant couché, forçant à se mettre sur son séant, toux courte, sèche, grande faiblesse, envie de dormir irrésistible après midi et diminution des urines. — *Douleurs sourdes à la poitrine*, forçant à respirer profondément, à *gauche de la poitrine*, et peu après à droite aussi, mais n'y séjournant pas; respirer profondément aggrave la douleur sourde dans la poitrine. — *Douleur pressive dans la poitrine*: dans le milieu de la poitrine; au-dessous du sternum en appuyant la main dessus; des deux côtés de la poitrine, le matin, et aggravée en inspirant en haut; au-dessous du sternum, par le mouvement, avec tension; dans la partie supérieure de la poitrine, après s'être promené en plein air, avec faiblesse au point de s'affaïsser sur soi; *pression serrante*, à diverses parties de la poitrine, ou bien surtout dans la partie supérieure, avec oppression et besoin de bâiller et de s'étirer le haut du corps. — *Élancements dans la poitrine*: dans le côté droit de la poitrine, avec sensation persistante d'un tressaillement spasmodique, ou bien dans la partie inférieure de la poitrine, vers le dos (s), dans la région supérieure du cartilage des fausses côtes; aigu, au-dessous des petites côtes gauches; pleurétique, vers le milieu du sternum; serrant, dans la partie supérieure du sein gauche, avec oppression de toute la poitrine; sourde, depuis le côté gauche de la poitrine jusqu'à l'omoplate. — *Tiraillement* sourd dans la poitrine, le matin, au lit, pire après le lever. — *Bouillonnement dans la poitrine*: avec serrement et forçant à respirer vite; avec oppression, quelquefois après un exercice même modéré, ou bien suivi de douleurs crampoïdes à l'extérieur de la poitrine. — *Battement* douloureux, brûlant, dans la cavité droite de la poitrine, à une place limitée. — *Sensation de relâchement* dans la poitrine, depuis midi jusqu'au soir; *sensation de froid* dedans (s). — *Douleur de fatigue*, comme après une fatigue corporelle, au bas de la poitrine et aux parois du thorax, surtout à gauche, le matin après le réveil. — *A l'extérieur*, douleur rapide dans les muscles de la poitrine et du delta, se portant ensuite vers l'épaule, dans le repos.

Dos, REINS, etc. — Dans les *reins*, tiraillement vers les aines. — Dans le *dos*, douleurs dans la moelle épinière jusque dans la *cauda equina* et s'étendant jusqu'au sacrum; douleur crampoïde parcourant le dos dans diverses directions; brisement dans la région lombaire. — *Dans la nuque*, douleur en toussant; tiraillements et tension (quelquefois simultanément dans les épaules et les muscles du cou); picotement sous-cutané, qui peu à peu se fixe sous l'omoplate droite. — *Dans les muscles du cou*, tension,

quelquefois spasmodique, du côté droit. — *Sous l'aisselle droite*, élancements comme par un instrument pointu, aggravés en levant le bras et en appuyant le doigt.

EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES. — *Dans les épaules*, douleurs (s); sensation de paralysie dans l'articulation gauche. — *Dans les bras : tiraillements*, surtout partant de l'articulation du coude, ou bien avec tressaillement; déchirements errants, comme sur l'os, dans l'articulation de l'épaule et du coude droit, et plus tard tantôt dans le poignet, tantôt à d'autres parties; élancements déliés au-dessous du droit. — Grande fatigue du bras droit : — *Dans le haut du bras*, tiraillement et sensation de faiblesse; douleur crampe à l'extrémité inférieure; douleur de luxation au muscle triangulaire gauche, seulement lorsque le bras est plié. — *Dans le coude*, tiraillement sourd à la pointe. — *A l'avant-bras droit*, déchirement, suivi de sensation paralytique du petit doigt. — *Dans les mains*, tressaillement douloureux; *tiraillement dans la gauche*, quelquefois spasmodique dans l'articulation; tremblement des mains (s). — *Dans les doigts*, sensation de chaleur, suivie de faiblesse persistante de ces parties; déchirements dans le métacarpe des deux mains; prurit fourmillant aux doigts de la main gauche.

EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES. — *Dans les jambes*: grande fatigue; tremblement et lassitude; *lourdeur*, quelquefois surtout en marchant, avec tension dans les jarrets; *elles s'endorment fréquemment*, quelquefois en étant assis. — *Dans les cuisses*, brisement avec tension dans les jarrets, en se levant de son siège; tressaillement dans la cuisse gauche. — *Dans les jambes : sensation de stagnation de sang*, quelquefois en étant assis, avec lourdeur ou bien seulement dans la droite pendant le repos et avec tiraillements; douleur tiraillante dans la droite, avec sensation de roidisement, quelquefois remontant jusqu'à la hanche; tremblement dans la jambe gauche, l'après-midi; crampe dans le mollet gauche, en marchant. — *Dans les pieds*: douleur à la plante du pied gauche, pendant le repos, comme s'il avait sauté sur une pierre, se dissipant en appuyant le pied; froid aux pieds. — *Aux orteils*: prurit formicant (au pied gauche); douleur dans le gros orteil gauche, comme s'il était difforme et renversé en arrière, en appuyant le pied; douleur comme d'ulcération sous-cutanée, au-dessous de l'ongle (le 4^m).

129. — LAMUM ALBUM.

LAM. — Ortie blanche. — ARCHIVES DE STAPP. — Médicament encore peu connu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirements et tiraillements dans les membres. — Grande agitation de corps et d'esprit, avec tremblement des membres. — Ulcères avec douleur d'excoriation et élancements. — Frisson avec faiblesse générale ou avec anxiété. — Chaleur brûlante des deux joues, sans rougeur ni soif. — Soif continuelle, excepté pendant le frisson. — Grande tristesse, avec pleurs faciles à exciter. — Grande agitation et anxiété qui ne permettent de rester nulle part.

TÊTE, BOUCHE. — Mal de tête au centre du cerveau, aggravé lorsqu'on se redresse après s'être baissé. — Mal de tête aggravé en se levant de son siège, soulagé en étant assis. — Céphalalgie, comme si le cerveau était comprimé de tous les côtés, avec douleurs très-violentes dans le centre du cerveau. — Forte tension du cuir chevelu, surtout dans la région de la suture coronale. — Grande mobilité de la tête. — Diminution de la vue et de l'ouïe. — Renâchement de mucosités épaisses et de goût acide, qui se détachent du fond du gosier.

ESTOMAC, RÈGLES. — Après avoir bu ou mangé quoi que ce soit, douleur brûlante dans le milieu de la poitrine, ou dans l'œsophage. — Nausées et vomissements des aliments, avec chaleur, grande lassitude, fort accablement et obscurcissement de la vue. — Fort ballonnement du ventre. — *Pincements* dans le ventre, comme par des flatuosités retenues, non soulagés en les expulsant. — Forte agitation dans le ventre, comme si les règles allaient paraître avec violence. — Selle de la consistance de la bouillie, dure, avec écoulement de sang. — Envie pressante d'uriner, avec émission très-peu abondante. — Écoulement de sérosités par l'urèthre. — Règles trop hâtives. — *Leucorrhée*, quelquefois avec sensation mordicante aux parties génitales.

POITRINE ET MEMBRES. — Voix faible, mal assurée, comme par agitation morale. — Haleine qui manque en parlant, avec faiblesse de poitrine. — Pression anxieuse à la poitrine, avec nausées. — Torpeur et engourdissement formicant du dos de la main et de la partie charnue du pouce, aggravés par le toucher, avec sensibilité douloureuse de ces parties, comme si elles étaient à vif, en remuant la main. — Déchirement et tiraillement dans les doigts.


150. — LAUROCERASUS.

LAUR. Laurier-cerise. — HARTLAUB ET TRINKS. — *Doses usitées* : 3, 30. — *Durée d'action* : 6 à 8 jours quelquefois.

ANTIDOTES : Camph. coff. ipec. op.

COMPARER AVEC : Amm. canth. chin. coff. ipec. kal. merc. n-vom. op. rhus. sec. spig. veratr.

CLINIQUE. — On n'a jusqu'ici encore employé ce remède que contre : *Cyanose* (?) ; *Phthisie florissante* et *Choléra*.

 Voir la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tressaillements convulsifs et spasmes par accès*. — Inflammation des organes internes. — Tremblement, surtout des mains et des pieds, pendant l'exercice en plein air. — *Faiblesse subite, avec accablement nerveux, excessif*. — (*Apoplexie avec paralysie des membres*). — Évanouissements. — Douleurs tractives et déchirement dans les membres. — Manque d'énergie de la force vitale. — Convulsions épileptiques avec écume à la bouche. — Tétanos. — Aggravation des souffrances, le soir ; amélioration la nuit, et au grand air.

SOMMEIL. — *Bâillements fréquents*, souvent accompagnés d'horripilation avec chair de poule. — Envie de dormir insurmontable, le jour et le soir de bonne heure. — *Somnolence*, parfois comme un coma vigil. — Insomnie par surexcitation et accès de chaleur. — *Rêves pénibles et agités*.

FIÈVRES. — *Frissonnement et frissons fébriles*, ne se dissipant ni à la chaleur du feu ni à celle du lit. — Horripilation avec chair de poule, suivie de chaleur brûlante. — *Froid de tout le corps*, mais surtout des pieds, principalement au grand air. — Manque de chaleur naturelle. — Pouls faible, lent et irrégulier.

MORAL. — Abattement moral. — *Forte anxiété, appréhension et agitation* qui ne permettent de rester nulle part, ni de s'endormir le soir, mais qui se dissipent au grand air. — Répugnance pour le travail de l'esprit. — Promptitude et précipitation morale. — *Faiblesse de la mémoire*. — Incapacité intellectuelle. — *Esprit obtus et perte de connaissance*.

TÊTE. — *Étourdissement* avec chute et perte de connaissance. — *Ivresse et vertige*, avec envie de dormir. — *Vertiges* en se relevant après s'être baissé, ou en se levant de son siège, avec un voile devant la vue, ou avec sensation comme si tous les objets tour-

naient en rond. — Mal de tête stupéfiant et gravatif avec sensation comme si, en se baissant, le cerveau tombait en avant et se heurtait contre le crâne. — Mal de tête pressif, très-violent dans l'appartement. — Froid continu dans la tête. — Congestion à la tête, avec chaleur et battement. — Les maux de tête se dissipent par une sensation du froid au vertex, dans le front, la nuque et jusque dans les reins.

YEUX. — Douleur brûlante dans les yeux. — Sécheresse des yeux. — *Yeux largement ouverts ou à demi fermés, convulsés, proéminents et fixes. — Pupilles dilatées, immobiles. — Obscurcissement de la vue. — Tous les objets paraissent plus gros qu'ils ne le sont en effet.*

VISAGE. — *Teint pâle, blafard et gris. — Visage hâve, ou bouffi et gonflé. — Distorsion des traits. — Crampes de la mâchoire. — Tressaillements des muscles de la face. — Éruption autour de la bouche.*

BOUCHE. *Bouche sèche et pâteuse. — Écume à la bouche. — Sensation de froid sur la langue. — Perte de la parole.*

GORGE. — Mal de gorge, avec sensation douloureuse comme si elle était tirée en bas, pendant et hors le temps de la déglutition. — *Crampes dans le gosier et l'œsophage. — On entend le bruit que font les boissons pendant qu'elles descendent. — Déglutition empêchée ou gênée. — Sensation de froid, ou chaleur et douleur brûlante dans la gorge et dans le fond du palais.*

APPÉTIT. — Goût douceâtre, ou âcre et excitant. — *Soif ardente, avec sécheresse de la bouche. — Absence d'appétit avec répugnance pour tous les aliments. — Faim excessive.*

ESTOMAC. — Renvois à vide violents, ou avec goût des aliments. — *Fort dégoût, nausées et vomissement, même des aliments. — Vomissement de matières noires. — Pression à l'estomac. — Mauvais d'estomac, jusqu'à faire évanouir. — Grande angoisse dans la région précordiale. — Sensation de froid ou brûlement dans l'estomac et l'épigastre. — (Inflammation de l'estomac.)*

VENTRE. — Coliques au-dessous de l'ombilic comme si on coupait les intestins. — Sensation d'un gonflement de la grosseur d'une noix, dans le côté gauche du bas-ventre. — *Tranchées, crampes et contractions dans le ventre. — Sensation de froid, ou chaleur et brûlement dans le ventre. — (Inflammation des intestins.) — Coliques flatulentes. — Borborygmes, grondement et gargouillement dans le ventre et l'estomac. — Pincement dans la région ombilicale.*

SELLES. — *Constipation. — Selles dures, tenaces, avec efforts. — Diarrhées avec ténesme, douleurs incisives et brûlement à l'anus. — Diarrhées de mucosités verdâtres, avec contraction dans*

les aines. — *Selles involontaires*. — Paralyse du sphincter de l'anüs.

URINES. — *Rétention d'urine*. — Urine aqueuse, jaune pâle. — Urine écumeuse, âcre. — Sédiment épais, rougeâtre, dans les urines. — *Emission involontaire des urines*. — Paralyse de la vessie. — Pendant l'émission des urines, douleur dans la région de l'estomac.

PARTIES GÉNITALES. — Exaltation de l'appétit vénérien. — Gangrène des parties génitales. — *Règles trop hâtives* et trop abondantes. — Pendant les règles, déchirement dans la tête, odontalgie et tranchées.

LARYNX. — *Enrouement, âpreté et grattement dans la gorge et le pharynx*. — Sensation de gonflement du pharynx. — Voix grave de basse-taille. — *Constriction spasmodique de la trachée-artère*. — *Petite toux courte*, provoquée par un chatouillement et un grattement dans la gorge. — *Expectoration gélatineuse*, abondante, avec petits points de sang.

POITRINE. — *Respiration lente, faible, anxieuse*. — *Respiration râlée*, ronflante. — La respiration est arrêtée dans la région de l'estomac. — *Respiration asthmatisque*, comme si les poumons ne pouvaient pas assez se dilater, ou comme par paralysie des poumons. — Pression à la poitrine. — *Constriction de poitrine*, avec oppression. — Brûlement et élancements dans la poitrine. — Douleurs dans la région du cœur. — *Battement du cœur, irrégulier et lent*.

MEMBRES. — Tiraillements aigus et élancements dans les épaules et les bras. — Sensation brûlante dans les mains, avec gonflement des veines à ces parties. — Tremblement des mains. — Peau sèche et râpeuse, entre les doigts. — Tiraillements aigus et élancements dans les genoux. — Engourdissement des pieds.

131. — LEDUM PALUSTRE.

LED. — Romarin sauvage. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 15, 30. — *Durée d'action* : 6 à 7 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.


ANTIDOTE : Camph.

COMPARER AVEC : Alum. ars. bry. canth. cham. lyc. merc. puls. rhus. sep. thui.

— Ce médicament convient quelquefois après lyc. — Après ledum conviennent quelquefois : chin. sep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections arthritiques et rhumatismales ; Nodosités arthritiques ;

Affections hydropiques; Dartres et autres éruptions chroniques; Anasarque; Furoncles; Coma somnolent?; Céphalalgie congestive?, rhumatismale?; Ophthalmies rhumatismales et arthritiques?; Durété de l'ouïe (par refroidissement de la tête pour s'être fait couper inopportunément les cheveux); Dartres et autres éruptions à la face; Hémorrhagie nasale et buccale?; Ascite?; Diabète?; Gonorrhée chronique?; Laryngite chronique (Phthisie laryngée)?; Toux convulsive; Coqueluche?; Phthisie pulmonaire?; Pneumonie chronique?; Podagra?, etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — **Douleurs arthritiques, pressives, et tiraillantes aiguës*, ou simplement pressives, dans les membres, *aggravées le soir à la chaleur du lit*. — Engourdissement et sensation de torpeur dans quelques membres. — *Douleurs dans les articulations*, déchirantes ou lancinantes, pulsatives et paralytiques, *aggravées par le mouvement*. — Les douleurs dans les articulations sont les seules qui s'aggravent par le mouvement; il n'en est pas de même des autres. — *Nodosités gouteuses* dans les articulations. — *Gonflements durs*, chauds, tendus, *avec douleurs déchirantes*. — **Gonflements hydropiques* de quelques parties, ou de toute la peau du corps. — *Froid et manque de chaleur vitale*. — *La chaleur du lit est insupportable*, et provoque de la chaleur et un brûlement dans les membres.

PEAU. — Prurit et rongement à la peau, avec brûlement après s'être gratté. — *Démangeaison rongante*, comme par des poux. — Éruptions miliaires. — Éruptions comme la clavelée, avec desquamation. — Taches bleuâtres sur le corps, comme des pétéchies. — **Dartres sèches, furfuracées, excessivement pruriantes*. — **Furoncles*. — *Forte envie de dormir le jour, comme si on était ivre*; sorte de somnolence, avec grand désir de se coucher. — *Insomnie nocturne*, avec jactation inquiète, tressaillements, *visions et images fantastiques en fermant les yeux*. — Rêves agités, anxieux. — Rêves lascifs, avec émission de sperme.

FIÈVRE. — *Frisson violent et horripilation, avec froideur des membres*. — Chaleur aux pieds et aux mains, le soir. — Fièvre le soir, avec douleur dans la tête et les yeux. — **Sensation de forte chaleur, alternant avec sueurs*. — *Sueur facilement excitée par la marche*, surtout au front, et parfois d'une odeur acide.

MORAL. — Anxiété. — Disposition à s'effrayer. — Disposition à se fâcher et à s'emporter. — Sérieux imperturbable. — *Humeur morose et chagrine*. — Misanthropie. — Démence.

TÊTE. — Ivresse. — Vertige étourdissant, capable de faire tomber

en avant ou en arrière, aggravé en se baissant ou en se promenant au grand air. — Tête entreprise, avec ébranlement douloureux du cerveau en faisant un faux pas. — * *Maux de tête stupéfiants*. — Mal de tête pressif, comme s'il y avait un poids qui déprimât tout le cerveau. — Déchirement dans la tête et les yeux, qui sont enflammés, avec fièvre le soir. — * *Violentes douleurs pulsatives dans la tête*. — Impossibilité de supporter une coiffure quelconque. — Démangeaison comme si des poux rampaient sur le cuir chevelu et le front. — Refroidissement facile des téguments de la tête.

YEUX. — Prurit dans les angles internes des yeux. — *Pression dans les yeux*, surtout le soir, parfois avec brûlement. — *Inflammation des yeux*, avec agglutination et douleurs déchirantes. — *Larmoiement brûlant des yeux*. — *Pupilles dilatées*. — Trouble de la vue, avec scintillement devant les yeux.

OREILLES. — Bruit dans les oreilles. — *Tintement dans les oreilles*. — * *Durété de l'ouïe*, comme par obturation des oreilles.

NEZ. — Nez douloureux au toucher. — Brûlement violent dans le nez. — Saignement de nez.

VISAGE. — P^hleur du visage. — * *Face bouffie*, tantôt rouge, tantôt pâle. — * *Rougeur et éruptions tubéreuses au visage et au front*, comme chez les ivrognes, avec douleur lancinante au toucher. — * *Dartres sèches et furfuracées, au visage*, avec brûlement au grand air. — * *Boutons et furoncles au front*. — Douleurs violentes et déchirantes dans le visage, la nuit, alternant avec lancements dans une dent, et se terminant par horripilation, suivie d'un profond sommeil. — Glande enorgée, au-dessous du menton.

BOUCHE ET GORGE. — Exhalaison d'une odeur fétide par la bouche. — Hémorrhagie buccale. — Mal de gorge, avec douleur lancinante, pendant et hors le temps de la déglutition. — Sensation comme s'il y avait une cheville dans la gorge, avec élancements en avalant.

APPÉTIT. — Goût de moisi, ou amertume dans la bouche. — Forte soif d'eau froide. — Absence d'appétit et prompt satiété. — En mangeant vite, douleur contractive dans le sternum. — *Nausées* avec envie de vomir en crachant. — *Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites*, avec douleurs crampoïdes dans le ventre.

ESTOMAC. — **URINES.** — *Pression à l'estomac pour peu qu'on ait mangé*. — *Maux de ventre* comme si les intestins étaient meurtris. — Douleur tractive dans le ventre. — Tranchées dans le ventre, le soir. — *Maux de ventre dysentériques*. — Expulsion fréquente de vents. — Constipation. — Diarrhée d'excréments

mêlés de mucosités et de sang. — *Envie fréquente d'uriner, avec émission peu abondante.* — Diminution de la sécrétion des urines. — *Émission fréquente et abondante d'urines.* — Gonflement de l'urèthre.

PARTIES GÉNITALES. — Érections violentes et de longue durée. — *Pollutions* de sperme sanguinolent ou séreux. — Inflammation du gland. — *Règles trop hâtives, et trop abondantes.*

LARYNX. — Chatouillement au larynx. — *Toux précédée de suspension suffocante de la respiration.* — Toux spasmodique, fatigante, qui ressemble à la coqueluche. — *Toux avec expectoration purulente, surtout le matin ou la nuit.* — Expectoration verdâtre et d'odeur fétide, par la toux. — *Toux creuse, ébranlante, avec expectoration d'un sang rouge vif.

POITRINE. — Respiration gênée et douloureuse. — *Respiration spasmodique et sanglotante, comme après avoir pleuré amèrement.* — Respiration gênée en montant un escalier. — **Oppression constrictive de la poitrine, aggravée par le mouvement et la marche.* — Douleur dans la poitrine en respirant, comme s'il y avait dedans quelque chose de vivant. — Élançements dans la poitrine, surtout en élevant les bras ou en les remuant. — Éruption sur la poitrine, ressemblant à la clavelée. — **Démangeaison rongearde à la poitrine, avec taches rouches et miliaires.* — *Douleur d'excoriation sous le sternum.

TRONC. — *Roideur douloureuse dans le dos et les lombes, après avoir été assis.* — Déchirement depuis les reins jusque dans l'occiput, surtout le soir. — Violente douleur crampoïde au-dessus des hanches, le soir, avec suspension de la respiration.

BRAS. — *Déchirement et tiraillement pressif dans les bras.* — Élançements dans l'épaule, en élevant les bras ou en les remuant. — *Douleur pressive dans les articulations de l'épaule et du coude, aggravée par le mouvement.* — Éruption comme la clavelée, aux bras. — Douleurs déchirantes dans les mains et les doigts. — *Nodosités arthritiques aux articulations des mains et des doigts.* — Moiteur de la paume des mains. — Miliaire pruriant au poignet. — Tremblement des mains en les remuant ou en saisissant un objet.

JAMBES. — *Douleur rhumatismale, paralytique, à l'articulation coxo-fémorale. — *Douleur de brisement et d'excoriation dans le périoste de la cuisse et dans les genoux.* — *Roideur tensive du genou, avec craquement et fléchissement en marchant.* — Tension crampoïde dans les genoux, les mollets et les talons. — Faiblesse et tremblement des genoux, en étant assis et en marchant. — **Gonflement dur et tendu du genou, avec élançements et douleurs nocturnes, pressives et déchirantes, et dureté de toute la*

jambe. — *Gonflement de la jambe*, au-dessus et au-dessous du genou, avec chaleur et douleur lancinante tractive. — Roideur des pieds. — Douleur à la plante des pieds, en marchant, comme si elle était écorchée. — **Gonflement inflammatoire, ou même œdémateux, des jambes et des pieds*. — Douleur incisive dans les orteils, la nuit, pendant le sommeil. — *Gonflement de la partie charnue du gros orteil*, avec douleur en appuyant le pied.

132. — LOBELIA INFLATA.

LOBEL. — Lobélie inflata. — Hygée XV. — *Durée d'action*, courte (d'après Noak.)
 COMPARER : 1 *Asar.* coc. hyosc. ipéc. ran-sc. tabac. — 2 alum. ars. chel. sass. veratr. zinc. 3) *Arum?* con. croton. euphorb. iod. mez. stram.
 ANTIDOTE : Ipec.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Semble agir principalement sur les nerfs de la poitrine et de l'abdomen, mais principalement sur la membrane muqueuse des bronches.* — Elancements par tout le corps, jusque dans le bout des doigts et des orteils; *tremblement* des membres, comme aussi de tout le corps; *sensation d'accablement; lassitude inaccoutumée; faiblesse persistante; épuisement*; état narcotique; *convulsions*, quelquefois telles, qu'il faut deux hommes pour le tenir, suivies de mort; forts *tressaillements convulsifs*, suivis de mort. — A la *peau*, éruption de vésicules. — *Sommeil agité, avec affluence de rêves*, quelquefois anxieux; *rêves pénibles*; nombreux sans qu'on se réveille. — *Froid* de tout le corps; chaleur avec disposition à la transpiration, surtout à la face; *disposition à la transpiration et à la sueur abondante; sueur froide.* — *Pouls*: accéléré; fréquent et plus souple que d'habitude; le soir, lent (après une dose plus forte). — ° *Fièvre intermittente*: ° commençant à midi, avec grande pâleur et anorexie; ° *quotidienne*, quelquefois tous les matins à dix heures; *d'abord violent frisson* alternant, avec chaleur modérée jusqu'à midi, *puis prédominance de chaleur*, avec légère horripilation jusqu'au soir; avec cela sueur nocturne abondante, forte soif par accès (surtout pendant le frisson), respiration courte, anxieuse, gênée et haletante, avec sensation de constriction dans la poitrine, sensation de faiblesse et d'oppression dans le creux de l'estomac et dans toute la poitrine; chatouillement dans le larynx, avec quintes fréquentes d'une toux courte; violente céphalalgie frontale, anorexie pendant et après l'accès, langue blanche,

chargée d'un enduit épais du côté droit, et grande faiblesse. — *Moral* inquiet; grand accablement et épuisement; pressentiment de mort et dyspnée.

TÊTE. — État souffrant du cerveau; étourdissement; vertige. — *Embarras*: d'abord dans l'occiput, puis dans le front; dans la tête après le repas, s'aggravant jusqu'à devenir une violente pression, avec chaleur du visage. — Pesanteur de la tête, avec lassitude dans le dos. — *Céphalalgie*: surtout par le mouvement et en montant un escalier, principalement dans le vertex; avec vertige et élancements dans les tempes; douleur sourde et chaleur à l'occiput, le soir; ° violente, dans le front, d'une tempe à l'autre (pendant la fièvre). — *Tension dans la tête, le soir*, surtout dans l'occiput, ou bien avec chaleur de la face. — *Pression dans l'occiput*, quelquefois surtout au grand air, ou bien diminuée en se couvrant la tête.

YEUX ET FACE. — Dans les *yeux*, brûlement; (hémypopie). — *Chaleur de la face*; *sueur à la face*, avec nausées.

BOUCHE — GORGE. — *Accumulation de salive*; expectoration fréquente de salive très-aqueuse; *salivation abondante*. — ° *Langue blanche*, chargée d'un enduit épais, seulement du côté droit. — *Dans la gorge, grattement*: se transformant en pression et en nausée; *suivi de vomiturition*, avec serrement et haut-le-cœur dans le larynx; avec renvois et brûlement, remontant de l'estomac; avec sensation comme si la gorge était à vif, et constriction dans l'œsophage; *avec grande sécheresse*, qu'on ne peut dissiper en buvant, après le repas. — *Brûlement dans la gorge*: *se transformant en grattement*; *secrétion augmentée de salive visqueuse*, *avec grattement, nausées et renvois*; grattement brûlant, depuis le voile du palais jusque dans le larynx, aggravé en avalant et avec *rendement fréquent*, *par accumulation plus abondante de mucosités dans la gorge*; brûlement, *se transformant en sécheresse*, toute la matinée. — *Mucosités visqueuses dans la gorge*. — *Pression dans l'œsophage*: *avec nausées*, pincement dans le ventre et émission de vents fétides; *tout le long de l'œsophage, jusque dans l'estomac, pire à certaines parties, et surtout au-dessous du larynx*. — ° *Déglutition gênée, comme par un corps étranger*; ° en avalant, sensation comme si quelque chose montait dans le larynx et empêchait les aliments de descendre.

APPÉTIT — SYMPTÔMES GASTRIQUES. — *Goutt acré*, brûlant dans la bouche; ° *amer*, avec langue chargée et soif. — ° *Anorexie*. — *Renvois fréquents, avec accumulation d'eau dans la bouche*; ° *réurgitation* fréquente d'un liquide acide et brûlant; ° *aigreurs* dans l'estomac, avec sensation de constriction dans le creux de l'estomac. — *Hoquet fréquent et violent, avec accumulation*

d'eau abondante. — **Pyrosis*, °quelquefois continue, °ou bien avec accumulation de salive. — **Dégoût* fort et continu, avec horripilation et grelottement; *relâchement d'estomac*, quelquefois avec dégoût ou bien avec sensation de mouvements antipéristaltiques (cependant sans nausées). — **Nausées*: °le matin, se dissipant après avoir pris une gorgée d'eau; avec *sueur froide de la face*; **forte envie de vomir*, sans vomissements. — *Vomissements*: de toutes natures, même des plus violents; avec soupirs et nausée persistante; °vomissement des aliments après le repas, surtout des chauds. — **Dyspepsie*.

ESTOMAC — VENTRE. — *Maux d'estomac*; **sensation de faiblesse dans l'estomac*, °ou bien dans le creux de l'estomac, avec oppression qui de là s'étend dans toute la poitrine. — **Pression dans l'estomac*: °quelquefois pour peu que l'on mange; après le repas, avec plénitude et glouglou dans le ventre; °remontant vers la poitrine, que ça oppresse, avec nausées, accumulation d'eau dans la bouche, et vomiturition. — **Pression dans le creux de l'estomac*: °à travers le corps jusque dans la moelle épinière, comme par une cheville, par mouvements rémittents et revenant toujours plus forts; comme par un fardeau; °à jeun et après le repas, aggravée surtout le soir; avec cela, vomissement de bile avec oppression et angoisse dans la poitrine et douleurs de reins. — *Constriction forte et douloureuse dans la région du cardia.* — **Crampes d'estomac de diverses natures.* — *Maux de ventre*: aggravés après chaque repas; avec *céphalalgie*, en rentrant de la promenade, après le repas; *tranchées et tiraillements dans le ventre*; pincements et torsions, avec nausées, renvois violents et émission de vents fétides. — *Ballonnement du ventre avec dyspnée*; *flatuosités et émission abondante de vents*, avec borborygmes dans le ventre, qui quelquefois sont douloureux.

SELLES — PARTIES GÉNITALES. — *Selles*, en bouillie, molles, vertes; *diarrhée*, quelquefois avec selles fréquentes et embarras de la tête. — *Sécrétion d'urine augmentée*, quelquefois avec besoin; *fréquente émission d'urine*, même la nuit et la matinée suivante (sécrétion d'urine diminuée); urine nuageuse, avec énéorème; °rouge foncé, avec *sédiment rouge épais*; °se troublant facilement, avec sédiment rose et petits cristaux bleus. — Dans les parties génitales, pesanteur fatigante.

LARYNX — TOUX. — °Chatouillement dans le larynx, avec fréquents accès de toux courte; °sécheresse dans la gorge, avec sensation comme si un corps solide y gênait la respiration et la déglutition. — Irritation qui force à tousser, provoquant l'expectoration.

POITRINE — TOUX. — °Respiration anxieuse, difficile, haletante,

avec sensation de resserrement dans la poitrine; respiration courte, superficielle, avec sensation de plénitude sur la poitrine; en inspirant, chatouillement dans la région inférieure du sternum; en respirant profondément, diminution de la douleur pressive dans le creux de l'estomac et sensation d'un bien-être plus grand. — *Manque de respiration quelquefois avec respiration gênée, accélérée, et besoin plus fréquent de respirer profondément*; grande difficulté de retenir son haleine. — *Oppression de poitrine, obligeant à respirer profondément*; *asthme*, principalement avec symptômes gastriques et sensation de faiblesse dans le creux de l'estomac; *dyspnée*, quelquefois avec *pressentiment de mort*; *gêne de la respiration*, après la moindre fatigue, après s'être lavé à l'eau froide, comme aussi par le courant d'air et par des aliments lourds. — *Symptômes asthmatiques*; *asthme hystérique*. — *Violentes douleurs de poitrine*: aggravées en respirant profondément; au retour de la promenade, après le repas. — Tension dans la poitrine, en retournant le tronc; *douleur brûlante d'excoriation à une plaie circonscrite*, au-dessous du sein droit, avec sensation en respirant profondément, en éternuant et par un mouvement rapide du corps, *comme s'il y avait là quelque chose de démis*, qui au milieu de la douleur se remît à sa place, avec sensation pareille dans le creux de l'estomac et le côté gauche, *douleur perforante à une partie limitée de la poitrine*, s'étendant quelquefois jusques au dos et à l'omoplate; aggravée par le mouvement et avec sensation de paralysie à la partie douloureuse.

Dos — MEMBRES. — Dans le dos: lassitude, avec tête lourde; brûlement et douleurs incisives au bas de l'épine dorsale; maux de reins; serrement crampoïde violent, dans la partie postérieure de la région iliaque, avec impossibilité presque complète de supporter le toucher ou le mouvement. — Dans les jambes: lassitude; déchirement aigu dans l'os du mollet, jusque dans l'articulation du genou; crampes dans le mollet, le matin, au réveil d'un sommeil agité.

133. — LYCOPodium.


LYC. — Lycopode, Pied-de-loup. — HAHNEMANN. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 40 jours, dans plusieurs cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Camph. puls.

COMPAREZ AVEC: Ambr. amm. ars. bell. bry. calc. canth. caps. carb-veg. caus. cham. cic. con. graph. led. magn. mag-m. mang. merc. mur-ac. natr-m. nitric-ac. n-vom. plat. phos. phos-ac. puls. rhod. rhus. sep. sil. staph. sulf. thuy. — C'est

surtout après : *Calc. et silic.*, que ce médicament convient, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le lycopode, conviennent quelquefois : *Graph. led. phos. puls. silic.*

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections, principalement des personnes (et surtout des femmes) d'un caractère doux, portées à la mélancolie, ou d'une constitution lymphatique, ou même leucophlegmatique, avec disposition à prendre des rhumes de cerveau, des catarrhes pulmonaires et autres écoulements muqueux; *Engorgement des glandes*; Suites fâcheuses de l'abus du mercure; affections rhumatismales et arthritiques, même avec gonflement et nodosités goutteuses; Inflammations aiguës et chroniques; Crampes et convulsions?; Épilepsie?; Affections scrofuleuses et rachitiques; Inflammation, déviation, carie et autres maladies des os, même celles provenant de l'abus du mercure; Paralyse?; Affections hydropiques; Atrophie (des enfants scrofuleux?); Excoriation de la peau; Dartres et autres éruptions chroniques de différentes espèces; Ulcères invétérés et fistuleux; Varices; Anévrismes; Ulcères par l'abus du mercure; Furoncles; *Fèvre typhoïde*; Céphalalgie, même à la suite d'une colère; *Céphalalgie rhumatismale*; Migraine?; *Teigne*; Calvitie; Ophthalmies scrofuleuses?, rhumatismales?, arthritiques?; Amblyopie amaurotique, Fongus médullaire aux yeux?; *Coryza chronique ou aigu*; *Otite et otorrhée*, surtout à la suite de la scarlatine, ou chez des individus scrofuleux; Névralgie faciale; Disposition à des érysipèles à la face; Dartres et autres éruptions faciales; Croûte de lait?; *Angines chroniques*, même avec ulcération, et surtout après avoir fait abus du mercure; Odontalgies rhumatismales; Fistule aux gencives?; Dyspepsie, gastralgie et autres *affections gastriques*; Squirrhe (cancer?) de l'estomac; Hépatite chronique; Coliques flatulentes; Ascite?; *Inertie des intestins et constipation opiniâtre*; Calculs rénaux et gravelle; Hématurie, Incontinence d'urine; Orchite; Induration des testicules?; Gonorrhée secondaire?; Dysménorrhée; Souffrances chlorotiques; Varices et constipation des femmes enceintes; Disposition à l'avortement, avec varices aux parties?; Excoriation des mamelles; Excoriation et constipation des nouveau-nés; Catharre chronique; Grippe; *Pneumonie chronique*; *Souffrances phthisiques*; (Phthisie tuberculeuse); Hémoptysie; Goutte; Goutte aux mains; Gonite arthritique, ou scrofuleuse; Tumeur blanche?, etc., etc.

 *Voy. la note, page 47.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — **Tractions et déchirements* dans les membres, le plus souvent *la nuit et pendant le repos*, quelquefois aussi l'après-midi, tous les deux jours, et surtout par un temps venteux ou pluvieux, soulagés par la chaleur. — **Douleurs lancinantes* dans les parties internes et externes. — **Roideur douloureuse des muscles et des articulations*, souvent avec *torpeur et insensibilité des membres*. — **Engourdissement des membres*. — **Grande facilité à se donner un tour de reins*, qui souvent est suivi de roideur de la nuque. — **Crampes et contraction des membres*. — **Extension et rétraction spasmodiques* et involontaires de quelques muscles ou de quelques membres. — **Secousses et tressaillement de quelques membres ou de tout le corps*, pendant le sommeil et la veille. — Crampes dans les parties internes et externes, même la nuit. — Attaques d'épilepsie, quelquefois avec cris, écume à la bouche et grande angoisse de cœur. — **Gonflements hydropiques* et inflammatoires. — **Varices*. — **Nodosités arthritiques*. — Gonflement des glandes. — **Inflammation des os, avec douleurs nocturnes*. — **Déviation et ramollissement des os*. — **Ulcération des os*. — Les symptômes sont aggravés fréquemment vers quatre heures après midi, et recommencent à s'améliorer vers huit heures du soir, à la faiblesse près. — Affections périodiques. — Ébullition de sang par tout le corps, surtout le soir, avec agitation et tremblement. — Sensation, comme si la circulation du sang était suspendue. — **Faiblesse intérieure*. — Grande susceptibilité nerveuse. — **Faiblesse et lassitude dans les membres*, sensible principalement *pendant le repos*, ou le matin au réveil. — Après une promenade très-courte, fatigue, surtout dans les jambes, et sensation brûlante aux pieds. — Crainte du mouvement et désir continuel d'être couché. — **Prostration totale des forces, avec mâchoire pendante, yeux voilés et à demi fermés, et respiration lente par la bouche*. — **Grand amaigrissement*, aussi chez les enfants. — **Accès de défaillance*, surtout le soir, et quelquefois même en étant couché, avec perte des sens, obscurcissement de la vue et grande indifférence. — Tremblement des membres. — **Manque de chaleur vitale*. — **Grand désir ou forte répugnance pour le grand air*, avec sensibilité excessive à l'air frais. — **Forte disposition à se refroidir*.

PEAU. — **Rongement et prurit, le jour, en s'échauffant*, ou le soir avant de se coucher. — Tendance de la peau à se gercer facilement. — **Éruptions douloureuses*. — Éruptions urticaires. — Grandes taches rouges sur la peau. — **Taches hépatiques, pruriantes*. — Éphélides abondantes. — **Dartres insensibles d'un brun jaunâtre, ridées ou humides, purulentes*, pleines de crevasses profondes et de croûtes épaisses. — **Gros furoncles*, qui

reviennent périodiquement. — **Ulcères saignants*, avec douleur lancinante et brûlement pendant le panséement, ou avec déchirements nocturnes et prurit. — *Ulcères fistuleux à bords calleux*, rouges, renversés et luisants, quelquefois avec inflammation et gonflement de la partie affectée. — **Plaques excoriées à la peau*, chez les enfants. — **Verrues*. — *Engelures*. — **Grande sécheresse de la peau*.

SOMMEIL. — **Bâillements fréquents et quelquefois avortés*. — **Envie de dormir le jour*, et le soir de bonne heure, avec *sommeil tardif*, par affluence d'idées et forte surexcitation nerveuse. — *Sommeil agité et inquiet, avec rêves anxieux, effrayants, et réveil fréquent avec effroi*. — *Rêves voluptueux, vifs, tristes; rêves de meurtres ou des occupations de la journée*, etc. — *Tressaillements, cris, sursauts avec effroi, ou éclats de rire, ou pleurs et gémissements, pendant le sommeil*. — **La nuit, tressaillement et inquiétudes dans les jambes, mal à la tête, angoisse, cauchemar, ébullition de sang et battement de cœur*, mal à l'estomac, coliques, souffrances asthmatiques, etc. — *Difficulté de rester couché sur le côté gauche, à cause de battements de cœur et d'élancements*. — *Impossibilité de rester couché, la nuit, parce qu'on ne se trouve bien dans aucune position*.

FIÈVRE. — *Frisson le soir*, quelquefois d'un seul côté, ou tous les deux jours, avec chaleur, ou suivi de sueur sans chaleur. — **Manque de chaleur vitale*. — **Fièvre tierce*, avec vomissements acides et bouffissure de la face et des mains après le frisson. — *Chaleur fugace*. — *Chaleur brûlante, avec respiration courte*. — **Fièvre maligne, avec méchanceté et mauvaise humeur en s'éveillant, ou avec surexcitation nerveuse, sans chaleur à la tête ni rougeur du visage, rougeur circonscrite des joues, grande faiblesse, sueurs qui ne soulagent pas, langue rouge et sèche et constipation*. — **Fièvre lente, avec sueurs nocturnes, visqueuses*. — **Fièvre avec prostration de toutes les forces, mâchoire inférieure pendante, yeux voilés et à demi fermés, et respiration lente avec bouche ouverte*. — *Sueur, principalement à la face, facile à exciter le jour par un léger exercice*. — *Sueur fébrile le jour*. — *Sueur nocturne, souvent fétide ou gluante, principalement à la poitrine et au dos*.

MORAL. — **Mélancolie taciturne et humeur chagrine*; on désespère de son salut éternel. — **Angoisse*, surtout dans la région de l'épigastre, avec *mélancolie et disposition à pleurer*, surtout après s'être fâché, ou à l'approche d'autres personnes. — *Misanthropie*. — **Crainte de la solitude*. — **Irritabilité et susceptibilité, avec pleurs*. — *Irascibilité*. — **Opiniâtreté*. — *Aliénation et fureur, qui se manifestent par l'envie, les reproches, l'arrogance et le*

despotisme. — **Caractère doux, soumis.* — Indifférence complète. — Aversion pour la parole. — **Fatigue par des efforts intellectuels et impossibilité de se livrer à des travaux de tête.* — Étourdissement. — Impossibilité de s'exprimer correctement; on se trompe de mots et de syllabes. — Parole embrouillée.

TÊTE. — Étourdissement et vertiges, comme par ivresse. — **Vertige* tournoyant, surtout *en se baissant*, ou dans un appartement chaud, avec envie de vomir. — °Mal de tête à la suite d'une émotion fâcheuse. — °Mal de tête avec disposition à s'évanouir et grande agitation. — *Mal à la tête avec vertiges. — *Pesanteur de la tête. — Mal à la tête en la secouant, et en la tournant, comme aussi à chaque pas que l'on fait. — Céphalalgie au-dessus des yeux, immédiatement après le déjeuner. — Mal de tête semi-latéral le soir, aggravé jusqu'à devenir insupportable, par le travail intellectuel. — **Maux de tête pressifs*, quelquefois comme si on enfonçait un clou dans la tête, ou avec tension qui augmente en étant couché. — **Maux de tête déchirants*, surtout *l'après-midi ou la nuit*, principalement *dans le front*, mais souvent aussi dans toute la tête, les yeux, le nez, et jusque dans les dents, avec besoin de se coucher. — Maux de tête lancinants. — Battement dans la tête, le soir, après s'être couché. — **Congestion à la tête*, avec chaleur de cette partie, quelquefois le matin en se redressant dans le lit. — Commotion et résonnement dans le cerveau, à chaque pas. — Térébration, râclément et *déchirement* au cuir chevelu, surtout *la nuit*. — Mouvements involontaires et tremblements convulsifs de la tête. — Forte disposition à se refroidir la tête. — **Éruption à la tête*, °avec *suppuration* abondante et fétide, *quelquefois avec engorgement des glandes de la nuque et du cou. — Les cheveux deviennent gris. — **Calvitie*.

YEUX. — **Pression dans les yeux.* — **Brûlement rongeant et élanements dans les yeux* (et les paupières), surtout *le soir*, à la lumière. — °*Cuisson dans les yeux.* — Sensation de froid dans les yeux, le soir. — **Inflammation des yeux* et des paupières. — Orgelet. — **Agglutination des paupières surtout la nuit*, et *larmoiement*, principalement *le jour* et au vent froid. — **Chassie* aux yeux, qui empêche de voir. — **Tressaillement des paupières.* — *Trouble de la vue*, comme par du duvet. — Myopie, ou **presbyopie*. — Hémypopie verticale. — Confusion des caractères, en lisant. — **Obscurité*, taches noires, scintillement et étincelles devant les yeux. — **Éblouissement et irritation des yeux*, le soir à la lumière.

OREILLES. — Otalgie au grand air. — Congestion aux oreilles. — Ulcération des oreilles. — *Écoulement par les oreilles.* — **Sensibilité excessive de l'ouïe* au moindre bruit; les sons de la musi-

que fatiguent. — *Tintement et bruissement *dans les oreilles*. — *Dureté de l'ouïe. — °Croûtes suintantes sur et derrière les oreilles.

NEZ. — *Narines ulcérées, croûteuses, obstruées par des mucosités, la nuit. — Gonflement du nez, avec écoulement âcre, fétide et corrosif. — Mouvements convulsifs des muscles du nez. — Mouvement de sang et *épistaxis. — *Sensibilité excessive de l'odorat*. — *Coryza, presque de toutes sortes. — *Coryza sec avec obturation du nez, embarras de la tête et douleur brûlante dans le front. — *Obturation des narines, surtout la nuit, qui ne permet de respirer que par la bouche.

VISAGE. — Pâleur du visage, augmentant le soir. — *Face jaune, terreuse, avec rides profondes, cercles bleus autour des yeux et lèvres bleuâtres. — °Rougeur circonscrite des joues. — Face rouge, bouffie, avec éruptions et taches rouges. — °Gonflement et tension de la face. — Déchirement dans les os de la face. — °Sensation douloureuse de froid au visage. — Tressaillements et mouvements convulsifs dans les muscles de la face. — *Accès fréquents de chaleur fugace à la face. — *Éruptions à la face, parfois avec prurit. — *Éphélides. — *Dartres à la face, furfuracées, et à fond jaunâtre. — Lèvres pâles et bleuâtres. — Mouvements convulsifs de la bouche et distorsion des coins de la bouche. — Gonflement de la lèvre supérieure. — Éruptions et excoriations aux lèvres et aux commissures des lèvres. — Ulcères à la partie rouge de la lèvre inférieure. — Éruption pruriente autour du menton. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

DENTS. — Odontalgie seulement la nuit, soulagée par les boissons chaudes et à la chaleur du lit. — *Douleurs sourdes dans les dents, avec gonflement de la joue et des gencives. — *Traction cram-poïde, déchirement et secousses ou pulsations dans les dents, surtout pendant ou après le repas. — Grincement des dents. — Jaunissement des dents. — (Fistule aux gencives). — Gonflement des gencives avec secousses, déchirements et élancements. — Ulcères aux gencives.

BOUCHE. — *Sécheresse de la bouche, sans soif, avec tension des parties, langue pesante et parole indistincte. — Torpeur de l'intérieur de la bouche et de la langue. — *Exhalaison d'une odeur putride par la bouche*. — Hémorrhagie buccale. — *Langue sale, chargée. — Mouvements involontaires de la langue.

GORGE. — Sensation d'étranglement dans la gorge, avec déglutition empêchée. — *Sécheresse dans la gorge. — Douleur d'excoriation dans la gorge. — *Douleur brûlante dans la gorge, avec soif nocturne. — °Sensation comme si une boule montait du creux de l'estomac dans la gorge. — *Inflammation de la gorge et du pa-*

lais avec douleur lancinante, qui empêche la déglutition. — Gonflement et suppuration des amygdales. — Ulcères semblables aux chancres, aux tonsilles. — **Rendement de mucosités*. — °Goltre.

APPÉTIT. — Perte du goût. — **Bouche pâteuse ou amère*, surtout le matin, souvent avec nausées. — **Aigreurs dans la bouche*, surtout le matin, ou goût aigre des aliments. — Absence de soif, ou soif ardente. — *Soif nocturne*. — **Perte de l'appétit*, quelquefois à la première bouchée. — **Faim immodérée*. — *Boulimie*. — **Répugnance pour les aliments cuits ou chauds*, pour le pain de seigle, la viande, le café et la fumée de tabac. — °*Appétence excessive pour les douceurs*. — °*Impossibilité de digérer les aliments lourds*. — **Après le repas, douleurs hépatiques, oppression et plénitude dans la poitrine et le ventre*, nausées, chaleur à la tête, rougeur de la face, pulsation et tremblement dans tout le corps, mains chaudes, battements de cœur, coliques, etc. — **Après avoir pris du lait, aigreurs et diarrhée*.

ESTOMAC. — **Renvois violents après midi*. — **Renvois aigres brûlants, gras ou amers*. — **Régurgitation aigre des aliments, surtout du lait*. — **Pyrosis*, surtout après le repas. — *Hoquet violent, par accès*, surtout après le repas. — *Nausées dans l'appartement, se dissipant au grand air, et vice versa*. — **Nausées fréquentes, continuelles*, surtout le matin, avec amertume de la bouche. — °*Nausées par le mouvement de la voiture*. — °*Sensation de fadeur à l'estomac, le matin*. — **Pituites de l'estomac*, quelquefois tous les deux jours, avec écoulement d'une eau amère. — **Vomissement des aliments et de bile*, surtout la nuit ou le matin, à jeun. — **Vomissements de matières verdâtres, amères*. — Vomissement de sang. — Douleurs d'estomac avec frissons et mains mortes, après s'être légèrement refroidi. — Douleurs d'estomac périodiques, soulagées à la chaleur du lit. — **Pression à l'estomac, le soir, et après chaque repas*, quelquefois avec amertume de la bouche. — Douleurs compressives et contractives à l'estomac. — Les douleurs d'estomac se manifestent principalement le matin, au grand air, après le repas, ou après avoir bu du vin; elles diminuent quelquefois le soir, et sont souvent accompagnées de crampes de poitrine et de gêne de la respiration. — **Gonflement de l'épigastre*, avec sensibilité douloureuse au toucher. — Les vêtements gênent autour de l'estomac.

VENTRE. — **Tension autour des hypochondres, comme par un cerceau*. — *Pression et tension au foie*. — Douleur crampoïde au diaphragme et douleur de foulure au foie, en se baissant. — Douleurs hépatiques après avoir mangé à satiété. — Dureté du foie. Douleurs abdominales pressives. — **Plénitude et ballonnement*

de l'estomac et du ventre. — Pesanteur dans le ventre. — *†* Dureté dans le ventre. — Gonflement hydropique du ventre. — Douleurs crampoïdes, contractives, dans le ventre qui est tendu. — **Déchirements, traction, tension et pincements dans le ventre et les côtés du ventre.* — **Griffement* dans le bas-ventre, avec suspension de la respiration. — **Tranchées*, surtout au-dessus du nombril. — Douleur au-dessus du nombril, au toucher. — Douleur brûlante dans le ventre. — Élançements déchirants, pulsations et pression dans l'anneau inguinal, comme si une hernie allait s'établir. — Douleurs crampoïdes dans les muscles abdominaux, surtout la nuit. — **Incarcérations de flatuosités.* — **Défaut d'expulsion des flatuosités.* — **Gargouillements et borborygmes dans le ventre*, surtout du côté gauche.

SELLES. — **Constipation de longue durée.* — **Resserrement du ventre*, parfois avec envie inutile d'aller à la selle, et évacuation difficile. — *°Constipation ou diarrhée chez les femmes enceintes.* — Selles pâles, d'odeur putride. — Écoulement de mucosités ou de sang pendant les selles. — Lombrics. — Douleurs à l'anus après le repas et après les selles. — Après la selle ballonnement du ventre. — **Prurit et tension à l'anus.* — **Douleurs incisives*, élançements et douleur d'excoriation au rectum. — Spasmes du rectum. — Boutons hémorroïdaux à l'anus et au rectum, avec sortie du rectum. — Éruption pruriente à l'anus.

URINES. — **Envie pressante d'uriner et émission par trop fréquente.* — Urine foncée avec sédiment jaune ou rougeâtre. — *°Calculs rénaux et gravelle.* — **Pissement de sang*, *°parfois avec paralysie des jambes et constipation.* — Incontinence d'urine. — Cuisson en urinant. — **Prurit à l'urèthre*, pendant et après l'émission des urines. — **Pincements lancinants*, et douleurs incisives dans la vessie et l'urèthre.

PARTIES VIRILES. — Élançements, tractions et douleurs incisives dans le gland. — *Gonorrhée bâtarde*, avec élevation rouge foncé et cuisante derrière le gland. — **Excoriation entre le scrotum et les cuisses.* — Gonflement hydropique des parties génitales. — **Exaltation immodérée, ou absence de l'appétit vénérien.* — *°Répugnance pour le coït, ou facilité trop grande à y être excité.* — **Impuissance de longue durée.* — **Faiblesse ou absence totale des érections.* — **Pollutions immodérées, ou manque de pollutions.* — *°Pendant le coït, éjaculation trop prompte ou trop tardive.* — On s'endort pendant le coït. — Après le coït et les pollutions, lassitude. — Écoulement de liqueur prostatique.

RÈGLES. — Prurit, **brûlement et rongement à la vulve.* — *°Pression vers le dehors, au-dessus de la vulve et jusque dans le vagin, en se baissant.* — *°Expulsion de vents par le vagin.* — *°Sèche-*

resse chronique du vagin. — *Douleurs lancinantes dans les lèvres, en se couchant. — Excoriation entre les cuisses, à la vulve. — Pendant et après le coït, douleur brûlante dans le vagin. — **Règles* (trop hâtives), *trop abondantes et de trop longue durée.* — °Règles faciles à supprimer pour longtemps, par une frayeur. — **Avant les règles*, frissons, *tristesse, mélancolie.* — Pendant les règles, délires avec pleurs, maux de tête, aigreurs dans la bouche, maux de reins, gonflement des pieds, évanouissement, vomissement de matières aigres, tranchées, coliques et douleurs dans le dos. — **Leucorrhée* laiteuse, jaunâtre, rougeâtre, et rongeannte, °quelquefois précédée de tranchées dans le bas-ventre. — Gonflement du sein avec nodosités. — °Excoriation et croûtes suintantes aux mamelons.

LARYNX. — Grattement formicant dans la trachée-artère, la nuit. — Enrouement, avec raucité et douleur d'excoriation dans la poitrine après avoir parlé. — Accumulation de glaires dans la poitrine, avec râle muqueux. — °Voix faible et sourde. — *Toux après avoir bu. — *Toux matutinale opiniâtre et sèche. — **Toux nocturne*, qui ébranle la tête, le diaphragme et l'estomac. — *Toux sèche, jour et nuit. — **Toux provoquée par un chatouillement*, ou comme produite par la vapeur du soufre, ou *excitée en respirant profondément*, généralement avec expectoration gris jaunâtre et salée, °quelquefois avec grande faiblesse d'estomac, fièvre, sueurs nocturnes et amaigrissement. — *Toux avec expectoration abondante de matières verdâtres. — **Expectoration abondante de pus*, en toussant. — **Toux avec expectoration de sang.* — *En toussant, coups dans la tête, respiration courte, cuisson et ébranlement dans la poitrine, ou douleurs à la région stomacale.

POITRINE. — *Haleine courte pendant presque tout travail*, même chez les enfants. — **Oppression de poitrine* continueuse, aggravée par la promenade au grand air. — °Râle muqueux et ronflement en respirant. — En respirant, tressaillement et élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. — °Douleur de meurtrissure dans la poitrine. — **Pression continueuse dans la poitrine.* — Pesanteur dans la poitrine. — Tension à la partie antérieure de la poitrine. — **Lancinations dans la poitrine surtout à gauche*, et principalement en éternuant, en toussant, en riant et au plus léger mouvement, quelquefois avec impossibilité de rester couché sur le côté malade, et gêne de la respiration. — °Douleur d'excoriation dans la poitrine, surtout après avoir parlé. — °Points de côté, alternant avec maux de dents et douleurs dans les membres. — **Battements de cœur*, surtout pendant la digestion, ou le soir au lit, quelquefois anxieux et tremblants. — Éruptions douloureuses et taches hépatiques sur la poitrine.

TRONC. — Douleurs violentes aux reins, qui ne permettent pas de se tenir droit, en étant assis. — *Douleurs dans le dos et les reins, surtout en se remuant, en se baissant, et en soulevant un objet, accompagnées souvent de douleurs constrictives dans le ventre. — *Élancements aux reins, en se redressant après avoir été courbé. — *Douleurs tractives, déchirements et élancements, dans le dos et aux reins, avec gêne de la respiration, principalement en étant assis, et même la nuit. — °Déviation de la colonne vertébrale. — °Traction et contraction depuis la nuque jusqu'à l'occiput. — *Roideur de la nuque, quelquefois à la suite d'un tour de reins. — Taches hépatiques à la nuque. — °Dartres à la nuque et sous les aisselles. — Furoncles sous les aisselles. — Roideur, gonflement et induration d'un côté du cou. — *Gonflement des glandes du cou et de l'épaule, avec douleur lancinante. — Faiblesse et paralysie des muscles du cou. — Éruption douloureuse au cou. — °Goître.

BRAS. — Déchirements et élancements dans les articulations de l'épaule et du coude. — *Douleurs ostéocopes nocturnes, dans le bras et le coude. — *Douleur tractive dans les bras. — *Tressaillement dans les épaules et les bras, même pendant la sieste. — *Faiblesse paralytique des bras. — *Engourdissement facile des bras et des doigts, même la nuit, ou seulement en les levant. — Prurit rongéant et taches hépatiques aux bras. — °Roideur arthritique du coude et du poignet. — Dartres au bras. — Inflammation érysipélateuse à l'avant-bras, avec suppuration. — *Sécheresse de la peau des mains. — Sensation brûlante dans la paume des mains. — Gonflement rouge et indolore des mains. — Verrues sur les mains et les doigts. — Torpeur des doigts et des mains, qui sont comme mortes. — Tremblement involontaire des mains. — *Gonflement rouge et déchirement arthritique dans les articulations des doigts. — *Nodosités arthritiques et roideur dans les doigts. — Roidissement des doigts en travaillant. — Contraction et secousses dans les doigts. — Engelures.

JAMBES. — Douleurs périodiques, depuis l'articulation coxo-fémorale jusque dans le pied, tous les quatre jours. — *Déchirement dans les jambes et les genoux, jusque sur le tibia et le cou-de-pied, surtout le soir et la nuit. — Inquiétudes, secousses et tremblement dans les jambes et les pieds, surtout le soir et la nuit. — Secousses involontaires dans les jambes, ou écartement et rapprochement alternatifs des cuisses. — Prurit brûlant et rongéant aux jambes, surtout dans les jarrets. — *Courbure et roideur des genoux. — *Gonflement des genoux. — *Gonflement des jambes, avec taches rouges brûlantes, étendues, et douleur qui ne permettent pas d'appuyer le pied. — °Paralysie des jambes, avec

pisement de sang et constipation. — Dartres aux jambes et aux mollets. — *Tumeur blanche au genou. — *Crampes et *douleurs cramptoïdes dans les mollets, surtout en marchant*, et la nuit. — *Douleur brûlante aux jambes. — **Ulcères aux jambes*, avec déchirements nocturnes, prurit et douleur brûlante. — *Douleur à la plante des pieds, en marchant. — *Crampes dans les pieds et les orteils. — **Gonflement des pieds* et des malléoles ou de la plante des pieds (avec douleur lancinante). — *Pieds froids. — **Sueur froide aux pieds*, parfois abondante et avec excoriation de la peau. — *Fléchissement des orteils en marchant. — *Contraction des orteils. — **Cors aux pieds*, quelquefois avec douleur lancinante.

134. — MAGNESIA CARBONICA.

MAGN. — Magnésie. — HAHNEMANN. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : jusqu'à 50 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

COMPARER AVEC : Bar. bell. bry. calc. cham. con. graph. kal. lyc. magn-m. nitr-ac. n-vom. phos. puls. rhus. sil. suf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections, principalement des enfants, ainsi que des femmes, et surtout des *femmes hystériques* ou mal réglées; Affections scrofuleuses?; Épilepsie; Atrophie des enfants?; Glandes engorgées?; Dartres?; Migraine; Céphalalgie hystérique?; Ophthalmies scrofuleuses?; Cataracte; Obscurcissement de la cornée; Durceté de l'ouïe; Odontalgies rhumatismales, ou chez les femmes enceintes; Névralgie faciale?; Gastralgie, Aigreurs des enfants; *Diarrhées*, surtout chez les enfants; Diabète??; Coliques spasmodiques; *Spasmes abdominaux hystériques*; Odontalgies des femmes enceintes; *Crampes de matrice*; *Dysménorrhée*; Leucorrhée; Hernie scrotales, etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Sensibilité douloureuse de tout le corps. — Traction et déchirement dans les membres. — Secousses douloureuses à diverses parties. — **Chute fréquente, sans perte de connaissance*, en marchant ou en étant debout. — *Attaques d'épilepsie. — Relâchement de tout le corps. — *Lassitude, prin-*

*ci*palement dans les pieds, et *quand on est assis*. — Fatigue prompt pendant la promenade. — Le soir, inquiétudes dans les membres après avoir été longtemps assis. — *Les symptômes se manifestent* ou sont aggravés, *la nuit et pendant le repos*. — Les symptômes qui se manifestent pendant qu'on est assis, sont améliorés par le mouvement.

PEAU. — **Fort prurit* et forte sécheresse de la peau. — Nodosités volumineuses entre cuir et chair, avec douleurs lancinantes. — *Petites dartres rouges, sans douleur, et qui finissent par s'exfolier*. — Vésicules rongeanes. — Petits furoncles.

SOMMEIL. — Bâillements fréquents et violents. — **Envie de dormir le jour*. — **Insomnie*, quelquefois par oppression dans le bas-ventre ou par agitation anxieuse et chaleur intérieure, avec grande crainte de se découvrir. — *Affluence de rêves anxieux*; avec paroles, cris et sursauts avec effroi. — Rêves de feu, de déluge, de brigands, de querelles, d'argent, de plaisirs, de malheurs, etc. — Sommeil de nuit non réparateur, avec fatigue aussi grande le matin que le soir avant de se coucher, réveil de bonne heure et difficulté à se rendormir.

FIÈVRE. — Frissons le soir. — Le matin, sensation de chaleur, sans transpiration et sans soif. — *Sueur nocturne*, souvent fétide et grasse. — Sueur acide.

MORAL. — Inquiétude et peur, avec tremblement et chaleur. — Mauvaise humeur le soir.

TÊTE. — Le soir, vertige, avec évanouissement. — Fatigue de la tête par les travaux intellectuels. — Maux de tête, la nuit, au lit, même pendant le sommeil, soulagés en s'asseyant. — *Douleur pressive au sommet de la tête*, pendant un travail intellectuel, ou au milieu d'une assemblée. — Tension et tiraillements à l'occiput, comme par roideur de la nuque. — Tractions dans le front avec nausées. — Mal de tête tressaillant, avec sensation de lourdeur après un accès de colère. — *Douleurs lancinantes dans la tête*, même la nuit, dans le côté sur lequel on repose. — Congestion à la tête, avec chaleur intérieure, surtout en fumant. — Desquamation du cuir chevelu, qui démange, surtout par un temps pluvieux. — Chute des cheveux.

YEUX. — *Inflammation des yeux*, avec rougeur, élancements, sensation de brûlure et trouble de la vue. — Gonflement du globe de l'œil. — **Agglutination des paupières*, le matin. — Sécheresse des yeux ou fort larmolement. — °*Obscurcissement de la cornée*. — **Taches noires devant la vue*. — °*Obscurcissement du cristallin*.

OREILLES. — Inflammation de l'oreille extérieure, avec rougeur et douleur d'ulcération. — Grande susceptibilité de l'ouïe au moindre bruit. — **Dureté de l'ouïe*, avec bourdonnement dans les

oreilles, surtout dans l'appartement. — Tintement, grondement et sensation comme si un oiseau battait des ailes, dans les oreilles.

NEZ. — Épistaxis, le matin. — Éruption vésiculaire dans le nez, avec douleur pressive. — *Obturation du nez.* — *Coryza sec, qui ne permet de respirer que par la bouche.

VISAGE. — *Teint brouillé*, pâle, terreux. — Rougeur et pâleur alternatives de la face. — Air maussade. — Tension à la face, comme si elle était enduite de blanc d'œuf desséché. — *Douleurs nocturnes aux pommettes, fouillantes, térébrantes, déchirantes et insupportables pendant le repos*, et forçant à aller d'un endroit à l'autre. — Gonflement de la pommette, avec douleur pulsative. — **Gonflement de la face* et °bouffissure tubéreuse. — Éruption dartreuse autour de la bouche.

DENTS. — Maux de dents par le mouvement de la voiture. — **Douleurs nocturnes dans les dents*, forçant à se lever et à se promener, *insupportables dans le repos*, et généralement brûlantes, térébrantes ou comme d'ulcération, ou déchirantes, tractives et tressaillantes, s'étendant jusqu'aux tempes, avec gonflement de la joue du côté affecté, roideur de la nuque et du cou, et tressaillement dans les doigts et les pieds. — Battements et *élancements dans les dents*, après le repas. — Maux de dents aggravés par le froid. — Vacillement des dents.

BOUCHE. — *Sécheresse de la bouche, surtout la nuit* et le matin. — Salive sanguinolente. — Éruption vésiculaire dans la bouche et sur la langue. — Petites tubérosités dans la bouche, qui saignent et brûlent au plus léger contact.

GORGE. — *Mal de gorge, avec douleur lancinante*, en parlant et en avalant. — Douleur brûlante dans la gorge et le palais, avec sécheresse et âpreté, comme s'il y avait des barbes d'épis dedans.

APPÉTIT. — Perte du goût. — Goût amer, avec langue blanche et mucosités visqueuses sur la langue et les dents. — *Goût acide dans la bouche.* — *Forte soif* (d'eau), surtout le soir et la nuit. — Grand désir de légumes, avec répugnance pour la viande, et *vice versa*.

ESTOMAC. — Renvois acides. — *Renvois fréquents*, avec douleurs à l'estomac. — Nausées et vertige pendant le repas, suivis de vomituration et de vomissements d'une sérosité amère ou salée. — *Douleur pressive contractive à l'estomac*, quelquefois avec renvois aigres. — *Sensation de fadeur et de vide à l'estomac, avec nausées et envie de vomir.* — Douleur d'ulcération à l'estomac.

VENTRE. — Induration et douleurs lancinantes dans la région hépa-

tique. — *Ballonnement excessif et tension du ventre*, avec sensation de pesanteur. — *Crampes abdominales*, suivies de flueurs blanches. — Pincements, tranchées et tiraillements aigus dans le ventre. — °Hernie inguinale.

SELLES. — **Constipation*. — Besoin fréquent et inutile d'aller à la selle, avec selles peu abondantes ou seulement émission de flatuosités. — *Diarrhées verdâtres, écumeuses et muqueuses*, avec tranchées. — °Diarrhée d'odeur aigre. — Expulsions d'ascarides et de lombrics. — Élançements dans l'anus et le rectum, surtout pendant les ténésmes.

URINES. — Sécrétion plus abondante que de coutume, d'une urine pâle ou verdâtre. — Émission fréquente d'urine, même la nuit. — Émission involontaire des urines. — Sensation de brûlure et d'excoriation en urinant.

PARTIES VIRALES. — *Diminution de l'appétit vénérien*. — *Défaut d'érections*. — Écoulement de liqueur prostatique pendant l'émission des flatuosités. — °Hernie scrotale. — Pollutions fréquentes.

RÈGLES. — Sensation, comme si tout se portait vers les aines, comme pour les règles, avec tranchées dans le ventre. — **Règles trop tardives*, ou complètement supprimées, ou règles trop hâtives accompagnées de beaucoup de souffrances. — Règles avec écoulement d'un sang foncé, épais, gluant et comme de la poix. — Avant les règles, maux de reins, coliques, boulimies, renvois fréquents et nausées. — *Pendant les règles*, accablement, frissons, douleurs de tête, *pâleur du visage*, maux de reins et douleurs crampoïdes, pressives, dans le ventre, qui arrêtent le flux menstruel. — *Écoulement de mucosités blanches et rongeantes* par le vagin, quelquefois précédé de crampes dans le ventre.

LARYNX. — Toux provoquée par un chatouillement dans la gorge, avec expectoration séreuse et salée. — *Toux crampoïde nocturne*. — Toux matutinale, avec expectoration d'un pus jaunâtre. — *Expectoration de sang* par la toux.

POITRINE. — Oppression de poitrine, avec sensation de constriction. — Oppression de poitrine, avec haleine courte, surtout en marchant. — Pression et sensation de pesanteur, ou douleurs incisives et lancinantes dans la poitrine. — Douleurs d'excoriation et élançements dans le côté gauche de la poitrine et dans la région du cœur.

TRONC. — *Douleurs de brisement aux reins et dans le dos, la nuit*. — **Roi deur de la nuque*. — Élançements aux reins. — Déchirement et tiraillement successif à la nuque.

BRAS. — Douleur de luxation à l'articulation scapulaire, pendant le mouvement. — °*Accès de déchirement dans l'épaule*, °surtout la

nuît, avec fourmillement jusque dans les doigts et impossibilité de remuer les bras, tant la douleur est vive. — Douleur tractive dans les bras et les mains. — °Gerçure de la peau des mains. — *Vésicules rongeantes aux mains et aux doigts*, avec douleur lancinante. — Tension crampoïde dans les articulations des doigts. — Chaleur aux doigts. — *Gonflement rouge et inflammatoire des doigts*.

JAMBES. — Inquiétudes dans les jambes. — Douleur tractive dans les jambes et les pieds. — Démangeaison aux fesses, avec taches rouges après s'être gratté. — Gonflement douloureux dans le jarret. — Crampes dans les mollets la nuit. — Plaques brûlantes sur le tibia. — °Furoncles aux jambes.

135.—MAGNESIA MURIATICA.

MAGN-M. — Muriate de magnésie. — **HAHNEMANN.** — *Doses usitées* : 12, 30. — *Durée d'action* : jusqu'à 7 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES : Camph. ars ?

COMPARER AVEC : Bar. bry. calc. cham. con. graph. kal. magn. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections, principalement du sexe féminin, et surtout des femmes hystériques ; Accès de spasmes et de faiblesse hystériques ; Glandes engorgées ? ; Céphalalgies hystériques, rhumatismales et nerveuses ? ; Ozène scrofuleuse ; Névralgie faciale ? ; Dentition difficile des enfants ; Souffrances gastriques ; Hépatite chronique ; Coliques spasmodiques ; *Spasmes abdominaux, hystériques* ; *Crampes de matrice* ; Nausées des femmes enceintes ; Constipation des enfants pendant la dentition ; Induration squirrheuse de l'utérus ; *Leucorrhée*, etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs térébrantes ou contractives crampoïdes. — °Tractions et déchirements paralytiques dans les membres. — °Accès de spasmes et de faiblesse hystériques. — Disposition à se refroidir. — °Faiblesse du corps qui semble quelquefois provenir de l'estomac. — Sensation de malaise et de courbature dans tout le corps, avec grande sensibilité au moindre

bruit. — *La plupart des symptômes se manifestent en étant assis, ou la nuit, et sont généralement soulagés par le mouvement.*

PEAU. — Fourmillement à diverses parties de la peau. — Boutons pruritants, avec douleur brûlante après s'être gratté. — Éruption de pustules. — Éruptions de petites papules rouges. — Furoncles.

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir le jour, avec bâillements et paresse.* — Sommeil tardif et *insomnie* à cause de *chaleur*, avec *soif, et grande agitation dans tout le corps*, en fermant les yeux. — Rêves anxieux et effrayants, avec paroles et cris pendant le sommeil. — Sommeil non réparateur. — Secousses dans le corps, la nuit pendant la veille. — Cauchemar.

FIÈVRE. — *Frisson le soir*, qui se dissipe dans le lit. — Sueur après minuit.

MORAL. — Inquiétude et humeur pleureuse. — Maussaderie et humeur chagrine. — Aversion pour la conversation. — Répugnance pour le travail. — *Surimpressionnabilité nerveuse*, avec pleurs faciles.

TÊTE. — Hébétude dans la tête, comme si on était ivre. — Vertige le matin, en se levant et pendant le dîner, se dissipant au grand air. — *Lourdeur de la tête*, avec étourdissement jusqu'à faire tomber. — Douleurs soulagées en enveloppant la tête. — Sensation de torpeur dans le front. — ** Pression tensivè, dans le front et le sinciput*, avec confusion et obscurcissement dans la tête, principalement lorsqu'on vient de se réveiller. — Serrement comme par une griffe, et bruit dans les tempes, le soir, au lit, avec sensation, comme si on allait avoir un vertige et perdre connaissance. — Déchirements tressaillants, ou lancinants et pulsatifs, dans la tête. — Congestion à la tête, avec chaleur, bourdonnement et bouillonnement douloureux. — **Maux de tête quotidiens.* — Tiraillements névralgiques dans la tête et le visage, et jusque dans les dents, avec sensation d'embarras dans la tête.

YEUX. — *Inflammation et douleur brûlante dans les yeux*, avec rougeur de la sclérotique. — Larmolement et brûlement dans les yeux, en regardant au grand jour. — *Agglutination nocturne des paupières.* — Couleur jaune de la sclérotique. — Auréole verte autour de la lumière le soir.

OREILLES. — ** Pulsation dans l'oreille.* — Torpeur et dureté de l'ouïe, comme si un objet était appliqué sur l'oreille. — Élancements, tiraillements aigus et térébrations dans les oreilles. — Bourdonnement dans les oreilles.

NEZ. — ** Croûtes dans les narines*, quelquefois avec sensibilité douloureuse du nez au toucher. — ** Excoriation des narines.* — ** Écoulement de sérosités corrosives par le nez.* — Obturation du

nez, avec manque d'haleine. — Douleur d'excoriation et de brûlure dans le nez. — *Gonflement, rougeur, induration et chaleur de la partie inférieure du nez, avec aggravation le matin. — Sécheresse pénible du nez. — Obturation nocturne du nez. — *Coryza*, avec perte du goût et de l'odorat, et mouchement de mucosités jaunâtres et fétides. — Perte de l'odorat.

VISAGE. — *Teint pâle, jaunâtre*, ou couleur terreuse de la face. — Douleurs tractives dans les nerfs de la face. — Tension de la face avec douleur crampoïde dans les os du visage. — **Éruption faciale*. — Lèvres gercées. — Sensation d'âpreté aux parois internes des lèvres, lorsque la langue s'y porte. — Ampoules grosses et transparentes sur la partie rouge des lèvres.

DENTS. — Mal de dents, porté au plus haut degré par le contact des aliments. — Sensation d'allongement des dents incisives supérieures. — Gonflement douloureux et *saignement facile des gencives*.

BOUCHE. — Sécheresse de la bouche, la nuit. — Accumulation abondante de la salive séreuse dans la bouche. — Sensation dans l'intérieur de la bouche, comme si elle avait été brûlée. — Brûlement à la langue, comme par du feu.

GORGE. — Sensation comme si la gorge était excoriée et à vif, avec aggravation le soir et la nuit. — *Mucosités visqueuses et épaisses dans la gorge*, souvent mêlées de sang et difficiles à expulser.

APPÉTIT. — *Soif fréquente*. — Boulimie et sensation de faim dans l'estomac, suivie de nausées. — *Faim, sans que l'on sache de quoi on a envie*. — Désir de friandises.

ESTOMAC. — Régurgitation des aliments, pendant la marche, — et après le dîner, *violent hoquet* qui rend l'estomac douloureux. — Sensation d'une *boule qui remonterait* du ventre dans l'œsophage, se dissipant par des renvois. — Nausées, surtout le matin, lorsqu'on vient de se lever. — Nausées fréquentes, avec évanouissement, jour et nuit. — **Nausées continuelles*, avec couleur terreuse de la face et surexcitabilité nerveuse, avec pleurs faciles. — Pression à l'estomac, avec nausées. — Tension et *douleur d'ulcération et de meurtrissure à l'estomac*, avec sensibilité excessive au contact. — Ébranlement douloureux dans l'estomac, en marchant et en appuyant le pied.

VENTRE. — Tension et *élancements dans la région hépatique*. — *Douleurs pressives au foie*, même en marchant ou en appuyant dessus, aggravées lorsqu'on est couché sur le côté droit. — Ventre dur et tendu. — **Ballonnement du ventre, fort et continu*, avec constipation. — **Dureté douloureuse du ventre et surtout du côté droit*. — *Douleurs crampoïdes dans le ventre, surtout le soir, et quelquefois suivies de leucorrhée. — Tranchées, pin-

cements et tiraillements aigus dans le ventre. — Élançements fourmillants dans les muscles abdominaux.

SELLES. — **Selles dures, difficiles, lentes et insuffisantes.* — **Selles noueuses, comme des crottes de mouton.* — Fort ténésme, avec selle peu abondante, ou seulement émission de flatuosités. — **Disposition chronique à la diarrhée.* — Diarrhées violentes de mucosités et de sang. — Selles verdâtres, jaunâtres ou brunâtres. — Selles enduites de mucus et de sang. — *Sortie de ténia.

URINES. — Envie fréquente d'uriner, jour et nuit, avec émission peu abondante. — Émission des urines possibles seulement par contraction des muscles abdominaux. — Torpeur de l'urèthre.

PARTIES VIRALES. — Fort prurit aux parties génitales et au scrotum. — Érections fréquentes. — Après le coït, brûlement dans le dos.

RÈGLES. — *Règles trop hâtives et trop fortes.* Sang noir et coagulé pendant les règles. — *Pendant les règles, pâleur de la face,* maux de reins et abattement. — *Crampes de matrice,* quelquefois avec douleurs jusque dans les cuisses et leucorrhée. — *Leucorrhée,* surtout pendant le mouvement, ou précédée de crampes dans le ventre. — *Induration squirrheuse de l'utérus.

LARYNX. — Enrouement, avec âpreté et sécheresse de la gorge. — *Toux sèche,* le soir et la nuit, avec douleur brûlante et sensation d'excoriation dans la poitrine. — *Toux crampoïde nocturne,* avec chatouillement violent dans la gorge.

POITRINE. — *Oppression de poitrine dans la région du cœur. — Pesanteur subite dans la poitrine, avec suspension de la respiration pendant le dîner. — Tension et contraction dans la poitrine. — Élançements au cœur, qui suspendent la respiration. — *Battements de cœur,* en étant assis, et se dissipant pendant le mouvement.

TRONC. — Douleurs contractives et crampoïdes aux reins. — Élançements, déchirements et douleur brûlante dans le dos. — Gonflement des glandes du cou.

BRAS. — *Tractions et déchirements paralytiques dans l'articulation de l'épaule, et s'étendant jusque dans le bras et la main, aggravés par le mouvement. — **Engourdissement des bras, le matin, en se réveillant,* ou le soir, au lit.

JAMBES. — Grande lassitude dans les jambes, même en étant assis, — Lourdeur des jambes. — Déchirements tressaillants dans les hanches. — Inquiétudes et tension dans les cuisses. — Douleur pressive ou tiraillement paralytique dans le genou. — Crampes dans les mollets, la nuit. — Douleur brûlante à la plante des pieds, le soir. — **Sueur aux pieds.*

136. — MAGNESIA SULFURICA.

MAGN-S. — Sulfate de magnésie. — HARTLAUB ET TRINKS. — Médicament qui n'est pas encore connu sous tous les rapports.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirements dans les membres, surtout la nuit. — Grande lassitude et brisement de tout le corps, avec tremblement. — Éruption urticaire. — Dartres rouges, pruriantes.

SOMMEIL. — Sommeil le soir de bonne heure. — *Insomnie* nocturne, à cause de violentes douleurs dans la tête, le ventre et les reins. — Affluence de rêves quelquefois désagréables et anxieux.

FIÈVRE. — Frissons et horripilation, surtout le soir, se dissipant dans le lit. — Frissons la nuit, avec soif jusqu'à midi; après midi, ou après s'être couché, transpiration. — Chaleur, en se redressant dans le lit, avec vertige, sueur au front et rougeur de la face. — Alternations de chaleur et d'horripilation, de rougeur et de pâleur de la face. — Transpiration la nuit ou le matin, souvent accompagnée de soif.

MORAL. — Mélancolie et disposition à pleurer, avec *appréhension et inquiétude anxieuse*. — Emportement facile; on prend tout en mauvaise part. — Erreurs de l'imagination; on croit voir des personnes absentes.

TÊTE. — Hébétéude de la tête qui est comme pressée dans un étau. — Vertige à faire tomber en avant, le matin et après le dîner. — *Mal de tête* pressif, et sensation *comme si la tête était serrée dans un étau*, fortement aggravés en remuant le globe des yeux. — Douleur de tête compressive, avec chaleur dans la tête et rougeur du visage. — Déchirements et *élancements dans la tête*, et surtout dans les tempes. — *Congestion au front*, avec douleur pressive et chaleur à la partie. — Sensation de vacillement et d'ébranlement du cerveau, à chaque mouvement. — Pendant de violentes douleurs de tête, frissonnement.

YEUX. — Douleurs dans les yeux, comme s'ils allaient sortir de l'orbite, en regardant de côté. — Brûlement dans les yeux, surtout aux lumières, le soir et le matin. — *Élancements dans les yeux*. — Larmoiement, avec photophobie.

OREILLES. — *Élancements dans les oreilles*. — Tintement dans les oreilles.

NEZ. — Douleur d'ulcération dans le nez, surtout au toucher. — Épistaxis, la nuit. — Sécrétion de mucosités abondantes, épaisses

et jaunes par le nez. — Coryza fluent, avec perte de l'odorat, parole indistincte et douleur d'excoriation dans le nez et la poitrine.

VISAGE. — Couleur terreuse de la face. — Déchirement dans les os de la face. — Sécheresse et brûlement aux lèvres, le soir.

DENTS. — *Odontalgie*, généralement le soir, quelquefois en rentrant de la promenade, ou provoquée par des choses froides ou chaudes, ainsi que par le contact des aliments; les douleurs sont généralement tressaillantes, picotantes ou pulsatives, et se dissipent au lit.

BOUCHE ET GORGE. — Sécheresse de la bouche, avec sensation de torpeur. — Apreté de la langue. — Vésicules sur les bords de la langue, avec douleurs incisives. — Mal de gorge, avec douleurs lancinantes, la nuit, aggravé en avalant. — Sécheresse et sensation de torpeur dans la gorge. — Accumulation de mucosités dans la gorge. — Exspuition d'un mucus acide.

APPÉTIT. — Amertume, ou amertume douceâtre dans la bouche, surtout le matin. — Soif, surtout le matin et le soir. — Absence d'appétit et *répugnance pour tous les aliments*, même en y pensant. — Répugnance pour la viande.

ESTOMAC. — *Renvois à vide*, muqueux, amers et putrides. — Régurgitation d'eau, précédée d'un tremblement dans l'estomac. — Dégoût et nausées, avec accumulation d'eau dans la bouche. — Vomissement, d'abord des aliments, puis de mucosités. — Sensation de froid à l'estomac, avec envie de vomir, le matin au lit.

VENTRE. — *Élancements dans l'hypochondre gauche*, surtout le soir, avant et après le repas. — Tension, dureté et plénitude du ventre. — *Élancements violents dans tout le ventre*, mais surtout autour du nombril. — Traction douloureuse dans le ventre. — Tension dans le bas-ventre, pression vers les aines comme si elles allaient éclater, en étendant le corps.

SELLES. — Selles tantôt dures, tantôt molles. — Selles diarrhéiques, avec forte soif. — *Sortie d'ascarides pendant les selles*.

URINES. — *Augmentation de la sécrétion des urines*. — Émission d'urine, la nuit. — Émission d'urine goutte à goutte. — Urine de couleur claire, ou verdâtre. — Après l'émission des urines, élancements à l'orifice de l'urèthre.

RÈGLES. — *Règles trop hâtives* et trop fortes, avec sang noir et épais. — Règles trop faibles. — Écoulement de sang hors le temps des règles. — Pendant les règles, lourdeur de la tête, et frissons. — Leucorrhée épaisse et abondante, avec douleur de brisement aux reins et dans les cuisses. — Leucorrhée brûlante, surtout pendant le mouvement.

LARYNX ET POITRINE. — *Toux sèche et ébranlante, le matin après le réveil, et qui force à se redresser. — Toux matutinale, avec expectoration et douleur d'excoriation dans la poitrine, la gorge et le palais. — Pression sur la poitrine, avec gêne de la respiration, surtout le matin, ou la nuit, au lit. — Douleurs brûlantes dans la poitrine, quelquefois en toussant.*

TRONC ET MEMBRES. — *Douleur de brisement dans le dos, le matin, en se réveillant. — La nuit, déchirements dans le dos, qui forcent à se promener de côté et d'autre. — Élançements et tension dans la nuque. — Tressaillements dans les bras. — Déchirement dans les épaules et les bras. — Déchirement et élançements dans les mains et les doigts, avec contraction de ces parties. — Tremblement des mains. — La nuit, déchirement dans le bout des doigts. — Douleurs nocturnes dans les jambes et aux reins. — Lourdeur tantôt dans les hanches, tantôt aux reins. — Déchirement dans les jambes, et surtout dans les os des cuisses, et élançements dans les orteils, qui se contractent.*


137.—MANGANUM.

MANG. — Manganèse. — **HAHNEMANN.** — *Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 7 semaines dans quelques affections chroniques.*

ANTIDOTE : Coff.

COMPARER AVEC : Amm. coff. con. lyc., plat. puls. thui. veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — *Affections arthritiques ; Rhumatisme articulaire ; Douleurs ostéocopes ; Migraine ; Angines aiguës et chroniques ; Odontalgies ; Catarrhe chronique, Laryngite chronique (Phthisie laryngée), etc., etc.*

 *Voy. la note, page 17.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Élançements sourds, tressaillants, à diverses parties du corps. — Déchirement et tiraillement, surtout dans les membres. — Tractions et tension dans les membres et les articulations, comme par raccourcissement des tendons, surtout en étendant la partie. — ° Douleurs arthritiques dans les articulations, avec élançements, tressaillements et fouillement, aggravées le soir, souvent semi-latérales ou en croix. — ° Gonflement rouge et luisant des articulations, quelquefois à la suite d'un refroidissement. — * Inflammation des os avec douleurs*

fouillantes et insupportables, la nuit. — Accablement et tremblement, surtout dans les articulations. — Sensation de malaise dans tout le corps, mais surtout dans l'estomac, avec humeur chagrine. — Au plus léger contact, sensibilité de tout le corps, comme s'il était ulcéré. — *La plupart des symptômes se manifestent pendant la nuit.* — Les symptômes qui se sont manifestés dans l'appartement, sont améliorés au grand air, et *vice versa.* — *Plusieurs symptômes sont soulagés ou aggravés suivant le changement du temps en bon ou en mauvais.*

PEAU. — Brûlement par toute la peau, le soir et en se levant du lit. — Dartres pruriantes. — Peau malade; toute lésion tend à s'ulcérer. — *Excoriation et gerçures dans le pli des articulations.*

SOMMEIL. — Grande lassitude somnolente le soir vers 8 heures. — *Affluence de rêves très-vifs, anxieux, et dont on garde un souvenir distinct.* — *Bâillements fréquents.

FIÈVRE. — Frissonnement le soir, avec mal de tête lancinant, sans soif. — Frissons, avec chaleur fugace à la tête. — Chaleur fébrile à la poitrine et aux joues, avec sensibilité douloureuse de tout le corps, au toucher. — Sueur nocturne, quelquefois seulement au cou et aux jambes et qui force à se gratter.

MORAL. — *Humeur chagrine, taciturne*, avec concentration en soi-même. — Distraction. — *Émoussement des sens.

TÊTE. — Tête lourde, avec sensation comme si elle avait augmenté de volume. — Douleurs brûlantes et pressives à la tête se dissipant en plein air. — *Douleurs de tête tensives, lancinantes et tractives*, au grand air, soulagées dans l'appartement. — *Congestion à la tête*, avec pulsation comme si le cerveau allait passer en suppuration, améliorée au grand air. — *Ébranlement douloureux du cerveau pendant le mouvement.* — Les maux de tête, qui se sont déclarés dans l'appartement, sont soulagés au grand air, et *vice versa.*

YEUX. — Pression dans les yeux en les fatiguant, ou aux lumières du soir. — **Chaleur brûlante et sécheresse des yeux.* — Paupières gonflées et douloureuses quand on les remue. — *Agglutination des paupières, le matin. — Pupilles dilatées ou contractées. — *Trouble de la vue. — *Vue très-basse (myopie).*

OREILLES. — *Otalgie.* — Douleurs tractives dans les oreilles, qui proviennent d'autres organes. — *Elancements dans les oreilles en parlant*, en avalant, en riant, et en marchant lourdement. — *Durété de l'ouïe comme par obturation des oreilles*, se dissipant lorsqu'on se mouche, s'aggravant ou s'améliorant selon les changements du temps. — Bourdonnement et grondement dans les oreilles. — *Détonation dans les oreilles en se mouchant et en avalant*; en bâillant, éclatement.

NEZ. — *Coryza sec et obturation du nez.* — *Coryza*, avec perte de l'odorat et sécrétion de mucosités épaisses. — Rougeur, excoriation et inflammation du nez, pendant le *coryza*.

VISAGE. — *Visage pâle, abattu, hâve.* — Déchirement violent et serrant, entre la racine du nez et les sourcils. — Élançements tressaillants depuis la mâchoire inférieure jusque dans les tempes, en riant. — Lèvres excessivement sèches. — *Eruptions et ulcères aux commissures des lèvres.* — Crampes de la mâchoire, après le repas.

DENTS. — Sensibilité douloureuse des dents. — *Douleurs violentes dans les dents, passant rapidement à d'autres parties.* — Déchirement dans les dents molaires et les parties adjacentes, avec grand abattement et inquiétude, surtout le matin et le soir. — Douleurs d'ulcération dans les dents, aggravées jusqu'à devenir insupportables par le contact de quelque chose de froid.

BOUCHE ET GORGE. — Le matin, odeur d'argile dans la bouche. — Tubercules et vésicules brûlantes sur la langue. — *Mal de gorge avec douleur incisive et d'excoriation, hors le temps de la déglutition.* — Élançements sourds des deux côtés du pharynx et jusque dans les oreilles, en avalant. — Sécheresse et grattement dans la gorge, avec sensation comme si une feuille obstruait le larynx.

APPÉTIT ET ESTOMAC. — Goût fade et huileux. — *Absence de soif.* — *Répugnance pour les aliments, par sensation de satiété. — Sensation d'aigreur brûlante remontant de l'estomac, comme pyrosis. — *Chaleur et brûlement à l'estomac*, remontant jusqu'à la poitrine, quelquefois avec grande agitation. — Tiraillements dans la région de l'estomac, comme si l'épigastre se dilatait, accompagnés de nausées.

VENTRE. — Pression dans les hypochondres. — Ventre gros et ballonné. — Douleur pressive d'excoriation dans le ventre et l'épigastre. — Contraction avec sensation de chaleur, depuis le milieu du ventre jusque dans la poitrine, avec nausées. — Tranchées dans la région ombilicale, en respirant profondément. — Commotion dans le ventre, comme si les intestins s'entre-choquaient. — *Émission de flatuosités par trop abondantes.

SELLES. — *Constipation.* — *Selles difficiles, sèches, noueuses. — *Selles plusieurs fois par jour, de la consistance de la bouillie. — Grondement fréquent dans le rectum. — Pendant les selles, coliques et douleurs incisives dans le rectum. — Tiraillements successifs et déchirement dans le rectum. — Douleurs contractives à l'anus.

URINES. — *Envie fréquente d'uriner.* — Sédiment couleur de violette et terreux dans les urines. — Lancinations dans l'urèthre,

hors le temps de l'émission des urines. — Douleurs incisives dans la région de la vessie.

PARTIES GÉNITALES. — Sensation de faiblesse dans les parties génitales, avec brûlement et *tractions tressaillantes dans le cordon spermatique* et jusque dans le gland. — Prurit à la couronne du gland. — Règles trop hâtives. — Pression aux parties génitales. — Leucorrhée.

LARYNX. — **Enrouement et raucité opinidtres*, surtout le matin et au grand air, comme par inflammation chronique du larynx. — Sensation comme si le larynx était fermé. — **Catarrhe avec coryza et enrouement.* — Toux avec enrouement. — *Toux sèche*, provoquée par la lecture à haute voix ou la parole soutenue, avec sécheresse pénible et âpreté dans le larynx. — Le matin, expectoration abondante de petits globules de mucosités vert jaunâtre, presque sans toux. — Crachement de sang.

POITRINE ET TRONC. — Haleine chaude et brûlante, avec chaleur désagréable dans la poitrine. — Élançements dans la poitrine et au sternum, qui la traversent du haut en bas. — Battement dans la poitrine. — **Coups subits au cœur* et dans les côtés de la poitrine depuis le haut jusqu'en bas. — Déchirement dans toute l'étendue de l'épine dorsale, pendant le repos et le mouvement. — Roideur de la nuque.

BRAS. — Tractions et *déchirements* partant de l'épaule et s'étendant jusque *dans les bras, les mains et les doigts.* — *Douleurs tensives dans les articulations des bras et des mains.* — Térébration et fouillement dans les os du bras, comme si c'était dans la moelle. — Tension dans l'articulation du coude, comme si les tendons étaient trop courts. — Dartre pruriant à l'avant-bras. — Douleurs crampoïdes dans les mains. — Gonflement inflammatoire et ulcération du petit doigt. — Gerçures dans le pli des articulations des doigts.

JAMBES. — Tressaillements des muscles des jambes, au moindre mouvement. — Tractions crampoïdes ou élançements tressaillants dans les cuisses. — Douleur de roideur tensive dans les jambes. — Déchirement autour du genou. — Manque de solidité et tremblement des genoux. — Gonflement et inflammation des malléoles, avec élançements jusque dans les jambes. — Brûlement à la plante des pieds. — Excoriation entre les orteils.

138. — MENYANTHES TRIFOLIATA.

MEN. — Trèfle d'eau. — **HAHNEMANN.** — Médicament encore très-peu connu, et qui, jusqu'ici, n'a été employé que contre quelques *Fèvres intermittentes*, des *Otorrhées* à la suite d'exanthèmes, et des *Affections spasmodiques*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tressaillement des muscles, à différentes parties, principalement dans le repos. — *Douleurs lancinantes et pincements*, dans les membres et les articulations. — Grande faiblesse générale, surtout en marchant, souvent accompagnée de frissons. — La plupart des souffrances s'aggravent pendant le repos et vers le soir, et s'améliorent par le mouvement, ou en appuyant la main sur la partie affectée. — Sommeil agité avec rêves vifs, mais dont on ne conserve pas le souvenir.

FIÈVRE. — Prédominance du froid. — Horripilation à la partie supérieure du corps ou aux jambes, avec hérissément des cheveux, comme après avoir fait une longue course à pied, ou entendu quelque histoire effrayante. — Sensation de froid, surtout dans les doigts. — **Fièvre avec froid dans le ventre.*

MORAL. — Anxiété et appréhensions. — Indifférence pour toutes choses. — Tristesse pleureuse. — Bouffonnerie et gaieté excessive.

TÊTE. — *Pesanteur permanente de la tête.* — *Mal de tête compressif* ou pressif, avec sensation, en montant un escalier, comme si un poids très-lourd pesait sur le front, amélioré en appuyant la main sur la tête. — Tête entreprise et embarrassée dans l'appartement, avec lenteur de la conception, améliorée au grand air. — Maux de tête tensifs. — Rongement extérieur au sommet de la tête. — Douleurs brûlantes à la peau du front.

YEUX. — Obscurcissement des yeux, en lisant. — Enroissement spasmodique et fréquent des paupières.

OREILLES. — Tintement d'oreilles. — Craquement dans l'oreille, en mâchant. — Écoulement par les oreilles. — Élançements dans les oreilles.

NEZ. — Odeur nauséabonde, devant le nez, comme d'œufs pourris. — Tension à la racine du nez.

VISAGE. — Rougeur et chaleur du visage pendant le sommeil. — Chaleur du visage avec froid aux pieds. — Tressaillement visible des muscles de la face et des paupières.

BOUCHE ET GORGE. — Sensation de paralysie au côté gauche du palais, en bâillant et en toussant. — Sécheresse et âpreté dans la gorge, qui gênent la déglutition de la salive. — Désir de la viande, et dégoût du pain et du beurre.

APPÉTIT ET ESTOMAC. — Amertume douceâtre dans la bouche. — Renvois à vide, fréquents. — Après le repas, embarras pénible de la tête. — Boulimie, quelquefois après avoir mangé. — Crampes d'estomac contractives. — Grouillement continu dans l'estomac, comme s'il était vide. — Chaleur dans l'estomac, suivie de faim violente.

VENTRE ET SELLES. — **Sensation de froid dans le ventre*, surtout en pressant dessus. — Douleur d'excoriation aux téguments du ventre. — Ballonnement du ventre par affluence de flatuosités. — Pincements dans le ventre. — Constipation. — Selles dures avec pincements dans le ventre.

URINES ET PARTIES GÉNITALES. — Envie fréquente d'uriner, avec évacuation peu abondante. — Exaltation de l'appétit vénérien, sans excitation de l'imagination ni érections.

LARYNX ET POITRINE. — Voix enrouée et rauque, avec obturation des oreilles, comme si quelque chose s'y était introduit. — Rétrécissement spasmodique du larynx, avec excitation à la toux, en faisant des efforts pour respirer. — *Compression lancinante des deux côtés de la poitrine.* — Douleur pénible de brisement dans les reins, *en étant assis et en se baissant.* — Élançements sourds et térébrants sur l'omoplate gauche. — Déchirement entre les omoplates. — *Roideur et lourdeur des muscles du cou et de la nuque.*

MEMBRES. — Déchirement paralytique et tractions crampoïdes, dans les bras, les mains et les doigts. — Roideur spasmodique du bras, avec rétraction involontaire des doigts. — Tressaillement douloureux dans le bras et le petit doigt. — *Douleur de brisement dans les cuisses.* — °Secousses et mouvements convulsifs dans les cuisses.

139. — MEPHITIS PUTORIUS.

MEPH. — Le suc fétide du putois. — **HERING.** — *Dose usitée : 30.* — *Durée d'action :* peu de temps.

ANTIDOTES : *Camph.* ne soulage que pour peu de temps.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs rhumatismales.* — Douleurs qui changent de siège, avec envie d'uriner. — Quelquefois, sensation comme si on était touché par des étincelles électriques. — *Sensation de paralysie*, surtout pendant les douleurs. — Grand abattement et lassitude, pendant lequel les muscles sont douloureux au toucher et au mouvement. — *Paresse, avec besoin de*

s'étendre et pandiculations. — Agitation interne dans tout le corps, avec sensation de malaise indicible. — *Vibration légère des nerfs*, comme jusque dans l'intérieur des os. — °Beaucoup de symptômes se manifestent le matin.

SOMMEIL. — Forte envie de s'endormir, au point de dormir même en société. — Somnolence le jour, avec bon sommeil la nuit. — Bâillement fréquent qui fait couler les larmes. — *Rêves très-vifs dont on conserve le souvenir.* — Rêves d'eau, de feu, de pertes pénibles, de crachement de sang, etc. — *Cauchemar.* — Réveil la nuit, avec *congestion de sang et chaleur dans les jambes.* — *Engourdissement somnolent, le matin*, avec brûlement dans les yeux et déchirement dans les membres; grand soulagement en changeant de position. — *Réveil fréquent et de bonne heure*, souvent avec sensation de bien-être.

FIÈVRE. — Froid le soir, avec besoin d'uriner et coliques, comme pour la diarrhée. — Chaleur à la tête, aux parties génitales et aux jambes, la nuit. — *Augmentation de la chaleur, surtout le matin*, avec peau moins sensible au froid et à l'eau froide. — Les lotions froides paraissent très-agréables.

MORAL. — Mauvaise humeur pour des bagatelles ou des peines imaginaires. — Inaptitude aux travaux intellectuels, à cause d'une trop grande vivacité de l'imagination. — Très-grande loquacité, comme si on avait trop bu. — Excitation avec chaleur à la tête.

TÊTE. — Vertiges en se baissant subitement, en étant assis, quand on remue la tête, en se retournant dans le lit, ou le soir. — *Embarras sourd de la tête*, comme si elle devenait plus volumineuse, accompagné de mauvaise humeur et de nausées. — Maux de tête violents, avec sensation de plénitude, comme une pesanteur ou une pression, surtout à l'occiput; sensation à diverses parties, comme si on y enfonçait le doigt. — *Douleur au-dessus des yeux.* — Maux de tête par le mouvement de la voiture, ou bien le soir.

YEUX. — *Lancinations dans les yeux*, comme des coups d'aiguille. — Douleurs dans les yeux en les tournant, comme si quelque objet s'y était introduit, ou qu'on les eût trop fatigués. — Chaleur, brûlement et pression dans les yeux, surtout le matin et le soir. — Pression sur les paupières et brûlement aux bords, comme s'il allait paraître un orgelet. — Injection des veines de la sclérotique. — °*Rougeur de la conjonctive*, comme par ecchymose. — Myopie. — *Confusion des caractères, en lisant.* — Trouble de la vue. — °Impossibilité de lire de petits caractères. — Cécité nocturne. — Généralement, pendant la faiblesse de la vue, douleurs dans les yeux ou dans la tête. — C'est surtout le soir que les yeux sont affectés.

OREILLES. — **DENTS.** — Déchirement dans les oreilles ou dans la mâ-

choire et les dents. — Otagie. — Prurit, chaleur, rougeur et érysipèle à l'oreille extérieure (droite). — Sécheresse du nez. — Épistaxis. — Besoin prolongé d'éternuer. — Coryza fluent, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — *Douleurs dans les dents cariées* (moliares), surtout dans la mâchoire inférieure. — Secousses subites dans les racines des dents. — Tractions et déchirement dans les dents.

APPÉTIT ET ESTOMAC. — *Nausées*, avec grattement dans la gorge et sensation comme si la tête était gonflée, à jeun. — Renvois sanglotants. — Renvois soulagés par des flatuosités. — Engouement facile en buvant et en parlant. — Besoin pénible et inutile de renâcler. — Goût métallique. — °Désir d'aliments salés. — Appétit alternativement violent ou nul. — *Le matin, absence d'appétit*, et répugnance même pour la fumée du tabac. — Après le repas, courbature et envie de dormir.

VENTRE. — Douleurs dans les hypochondres; douleurs rhumatismales (du côté droit), ou comme par des flatuosités (du côté gauche). — *Pression à l'estomac, avec coliques*. — Sensation de vacuité dans l'estomac et nausées. — Coliques, comme pour une diarrhée, non suivies de selles. — Pression et mouvements dans le ventre, comme à la suite d'un refroidissement, avec sensation de froid, tremblement et besoin d'uriner, amélioré auprès du feu. — Maux de ventre, le soir.

SELLES, PARTIES GÉNITALES. — *Selles peu fréquentes, mais liquides*. — Diarrhée. — Envie fréquente d'uriner, surtout la nuit, avec émission d'urine claire. — Après un accès de fièvre, le soir, urine trouble, avec dépôt. — Prurit au scrotum. — Chaleur des parties génitales. — Excoriation des parties génitales chez la femme, et gonflement des grandes lèvres.

LARYNX ET POITRINE. — Toux, en lisant à haute voix, en parlant et après s'être engoué en buvant. — °Toux matutinale, avec expectoration à la suite d'un catarrhe. — °Mucosités expulsées par un toussotement tous les matins. — °Souffrances catarrhales. — Douleurs aux côtes (gauches), au toucher et à la pression, mais surtout en toussant et en éternuant. — Douleur d'excoriation à la partie postérieure des côtes et dans la poitrine, en respirant profondément et en remuant le dos.

TRONC ET BRAS. — Douleurs dans un côté du cou (droit). — Tension dans les muscles de la nuque. — Douleur et sorte de paralysie dans le dos et dans tous les membres. — Lancination dans l'épine dorsale pendant le mouvement. — Brisement dans les reins, le matin. — *Douleurs rhumatismales dans les bras*, avec tractions paralytiques, améliorées par le mouvement. — Déchirement ou sensation de brisement dans les os. — *Inquiétudes dans le bras*,

qui est comme insensible. — Tremblement dans le bras, en s'appuyant dessus. — °Tressaillement de la main. — Sensation pénible dans la première phalange du doigt, qui oblige à l'étendre et à le faire craquer.

JAMBES. — Douleurs tractives et rhumatismales dans les cuisses, la hanche et le pied, mais principalement dans la jambe. — Brisement dans le genou. — Douleur crampoïde et subite dans le pied, qui oblige à sautiller. — °*Inquiétudes dans les jambes*, comme si elles allaient s'engourdir. — Lancinations dans le pied. — Douleur dans le talon, comme la goutte. — Picotement ou sensation de pincement dans le gros orteil. — Brûlement dans le petit orteil. — Continuellement, *douleurs et brûlement dans les cors*.

140. — MERCURIUS.


MERC. — Mercure. — **HANNEMANN.** — *Doses usitées* : 3, 12, 30. — *Durée d'action* 3 à 4 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES : Arn. asa. bell. camph. carb-v. chin. dulc. electr. hep. iod. lach. lyc. mez. nitr-ac. op. sass. sep. sil. sulf. — *On l'emploie comme antidote de* : Aur. bell. ant. chin. coff. cupr. diad. dulc. fer. lach. mez. op. sulf. valer.

COMPARER AVEC : Acon. amm. ant. arg. arn. ars. asa. aur. bar. bell. bry. calc. carb. caus. cham. chin. elem. coff. colch. con. capr. dig. dulc. euphorb. guai. hep. iod. lach. laur. lyc. mez. nitr-ac. n-vom. op. phos-ac. puls. rhus. sass. selen. sep. sil. staph. stront. sulf. thui. valer. veratr. C'est surtout après : Bell. hep. lach., que le mercure convient, s'il est d'ailleurs indiqué. — Après le mercure, conviennent quelquefois : Bell. chin. dulc. hep. lach. nitr-ac. sep. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances par suite d'un refroidissement, principalement à la fraîcheur du soir; Affections rhumatismales et arthritiques, avec gonflement inflammatoire; Inflammations locales; *Souffrances syphilitiques, scrofuleuses*, rachitiques, hydropiques; *Affections principalement des sujets lymphatiques*, pléthoriques, ou des personnes d'une constitution leucollegmatique, d'une *nutrition malade*, faibles de corps et d'esprit, disposées à se refroidir et à transpirer facilement, avec tempérament flegmatique et porté à la mélancolie; Accès de convulsions?, d'épilepsie?; Cachexie par l'abus du quinquina ou du soufre; Souffrances chroniques par l'abus du vin ou du café, ainsi que par suite d'excès vénériens, ou l'onanisme; Congestions sanguines et hémorrhagies; Exostoses, nécrose, carie et autres maladies des os; *Arthrocace?*; *Gonflement et inflammation des glandes*; Éruptions galeuses, miliaires, urticaires, purulentes

et pustuleuses; Dartres sèches, furfuracées, ou vives, croûteuses et suppurantes; *Érysipèles simple et flegmoneux*; Taches et ulcères syphilitiques, et autres *ulcérations et suppurations*; Ictère; Scarlatine maligne?; Pétite vérole dans la période de suppuration; *Fièvres inflammatoires, avec disposition à transpirer abondamment*; Fièvres typhoïdes, avec caractère muqueux, ou bilieux, ou putride; Atrophie des enfants scrofuleux; Mélancolie; Nostalgie?; Ivrognerie; Congestion cérébrale, avec vertiges; Céphalalgie *rhumatismale* ou catarrhale; Céphalalgie nerveuse?; Apoplexies sanguine?, séreuse?; Commotion du cerveau; Encéphalite; Hydrocéphale aiguë?; *Teigne*; Chute des cheveux; *Ophthalmies scrofuleuses, rhumatismales, catarrhales* (et arthritiques?); *Ophthalmie syphilitique*; Ulcères de la cornée; Amblyopie amaurotique; Héméralopie?; Blépharophthalmie; Ectropion?; Otite?; *Otalgie rhumatismale et catarrhale*; Dureté de l'ouïe après un refroidissement ou par suite d'angines tonsillaires; Otorrhée; Ozène; *Érysipèle flegmoneux du nez*; Croûte de lait et dartres faciales; Dentition difficile des enfants, avec fièvre; *Prosopalgies et odontalgies rhumatismales, avec fluxion*; Trismus; Balbutiement?; *Stomacace*; *Aphthes des enfants*; *Glossite*; Grenouillette; Angines tonsillaires, pharyngées et palatines, avec flegmon; Ulcères syphilitiques à la gorge; Salivation; Affections gastricomuqueuses et bilieuses, avec vomissement, diarrhée et fièvre; Choléra?; *Hépatite*; Carreau; Ictère; Entérite?; Péritonite?; *Ascite*; *Coliques, avec diarrhée*; Diarrhée après les morbilles, ou chez les nourrissons; Diarrhée pendant la dentition; *Dysenterie*; Chute du rectum; Souffrances vermineuses; *Diarrhées muqueuses* ou bilieuses; *Hématurie*; *Diabète sucré*?; Urétrite et gonorrhée; Orchite; CHANCRES; *Bubons scrofuleux et syphilitiques*; Érysipèle au scrotum; Chute du vagin; Inflammation et hydropisie des ovaires?; Péritonite puerpérale?; Métrite?; Cancer de l'utérus?; Dysménorrhée; Leucorrhée; Stérilité; Érysipèle; Excoriation et ulcération des mamelles; Affections catarrhales et inflammatoires des voies aériennes et des poumons; Aphonie; *Grippe*; Phthisie?; Asthme humide?; Hydrothorax; Crampes de poitrine par la vapeur de l'arsenic ou du cuivre; Coxalgie; Panaris.

 *Voy. la note, page 47.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — **Douleurs déchirantes et tractives* ou lancinantes, aux membres, principalement la nuit, à la chaleur du lit, qui rend les douleurs insupportables. — °*Gonflements inflammatoires* d'un rouge luisant. — **Douleurs ostéocopes nocturnes*. — *Aggravation des souffrances la nuit*, ou le soir, ainsi que par l'air frais (du soir). — Battements, sensation de luxa-

tion, et **douleurs arthritiques dans les articulations*, avec gonflement. — **Douleurs rhumatismales*, avec sueur abondante, mais qui ne soulage point. — Le matin et dans le repos, et principalement en étant couché, on se trouve beaucoup mieux qu'en étant assis ou en marchant. — **Tout le corps est comme brisé*, avec endolorissement de tous les os. — Principalement le soir, grande agitation dans les membres, avec douleurs dans les articulations. — **Grande fatigue, faiblesse et chute rapide des forces*, avec grand malaise du corps et de l'esprit. — *Bouillonnement de sang et tremblements fréquents*, même après le moindre effort. — **Congestions sanguines et hémorrhagies*. — Grande disposition des membres à s'engourdir. — Crampes, **mouvements convulsifs* et **accès d'épilepsie nocturnes*, avec cris, roideur du corps, ballonnement du ventre, prurit au nez et soif. — Spasmes toniques et tétanos. — Roideur cataleptique du corps. — *Accès d'évanouissement*. — Paralyse de plusieurs membres. — *Amaigrissement et atrophie de tout le corps*. — **Surexcitation et surexcitabilité de tous les organes*.

PEAU. — **Couleur jaune de la peau*, avec transpiration qui colore le linge en jaune. — **Engorgement, inflammation et ulcération des glandes*, avec douleurs pulsatives et lancinantes, gonflement dur, rouge et luisant, ou sans altération notable de la peau. — **Éruptions miliaires*, urticaires, boutonneuses, ou pustuleuses et purulentes. — Boutons pruriteux, avec brûlement après s'être gratté. — **Éruptions qui ressemblent à la gale, et qui saignent facilement*. — **Les plaies s'ulcèrent facilement* (et passent à la gangrène). — *Inflammation érysipélateuse*. — Taches rouges, élevées, ou taches hépatiques, ou semblables aux taches scorbutiques. — *Petits boutons très-pruriteux qui s'ulcèrent* et se couvrent d'une croûte. — **Taches dartreuses*, excoriées et suintantes, ou **dartres sèches, pruriteuses et farineuses*. — Desquamation de la peau. — **Ulcères phagédéniques*, ou bleuâtres, fongueux et facilement saignants, ou superficiels et comme rongés par des insectes, ou sécrétant un pus ichoreux et corrosif. — **Ulcères chancreux*. — *Prurit violent et voluptueux* par tout le corps, principalement le soir, ou la nuit, augmenté par la chaleur du lit, et quelquefois avec brûlement après s'être gratté. — Épaississement du périoste; **exostose et carie*; abcès dans les articulations; grande fragilité des os.

SOMMEIL. — **Disposition excessive au sommeil, le jour et la nuit; sommeil profond et prolongé*. — Envie de dormir sans le pouvoir. — **Le soir, sommeil tardif, et le matin, réveil de trop bonne heure*. — **Sommeil très-léger et agité*, avec réveils fréquents, sursauts et effroi. — *Insomnie par surexcitation nerveuse*. —

Rêves fréquents, anxieux, horribles, fantastiques, historiques, vifs, voluptueux ; rêves de brigands, de chiens qui mordent, de révolte, de déluge, de coups de fusil, etc., etc. — **La nuit*, inquiétude, anxiété, *agitation et jactation*, malaise, douleurs, chaleur ou sueur, ébullition de sang, cris, pleurs, battements de cœur, vertiges et beaucoup d'autres souffrances. — En s'endormant, aggravation des douleurs, sursauts et fantômes effrayants devant la vue ; pendant le sommeil, paroles, gémissements, soupirs, respiration courte, avec bouche ouverte et mains froides ; **au réveil*, sueur, cris, pleurs et paroles incohérentes.

FIÈVRE. — *Froid, frissons et horripilation par tout le corps*, principalement après avoir dormi le jour ou la nuit, ainsi que la nuit, ou le soir et le matin au lit, et quelquefois avec couleur bleuâtre de la peau, *froid glacial des mains* et des pieds, palpitations musculaires, mouvements convulsifs de la tête, des bras, des jambes, sensation de brisement dans les membres et besoin de se coucher, tremblement des membres, douleurs vives à la tête, envie d'uriner, somnolence, etc. — *Chaleur du visage et de la tête, avec rougeur et brûlement des joues et froid ou frissons, ou horripilation par tout le corps* ; ou **chaleur mêlée de frissons* ou de sueurs. — *Pendant la chaleur, soif inextinguible*, grand désir de lait, et aggravation des douleurs en se découvrant. — **Accès fébriles la nuit* ou le soir ; **fièvres*, avec symptômes inflammatoires, ou avec un état putride ; **fièvres lentes et hectiques*. — **Pouls irrégulier, ou accéléré*, fort et intermittent, ou faible, lent et tremblotant. — **Sueurs abondantes, excessives et débilitantes, tant le jour que la nuit, le matin, le soir* après s'être couché, et en mangeant, et quelquefois *fétides* ou *acides*, ou huileuses, colorant le linge en jaune. — *Sueur avec nausées et envie de vomir, grande fatigue, soif, anxiété, suspension de la respiration, points de côté, etc., etc.*

MORAL. — **Grande angoisse, inquiétude et agitation*, avec peur de perdre la raison, ou avec *tourment intérieur excessif*, principalement le soir ou la nuit au lit, comme si l'on avait commis quelque crime. — **Accablement moral*, avec *grande indifférence*, découragement, horreur du travail et dégoût de la vie. — Appréhensions. — Mauvaise humeur, *disposition à se fâcher et à s'emporter*, grande susceptibilité de caractère, *humeur querrelleuse*, méfiance et soupçons. — **Morosité* et répugnance pour la conversation. — **Gémissements*. — Surexcitation et grande irritabilité morale. avec disposition à s'effrayer facilement. — Distraction, inadvertance, conception difficile. — **Inaptitude à toute méditation*, et facilité à se tromper en parlant. — *Faiblesse de la mémoire*. — Instabilité des idées, dont l'une chasse constamment l'autre.

— *Radoteries*. — *Accès de manie et de démence*, avec disposition aux pleurs. — Perte de connaissance et de la parole. — Fureur, avec horreur des liquides.

TÊTE. — * *Obnubilation*, ivresse et étourdissement, principalement le matin, au réveil ou en se levant. — * *Vertiges*, principalement en se levant ou en redressant la tête, ou étant assis, ou couché sur le dos, ainsi que pendant ou après la promenade au grand air, ou le soir, et souvent avec nausées, obscurcissement des yeux, chaleur anxieuse et besoin de se coucher. — Pesanteur, plénitude et pression dans la tête, comme si le front était serré par un bandeau, ou que le crâne dût éclater. — (Le soir) sensibilité douloureuse du cerveau, avec fatigue de la tête par le bruit, améliorée en appuyant la tête sur le bras. — *Maux de tête excessifs* qui forcent à comprimer la tête des deux mains. — * *Chaleur et brûlement*, ou *douleurs déchirantes et tractives*, ou *élançements dans la tête*, n'occupant souvent qu'un seul côté et se propageant jusqu'aux oreilles, aux dents et au cou. — Bouillonnement, térébration et fouillement, coups et battements dans la tête. — Douleur et meurtrissure au cerveau, le matin au lit. — *Céphalalgie nocturne*. — Douleurs ostéocopes à la tête, et * *exostoses* au crâne. — Gonflement de la tête; * *endolorissement du cuir chevelu*; douleurs vives et brûlantes aux téguments du crâne. — Éruption sèche à la tête; petites croûtes dans les cheveux, quelquefois avec prurit brûlant; * *croûtes suintantes*, avec *excoriation du cuir chevelu* et destruction des cheveux. — *Chute des cheveux*. — * *Sueur à la tête et au front*, quelquefois froide et visqueuse.

YEUX. — Yeux troubles, ternes, cernés. — * *Pression dans les yeux*, comme par du sable, * *principalement en s'efforçant de fixer un objet*. — Élançements, * *prurit*, *démangeaison* et *brûlement aux yeux*, principalement au grand air. — * *Yeux rouges, enflammés*, avec rougeur de la conjonctive ou de la sclérotique, et injection des veines de la sclérotique ou de l'angle externe des yeux. — * *Larmoiement abondant des yeux*, principalement le soir. — * *Sensibilité excessive des yeux à la lumière et à l'éclat du feu*. — * *Pustules* sur la conjonctive et ulcères de la cornée. — * *Paupières rouges, enflammées, gonflées*, * *ulcérées* sur les bords, et couvertes de croûtes. — * *Sensation sous la paupière*, comme s'il y avait là un instrument tranchant. — Tumeur à la paupière, comme un orgelet. — * *Agglutination nocturne des paupières*. — * *Occlusion spasmodique des paupières*, avec difficulté de les ouvrir. — * *Croûtes autour des yeux*. — * *Amblyopie et trouble de la vue*, comme par un brouillard; * *perte momentanée de la vue*; * *points noirs, mouches volantes*, flammes et étincelles devant les yeux. — Mobilité des caractères en lisant.

OREILLES. — * *Douleurs déchirantes, lancinantes* et tractives dans les oreilles, parfois avec sensation de froid, comme s'il y avait de la glace dans l'oreille, augmentées par la chaleur du lit. — L'oreille et le conduit auditif sont comme enflammés, avec douleurs crampoïdes et lancinantes. — * *Excoriation et ulcération* de la conque. — * *Otorrhée purulente* et ° excroissances fongueuses dans l'oreille, * avec déchirement dans le côté affecté de la tête et du visage. — Écoulement de sang par les oreilles. — Écoulement de cérumen. — Tumeur sous-cutanée, et boutons furfuracés et suintants au lobe. — * *Durété de l'ouïe*, quelquefois avec obturation des oreilles, qui cesse en avalant ou en se mouchant, ou avec retentissement extraordinaire de tous les sons dans l'oreille. — Tintement, * *bruissement* et *bourdonnement* dans les oreilles, principalement le soir. — Sensibilité douloureuse et gonflement inflammatoire des parotides.

NEZ. — * *Gonflement des os du nez*, avec sensibilité douloureuse au toucher. — Prurit au nez. — Tension, pression et sensation de pesanteur du nez. — ° *Couleur noirâtre du nez*. — *Gonflement inflammatoire et rougeur luisante du nez*, avec prurit. — Croûtes dans les narines. — Écoulement d'un pus fétide et corrosif par les narines. — * *Saignement de nez, fréquent et abondant*, même pendant le sommeil, et quelquefois en toussant. — Obturation et ° *sécheresse du nez*. — *Éternement fréquent*. — ° *Coryza sec*, avec obturation du nez, ou * *coryza fluent*, ° avec écoulement abondant de sérosités corrosives. — Odeur putride par le nez. — Pustule douloureuse au nez.

VISAGE. — * *Face pâle*, ° ou jaunâtre, ou teint plombé, * ou terreux. — Traits décomposés, tirés. — Cercle d'un rouge bleuâtre autour des yeux. — Chaleur fébrile et rougeur des joues. — * *Bouffissure et gonflement du visage*, principalement autour des yeux. — * *Gonflement de la joue*. — * *Déchirement dans les os et dans les muscles* (d'un côté) du visage. — Pression et points dans l'os zygomatique. — Sensation de tension de la peau, au visage et à la tête. — Sueur du visage. — Taches rouges et dartreuses à la face. — * *Croûte jaunâtre au visage*, avec suintement d'une humeur fétide, prurit continu le jour et la nuit, et saignement après s'être gratté. — * *Lèvres rudes, sèches et ° noirâtres*, avec brûlement en les touchant. — Gonflement et *ulcération des lèvres*. — * *Croûtes jaunâtres*, pustules purulentes et petits ulcères aux lèvres et autour du menton. — * *Gerçures, rhagades et ulcération* aux coins de la bouche. — Distorsion de la bouche, et mouvements convulsifs des lèvres. — * *Serrement et immobilité des mâchoires*, avec gonflement inflammatoire de la mâchoire inférieure et * *tension dans les muscles du cou*. — ° *Engorgement et*

gonflement inflammatoire des glandes sous-maxillaires, avec douleurs lancinantes ou pulsatives, ou sans douleurs. — Carie de la mâchoire.

DENTS. — * *Douleurs déchirantes, lancinantes*, ou pulsatives, dans les dents cariées, ou dans les racines des dents, se propageant souvent jusqu'aux oreilles et dans toute la joue du côté affecté, quelquefois même avec gonflement douloureux de la joue ou des glandes sous-maxillaires, salivation et frissons. — * *Apparition ou aggravation des maux de dents*, principalement le soir, ou la nuit, à la chaleur du lit, où ils sont insupportables; renouvellement par l'air frais, ainsi qu'en mangeant et en prenant dans la bouche quelque chose de chaud ou de froid. — * *Agacement, noirceur, vacillement et chute des dents*. — * *Prurit et rougeur des gencives*. — Gencives fongueuses et saignant facilement. — * *Décollement et gonflement des gencives*, principalement la nuit, avec douleur brûlante et sensation d'excoriation en y touchant et en mangeant. — * *Gencives livides, décolorées et très-sensibles*. — * *Ulcération des gencives*.

BOUCHE. — * *Odeur fétide, cadavéreuse, de la bouche*. — Couleur bleuâtre, excoriation et * *gonflement inflammatoire de l'intérieur de la bouche*. — Douleur brûlante, vésicules, ampoules, * *aphthes et ulcères dans la bouche*. — Sensation de sécheresse dans la bouche et le palais, ou * *accumulation de mucosités tenaces*. — Ulcération de l'orifice des conduits salivaires, et * *écoulement abondant d'une salive excessivement fétide*, et quelquefois même sanguinolente. — * *Langue humide, chargée de mucosités blanches et épaisses*, ou sèche, ° brune ou noirâtre. — * *Dureté, gonflement inflammatoire et ulcération de la langue*, avec douleurs lancinantes. — Roideur, insensibilité et immobilité de la langue. — * *Sensation sur la langue, comme si elle était brûlée*. — Tremblement de la langue. — * *Parole accélérée et balbutiante; perte entière de la parole*. — Ulcération et carie du palais.

GORGE. — * *Sécheresse douloureuse de la gorge*, qui empêche de parler. — * *Douleur d'excoriation et cuisson dans la gorge, ou sensation de chaleur qui remonte dans le gosier*. — * *Douleurs lancinantes dans la gorge et dans les tonsilles*, principalement en avalant. — * *Allongement et gonflement de la luette*. — * *Suppuration des amygdales*. — Pression et douleurs d'excoriation et d'ulcération dans l'œsophage. — * *Gonflement inflammatoire et rougeur de toutes les parties de l'arrière-bouche et de la gorge*. — ° *Accumulation de mucosités épaisses et tenaces dans la gorge*. — * *Sensation comme s'il y avait une tumeur ou quelque corps étranger dans la gorge qu'il fallût avaler*. — * *Besoin continuel d'avalier*. — * *Déglutition douloureuse, difficile*, et quelquefois

même *spasmodique*, avec péril de suffocation. — * *Impossibilité d'avaler le moindre liquide, qui sort par les narines.* — * Les maux de gorge s'étendent ordinairement *jusqu'aux oreilles*, aux parotides, aux glandes sous-maxillaires et à celles du cou; ils s'*aggravent, pour la plupart, en avalant à vide*, ainsi que la nuit, à l'air frais et en parlant, et ils sont souvent *accompagnés de salivation*.

APPÉTIT. — * *Goût putride, salé, douceâtre, ou métallique.* — *Goût amer*, principalement le matin, à jeun. — *Goût amer ou douceâtre du pain de seigle.* — * *Goût acide et muqueux* pendant et hors le temps des repas. — * *Soif violente, ardente, le jour et la nuit*, avec désir de *boissons froides*, et principalement de lait et de bière. — * *Désir de vin et d'eau-de-vie.* — * *Appétit et faim insatiables*, avec insipidité des aliments. — *Boulimie* avec grande faiblesse. — * *Manque d'appétit.* — Nul désir d'aliments, qui cependant sont agréables au goût en les mangeant. — *Soif plus prononcée que l'appétit.* — *Satiété prompte en mangeant.* — *Dégoût de tous les aliments*, principalement *des aliments solides, de la viande*, des sucreries, des aliments cuits et du café. — *Grande faiblesse de la digestion* avec faim continuelle, et *pression dans l'estomac, rapports fréquents*, pyrosis et beaucoup d'autres incommodités après le repas. — Le pain pèse sur l'estomac.

ESTOMAC. — * *Nausées et envie de vomir excessives*, souvent avec *douleurs incisives et pressives dans l'estomac, la poitrine et le ventre*, anxiété et inquiétude, mal à la tête, vertiges, obscurcissement des yeux, et chaleur fugace. — *Les nausées augmentent souvent après le repas*, et sont accompagnées d'une sensation dans la gorge, comme si l'on avait mangé des choses sucrées. — *Rapports*, principalement après avoir mangé, et souvent d'un *goût putride ou amer, ou aigre et rance.* — * *Renvois à vide violents.* — Régurgitation après avoir bu et mangé. — Pyrosis, régurgitation de liquides rances et *hoquets pendant et après le repas.* — * *Vomituration et vomissement de matières muqueuses, amères, ou de bile.* — Vomissement violent avec mouvements convulsifs. — *Brûlement, douleur violente et *sensibilité excessive dans l'estomac et dans la région précordiale.* — * *Tension, plénitude et *pression comme par une pierre dans le creux de l'estomac*, principalement pendant ou après le repas, pour peu que l'on ait mangé. — Douleur vive, constrictive, dans la région précordiale. — Douleurs crampoïdes à l'estomac pour peu qu'on ait mangé.

VENTRE. — * *Sensibilité douloureuse de la région hépatique*, avec *douleurs lancinantes*, brûlantes, augmentée par tout mouvement du corps ou des parties affectées. — * *Gonflement et dureté du foie.* — * *Ictère complet.* — * *Ventre dur et ballonné, avec endolo-*

rissement au toucher, principalement à la région ombilicale. — **Coliques violentes, avec tranchées, élancements comme par des couteaux*, contraction douloureuse et pincements dans le ventre, **principalement la nuit*, ou à la fraîcheur du soir. — Tension et *pression comme par une pierre*, principalement à la région ombilicale. — Brûlement dans le ventre autour du nombril. — **Douleurs excessives et insupportables dans le ventre*, qui ne disparaissent qu'étant couché. — Mal au ventre, comme par suite d'un refroidissement. — Sensation comme si les intestins étaient relâchés et qu'ils remuassent dans le ventre, en marchant. — **Les maux de ventre sont souvent accompagnés de frissons ou de chaleur et de rougeur des joues*, ainsi que d'une grande sensibilité du ventre et de la région précordiale à tout contact et à la moindre pression. — Souffrances par des flatuosités, principalement la nuit, avec ballonnement du ventre, borborygmes et gargouillement. — Tension, pression et élancements comme par des couteaux, dans les aînes. — **Engorgement et gonflement inflammatoire des glandes inguinales* avec rougeur et sensibilité douloureuse en marchant et étant debout. — **Ulcération et suppuration des glandes inguinales*.

SELLES. — **Constipation, avec selles dures, tenaces et noueuses*, et qui ne sortent qu'après beaucoup d'efforts. — **Envie inutile, mais fréquente, d'aller à la selle, surtout la nuit*, et quelquefois avec *ténésme*, sortie des hémorroïdes et nausées. — **Selles diarrhéiques et dysentériques*, principalement la nuit, avec *coliques et tranchées violentes*, besoin pressant d'expulser les matières, *ténésme et brûlement à l'anus*, pyrosis, *nausées et rapports*, angoisse, chaleur ou sueur froide au visage, *frissons et horripilation*, épuisement et tremblement de tous les membres. — **Diarrhée par l'air frais du soir*. — **Évacuations peu abondantes de mucosités sanguinolentes*. — **Selles muqueuses ou bilieuses, ou putrides; ou acides, ou d'une couleur verdâtre ou brunâtre, ou rougeâtre, ou jaune de soufre, ou d'un blanc grisâtre*. — Selles de la consistance de la bouillie, ou écumeuses, ou comme des matières hachées. — **Évacuation de matières corrosives et brûlantes*. — **Sortie de sang ou de mucosités par le rectum*, même avec des selles non diarrhéiques, et hors le temps des selles, quelquefois avec *ténésme à l'anus*. — Sortie des hémorroïdes. — **Sortie d'ascarides et de lombrics*. — Prurit, élancements et excoriation à l'anus. — **Chute du rectum*, qui, à sa sortie, paraît noir et saignant. — **Selles de matières non digérées, ou noires et comme du goudron*.

URINES. — *Envie continuelle d'uriner le jour et la nuit*, quelquefois avec des efforts inutiles, ou avec émission peu abondante. — Jet

d'urine excessivement mince. — *Évacuation fréquente et abondante d'urine, comme dans le diabète*, avec amaigrissement excessif. — Envie pressante d'uriner, avec incontinence d'urine. — Pissement nocturne. — Émission d'urine goutte à goutte. — *Urines de couleur foncée, ou rouges, ou brunes, ou blanches comme mêlées de farine ou de craie, ou couleur de sang.* — **Urines fétides, troubles et formant un dépôt, ou sanguinolentes, ou d'une odeur acide.* — **Urines corrosives et brûlantes.* — Dépôt épais dans les urines. — Nuages blancs et floconneux dans les urines. — Sortie de mucosités dures ou de flocons et de filets blancs pendant ou après l'émission de l'urine. — *Écoulement de sang par l'urèthre. — °Douleurs incisives et contractives dans la région rénale, la nuit. — Pulsation, *douleurs incisives, brûlement et élancements dans l'urèthre*, même hors le temps de l'émission des urines. — Inflammation de l'orifice de l'urèthre, et écoulement de matières épaisses, jaunâtres, ou séreuses, blanchâtres.

PARTIES VIRILES. — *Excitation de l'appétit vénérien et grande lasciveté*, avec éruptions et pollutions fréquentes. — *Érections nocturnes douloureuses*, et quelquefois pollutions sanguinolentes. — Verge petite, froide et flasque. — Prurit voluptueux, fourmillement, déchirement et élancements au gland et au prépuce. — Enflure ou gonflement inflammatoire du prépuce, quelquefois avec douleurs brûlantes, gerçures, rhagades et éruptions. — *Sécrétion purulente entre le prépuce et le gland*, quelquefois avec gonflement; chaleur et rougeur de la partie antérieure de la verge. — **Vésicules et ulcères phagédéniques à fond lardacé et à bords élevés*, au gland et au prépuce. — Sensation de froid dans les testicules. — °Testicules durs et gonflés, avec rougeur luisante du scrotum **et douleur tractive dans les testicules et le cordon spermatique.* — Prurit, fourmillement et élancements dans les testicules. — Forte transpiration des parties en marchant. — Excoriation entre les parties et les cuisses.

RÈGLES. — *Suppression des règles. — *Règles trop abondantes* avec inquiétudes et coliques. — *Métrorrhagie.* — *Avant les règles, chaleur sèche, avec ébullition de sang et congestion à la tête. — °Pendant les règles, langue rouge, avec taches foncées et brûlement, goût salé de la bouche, dents agacées et gencives décolorées. — *Flueurs blanches purulentes corrosives*, avec démangeaison aux parties. — Prurit, boutons et nodosités aux lèvres. — Gonflement inflammatoire du vagin, avec sensation comme si tout était à vif et excorié. — °Gonflement des lèvres avec chaleur, dureté, rougeur luisante, grande sensibilité au toucher, et douleurs brûlantes, pulsatives et lancinantes. — **Chute du vagin.* — Conception facile et certaine. — **Tuméfaction dure des ma-*

melles, avec douleurs d'ulcérations, ou *avec suppuration et ulcération réelle. — *Excoriation des mamelles.

LARYNX. — *Catarrhe, avec frissons fébriles, humeur hypochondriaque, dégoût de tous les aliments et constipation. — *Enrouement continué, et perte de la voix.* — Voix nasillarde. — *Brûlement et chatouillement au larynx. — *Toux sèche, quelquefois fatigante et ébranlante, principalement le soir au lit, ou la nuit, même pendant le sommeil, et le matin en se réveillant, excitée par un chatouillement ou une sensation de sécheresse dans la poitrine, et aggravée en parlant. — Toux comme par une irritation de l'estomac. — *Toux convulsive, avec vomiturition. — En toussant, douleurs à la tête et dans la poitrine, comme si ces parties devaient éclater, ou élancements à l'occiput, ou douleur d'excoriation dans la poitrine et mal aux reins. — Envie de vomir et accès d'étouffement, en toussant. — Toux, avec expectoration de sang pur. — Toux rauque, avec sensation de sécheresse et élancements dans la gorge.

POITRINE. — Respiration difficile, comme si l'haleine manquait, ou courte et bruyante. — *Haleine courte, en montant l'escalier et en marchant vite. — Oppression anxieuse de la poitrine, et gêne de la respiration, avec besoin de respirer profondément, principalement après le repas, ou avec accès de suffocation la nuit, ou le soir au lit, étant couché (sur le côté gauche). — Manque d'haleine, avec serrement et tension dans la poitrine, et sensation comme si, au moindre mouvement et à la moindre parole, la vie allait s'éteindre. — Pression dans la poitrine, quelquefois jusqu'au dos, avec impossibilité de respirer profondément. — Brûlement dans la poitrine, quelquefois jusque dans la gorge. — *Élancements* (comme par des couteaux) dans la poitrine et dans les côtés, ou jusqu'au dos, principalement en respirant, en éternuant et en toussant. — Sensation de meurtrissure et de gonflement, et douleur d'excoriation et d'ulcération dans la poitrine. — *Battements de cœur.

TRONC. — Douleurs vives et sensation de meurtrissure dans les muscles de la poitrine. — Élancements, manque de solidité et faiblesse aux reins. — Douleur de meurtrissure aux reins, au dos et aux omoplates. — Brûlement et *douleur tractive au dos et à la nuque. — Roideur et gonflement rhumatismal de la nuque et du cou. — Élancements dans les muscles du cou. — Engorgement et gonflement inflammatoire des glandes du cou, avec douleurs lancinantes et pressives.

BRAS. — *Douleurs vives dans les épaules et les bras, principalement la nuit et en remuant ces parties. — Tressaillements dans les bras et les doigts. — Gonflement chaud et rouge du coude jus-

qu'à la main. — Miliaire pruriente aux bras. — *Dartres furfuracées et brûlantes à l'avant-bras et au poignet. — Craquement, *faiblesse et sensation de paralysie de la main*. — Sueur à la paume des mains. — *Éruption galeuse aux mains. — **Contraction crampoïde des mains et des doigts*. — Gonflement des articulations des doigts. — **Gercures et rhagades profondes et saignantes aux mains et aux doigts*. — Douleurs crampoïdes et enraidissement facile des mains, en travaillant. — Gonflement du poignet, avec douleur au toucher et en le remuant. — *Roideur des poignets*. — Ulcération aux ongles. — Exfoliation des doigts. — Doigts morts.

JAMBES. — **Douleurs vives et lancinantes dans l'articulation coxo-fémorale*, ainsi que dans les cuisses et les genoux, *principalement la nuit*, et pendant le mouvement, et souvent avec sensation de froid dans les parties malades. — Grande faiblesse, *lourdeur et courbature dans les cuisses et les jambes*. — Sensation de roideur, de torpeur et de crampes dans les cuisses. — Boutons pruriteux aux cuisses. — *Gonflement œdémateux, transparent, des cuisses et des jambes*. — Tension dans les jarrets, comme si les tendons étaient trop courts. — Miliaire pruriente, aux jambes. — *Dartres aux cuisses et aux jambes. — *Contraction des jambes, et crampes aux mollets et aux orteils*. — *Gonflement du cou-de-pied ou des talons*, avec douleurs vives ou lancinantes. — *Douleur de luxation au pied*. — Froid et sueur aux pieds. — *Gonflement douloureux des os du métatarse. — *Gonflement des orteils*. — Ulcération des ongles.

141. — MERCURIUS ACETATUS.

MERC-AC. — Acétate de mercure. — HAHNEMANN.

SYMPTOMES. — Éruption pruritante à la peau, brûlante après avoir gratté; les bords des ulcères deviennent douloureux. — *Rêves pénibles après minuit*; on se noie, on rêve de brigands qui veulent vous assassiner, de dangers par l'eau et le feu. — *Horripilation*, dans la matinée, précédée de tiraillements dans les membres; chaleur, la nuit, surtout après minuit, avec sensation comme si l'on transpirait; transpiration abondante pendant le mouvement. — *Yeux enflammés dans les angles*, avec prurit brûlant, le matin et le soir. — *Dans la gorge*: sécheresse qui empêche de parler, avec toux; élancements pressifs dans le fond, plutôt en toussant qu'en avalant. — *Dans l'urèthre*: brûlement

pendant et hors le temps où l'on urine; émission fréquente d'urine; le matin, émission d'urine abondante, mais lente, comme par resserrement et avec ténésme; douleur incisive à la dernière goutte d'urine. — *Verge* enflammée et gonflée sur le devant, avec brûlement et élancements qui réveillent la nuit, sont aggravés par l'eau froide et soulagés par l'eau tiède; dans les *testicules*, douleur de contraction. — Dans les *grandes lèvres*, gonflement intérieur (règles 4 jours trop tôt à la nouvelle lune). — *Douleurs de poitrine* comme si elle était à vif, ou comme si elle était ulcérée intérieurement; pression sur le sternum, avec gêne de la respiration en se tenant debout. — Dans les *maines*, déchirements, avec grosseur et rougeur des articulations.

142. — MERCURIUS CORROSIVUS.

MERC-C. — Mercure corrosif. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 15, 30. — *Durée d'action* : 3 à 4 semaines dans des affections chroniques.

CLINIQUE. — C'est surtout dans les *Dysenteries* que jusqu'ici on a eu devoir préférer le sublimé corrosif au mercure vif ou au mercure soluble.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions dans le périoste*, comme avant un accès de fièvre intermittente, avec sensation de chaleur à la tête. — En s'endormant, sursauts violents avec ébranlement de tout le corps. — *Grande disposition à avoir froid*, surtout à la tête. — *Frisson provoqué dès qu'on se donne le moindre exercice*, comme aussi au grand air (même lorsqu'il fait chaud), parfois avec tranchées et ténésme. — Chaleur en se baissant; on se sent rafraîchi dès qu'on se redresse. — Mauvaise humeur, pendant laquelle rien ne satisfait, alternant avec hilarité.

YEUX — VENTRE. — Yeux enflammés et proéminents. — Fixité du regard. — Inflammation de l'iris, avec inégalité de la pupille. — Distorsion des traits du visage. — Gonflement des lèvres. — *Gonflement et renversement de la lèvre supérieure*. — Haleine fétide. — *Salivation*, avec goût salé. — Gonflement de la langue et de la gorge. — Soif inextinguible. — Sensation brûlante et douloureuse, depuis la bouche jusque dans la région de l'estomac. — Ventre fortement ballonné et douloureux.

SELLES. — *Selles dysentériques, avec évacuations bilieuses et fétides, vertes ou brunes, ou de mucosités rares et sanguinolentes*,

accompagnées de tranchées presque continuelles, d'efforts douloureux et de ténésme. — *Envie inutile d'aller à la selle. — *Évacuations d'excréments mêlés de mucosités et de sang foncé et coagulé.

URINES. — RÈGLES. — Ténésme de la vessie. — *Écoulement par l'urèthre, d'abord séreux, puis épais, avec cuisson en urinant et élancements dans l'urèthre. — Leucorrhée d'un blanc jaunâtre, avec odeur douceâtre, nauséabonde. — Gonflement douloureux des glandes du sein.

POITRINE — MEMBRES. — Toux creuse, sèche, ébranlante. — Élan-
cements nocturnes à travers la poitrine. — Élan-
cements dans l'articulation coxo-fémorale, pendant le repos et le mouvement.
— Froid glacial aux pieds.

143. — MERCURIUS DULCIS.

MERC-DULC. — Calomel. — Versustes Quecksilber. — HANNEMANN.

SYMPTOMES. — Desquamation de la peau, surtout aux mains et aux pieds; *Ulcères phagédéniques*, avec fond blanc et bords douloureux et enflammés, dans la bouche, le palais, le visage, les parties génitales et autres, avec fièvre chaude, sueurs nocturnes abondantes, déchirements dans les membres, affaissement des forces et tremblement. — *Fièvre* quelquefois chaude, putride. — Chute des cheveux. — Surdité par un gonflement qui comprime la trompe d'Eustache. — Épistaxis violent. — Difficulté d'ouvrir la bouche. — Dans les *dents*, brûlement violent, les dents se déchassent, tremblent et tombent; *gencives* gonflées et saignant au contact. — *Ulcères dans la bouche*, saignant la nuit surtout; aphthes sur la langue; *salivation*, quelquefois avec hémorrhagies; salive horriblement fétide qui attaque les lèvres et les joues. — Diarrhées. — Forte oppression dans la poitrine et la région du cœur.

144. — MERCURIALIS PERENNIS.

MERCUR-PER. — Mercuriale vivace. — ARCHIVES DE STAFF. — *Durée d'action?*
ANTIDOTES?

GÉNÉRALITÉS. — Déchirement dans les membres, tantôt fugace, tantôt plus durable; élancements isolés dans les membres. —

Lassitude, sensation de meurtrissure dans les membres, bâillements et esprit peu disposé à réfléchir. — *Lassitude et grande fatigue*, parfois avec vertiges, et souvent avec envie de dormir. — *La lassitude et la fatigue se font surtout sentir le matin et le soir.*

PEAU. — Boutons au menton. — Prurit et éruption de petits boutons sur un côté du ventre. — Prurit brûlant et picotant, par-ci par-là, comme produit par des puces.

SOMMEIL. — *Forte et fréquente envie de dormir, avec lassitude et fatigue, surtout le soir de bonne heure.* — *Somnolence invincible et sommeil continu de plusieurs heures, le jour.* — Envie de dormir avec étourdissement. — *Sommeil nocturne agité, plein de rêves, avec réveil fréquent.* — Beaucoup de chaleur la nuit, avec forte sueur le matin. — Rêves de serpents et de sangliers.

FIÈVRE. — Sensation de froid et frisson léger, suivi de chaleur avec joues d'un rouge foncé. — Frissonnement, avec chaleur à la face. — Frisson général, partant du bras droit, avec grelottement, lassitude, faiblesse, fatigue, envie continuelle de dormir, pression dans l'estomac et le ventre, oppression et respiration difficile, puis, après minuit, sueur fétide, surtout aux deux bras. — Frissons le soir au moment de se coucher, puis chaleur nocturne avec soif, surtout vers le matin. — Le soir, au lit, frisson dans l'estomac, se répandant de là vers le côté droit de la poitrine et du ventre jusqu'à la hanche et au bras du même côté, avec respiration difficile, puis, vers le matin, chaleur aux parties affectées, suivie de forte chaleur du côté droit. — *Forte chaleur à la tête, aux mains et aux pieds, avec forte rougeur des joues et veines enflées aux mains.* — Soif fréquente.

MORAL. — Surexcitation et violence. — Morosité, humeur chagrine et envie de se quereller. — Tristesse indifférente, mélancolie et envie de pleurer. — *Humeur gaie, éveillée, avec envie de rire, de plaisanter, de chanter et de faire des farces.* — Sorte de stupeur, comme si l'on était plongé dans des rêveries. — Difficulté de se rappeler telle ou telle chose. — Espèce d'ivresse légère.

TÊTE. — Vertige en descendant l'escalier, comme si l'on allait perdre connaissance. — Après avoir eu mal à la tête, vertige avec une sorte d'ivresse et chancellement jusqu'à faire tomber en se baissant ou en marchant. — Pendant les vertiges, sensation continuelle, comme si le corps allait tomber du côté gauche. — *Vertige tournoyant.* — Chaleur à la tête pendant les vertiges. — *Pression, surtout au front*, mais aussi aux tempes, à la racine du nez, et entre les yeux, dans la région de la glabella. — *Tension dans la tête*, surtout au front et aux yeux, ou bien avec sensation d'engourdissement dans la région des sourcils. — Sensation comme si

le front était trop volumineux. — Pesanteur de la tête, comme si une charge lourde pesait dessus, avec torsion, engourdissement et mouvement difficile du cuir chevelu. — *Sensation de plénitude et de tension* à la tête. — Tête comme enflée, avec étourdissement. — *Sensation* comme si le côté gauche de la tête était vide. — *Déchirement à la tête*, surtout aux tempes, au front, à l'occiput, comme dans les os, ou bien *au côté gauche de la tête et dans les dents du côté droit*, le soir. — *Élancements* dans les tempes, ou bien dans toute la tête jusqu'à faire crier. — *Chaleur à la tête avec rougeur foncée des joues*. — Mouvement difficile des muscles temporaux. — Sensibilité douloureuse du front et des tempes au toucher.

YEUX. — Faiblesse et *pesanteur des paupières*, avec *difficulté de les remuer*, tension, *sécheresse*, sensation de paralysie ou de contraction, et agglutination après les avoir fermées. — Frémissement dans les paupières. — *Chaleur, brûlement et pression dans les yeux, avec sécheresse*. — *Démangeaison aux paupières*. — Rougeur des paupières à la surface interne et surtout aux bords, avec suppuration facile. — *Yeux larmoyants comme si un coryza allait se déclarer*. — Sensation comme si les yeux étaient poussés hors de la tête, ou comme si le globe était très-gros et difficile à remuer. — *Pression à la partie postérieure ou au fond des yeux*. — Tension dans les yeux et les tempes, comme par gonflement. — Déchirement et pression dans les yeux. — *Sensibilité douloureuse des yeux à la lumière du soir*, ainsi qu'en écrivant ou en lisant. — Sensation comme si quelque chose pesait sur les yeux et allait les fermer. — *Aspect terne des yeux*. — *Regard fixe*. — *Besoin fréquent de cligner*, surtout en regardant des objets éclairés. — *Pupilles fortement dilatées*. — Confusion des lettres et des points en lisant et en cousant. — *Vue trouble, comme par un voile*, ou un brouillard.

OREILLES. — Sensation comme si quelque chose s'était placé devant l'oreille gauche. — Déchirement, pression, tiraillement dans les oreilles, partant du côté gauche.

NEZ. — Sécheresse et sensation de sécheresse au nez. — Nez coulant, comme dans le coryza. — Sensation de tiraillement dans les os du nez, avec écoulement de quelques gouttes de mucosités. — Coryza très-fort; un coryza chronique qui avait disparu revient. — Sécheresse et sensation brûlante d'excoriation dans le nez, surtout en serrant fortement la partie osseuse. — Sensation de chaleur au nez; l'haleine paraît tantôt brûlante, tantôt froide. — Picotement dans le nez comme par du poivre.

FACE. — *Forte rougeur et chaleur de la face, surtout aux joues*. — Sensation de tension et d'engourdissement à la face, comme si

elle était enflée. — *Pression et déchirement dans les joues et les os de la face.* — Sensation de froid au visage. — Très-mauvaise mine, avec cercles bleus autour des yeux. — Prurit et petites nodosités au menton. — *Lèvres sèches*, avec soif augmentée. — Picotement brûlant à la lèvre supérieure.

DENTS. — *Déchirement dans les dents et leurs racines*, surtout du côté gauche. — Sensation d'émoussement aux dents incisives gauches de la mâchoire supérieure.

BOUCHE. — *Grande sécheresse de la bouche et manque de salive au point de ne permettre qu'avec grande peine d'avaler du pain.* — *Bouche visqueuse, sèche et chaude.* — Salive tenace et visqueuse. — Bouche pâteuse. — Brûlement et fourmillement dans la bouche. — *Langue sèche*, gonflée et comme engourdie aux côtés. — *Langue blanche, sèche et comme insensible.* — Brûlement picotant et mordicant à la langue. — Sensibilité douloureuse de la langue aux mouvements, comme si elle était couverte de vésicules, surtout du côté gauche. — Langue, tantôt plus sensible, tantôt comme insensible au goût. — *Sécheresse et lourdeur de la langue, empêchant presque de parler*, comme par paralysie.

GORGE. — *Grattement dans la gorge*, comme après avoir mangé des choses grasses. — Sensation comme si l'intérieur de la gorge était au vif, avec douleur en avalant, en remuant le cou et en parlant. — *Sécheresse brûlante à la partie supérieure et postérieure de la gorge, gênant fortement la déglutition.* — Douleur contractive, brûlante, dans la gorge. — Pression dans l'amygdale gauche, ou bien au fond de la gorge, comme s'il y avait là une grosseur. — Sensation de chaleur à la gorge, paraissant remonter de l'estomac. — *Élancement dans la gorge, surtout en avalant, avec rougeur de la luette, du palais et de la gorge.* — Accumulation de mucosités dans la gorge.

APPÉTIT ET GOÛT. — Goût de la bouche savonneux ou comme si l'on avait mangé de l'ail. — *Goût acide de la bouche* et du pain. — Goût amer de la bouche avec pyrosis et maux de cœur. — Tout ce qu'on mange, même le pain, a un goût amer. — Appétit très-prononcé.

ESTOMAC. — *Maux de cœur fréquents, avec envie de vomir*, augmentés après le repas. — Pyrosis suivi d'envie de vomir et de haut-le-corps avec rapports, brûlement dans l'estomac et goût amer de la bouche. — Renvois fréquents, parfois surtout en se baissant, ou avec soulagement des souffrances gastriques et abdominales. — Sensation de vide ou de fadeur dans l'estomac, comme si l'on était à jeun. — Sensation comme si quelque chose s'élargissait dans l'estomac. — *Estomac comme plein et ballonné.* — *Mouvement brûlant dans l'estomac, descendant parfois jusqu'au ventre,*

et se terminant par des rapports ou par la sortie de vents. — *Pression dans l'estomac comme par une pierre, avec gargouillement dans le ventre, et parfois aussi avec tension et ballonnement de l'estomac dans la région du cardia, soulagé par des rapports et la sortie de vents. — Sensation de gonflement et pression dans l'estomac, se propageant par tout le ventre et jusqu'à la poitrine, avec oppression. — Frissonnement dans l'estomac, suivi de chaleur avec sueur.*

VENTRE. — Serrement dans l'hypochondre gauche. — *Pression dans les régions du foie et de la rate, précédé parfois, dans la rate, par une sensation de chaleur. — Douleur rongearite à côté du creux de l'estomac, se propageant vers la région de la vessie biliaire. — Mouvements contractifs et pressifs dans le ventre, souvent soulagés par des rapports ou par des vents, et fréquemment avec gargouillement bruyant, ou bien oppression de la poitrine et du cœur. — Pincement dans le ventre, parfois partant de la région des hanches ou du sacrum, ou bien depuis le nombril jusqu'à la vessie. — Borborygmes et gargouillements bruyants dans le ventre, avec ou sans sortie de vents. — Sensation de pression vers l'aîne gauche, comme si une hernie allait sortir, ou bien, avec élancements, jusque dans le cordon spermatique. — Sortie fréquente de vents, et beaucoup de gargouillements bruyants dans le ventre.*

SELLES ET ANUS. — *Selles molles, abondantes, suivies parfois de légères épreintes. — Selles liquides, parfois précédées de maux de ventre. — Diarrhée, avec coliques continues. — Prurit, brûlement, cuisson et fourmillement à l'anus. — Pression dans le rectum, avec pression tensile à la région sacrée.*

URINES. — Envie fréquente d'uriner, avec urines augmentées, et parfois avec ardeur dans l'urèthre pendant l'émission. — Brûlement et picotement dans l'urèthre. — Fourmillement dans l'urèthre et au prépuce, avec fourmillement à l'anus, et pression et déchirement dans la région sacrée.

RÈGLES. — *Règles de trop courte durée, ou même retardées, avec bouillonnement de sang, grande angoisse et disposition à la défaillance, respiration difficile, oppressée, chaleur par tout le corps, surtout à la tête et dans la poitrine, sueur anxieuse, pesanteur dans les membres, tremblement, et les jours suivants, mamelles enflées et douloureuses, mal de tête avec défaillance qui force à se coucher.*

POITRINE. — *Pression à la poitrine, avec pression dans l'estomac et respiration difficile. — Battement dans le côté droit de la poitrine, le soir, au moment de s'endormir. — Respiration difficile, surtout du côté droit. — Haleine chaude, presque brûlante, au point que les lèvres s'en ressentent douloureusement. — Bouil-*

lonnement dans la région du cœur, avec angoisse et sensation de plénitude dans le côté gauche de la poitrine. — Oppression contractive dans la région du cœur. — Battement ondulant dans la région du cœur, le creux de l'estomac et l'épigastre, avec tremblement et bouillonnement dans toutes les artères, pulsation des artères abdominales, tête entreprise et étourdie comme par conjection sanguine, pouls plein et fréquent, oppression, tension au creux de l'estomac, pincement dans le ventre et sortie de quelques vents. — Palpitations de cœur, avec oppression, nommément après s'être baissé.

TRONC. — *Pression et déchirement dans la région sacrale, parfois avec pression dans le rectum ou fourmillement à l'anus.*

EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES. — *Déchirement dans les bras et les avant-bras, parfois tressaillant, lancinant ou contractif. — Déchirement dans les muscles et les tendons des mains et des doigts. — Élançement et tressaillement dans les bouts des doigts.*

EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES. — *Déchirement dans les cuisses, aux genoux, dans les rotules, les jambes, les tibias, les malléoles, les pieds, les talons et les orteils, surtout du côté gauche. — Élançements à côté du tibia et dans le mollet de la jambe gauche, ainsi que dans le talon gauche. — Brûlement à la plante des pieds.*


148. — MEZEREUM.

MEZ. — Bois gentil, Daphne Mezéreon. — **HAHNEMANN.** — *Doses usitées : 15, 30. — Durée d'action : jusqu'à 30 jours, dans quelques affections chroniques.*

ANTIDOTES : Camph. merc. — *On l'emploie comme antidote de : Merc. nitr-ac.*

COMPARER AVEC : Euphor. hell. hyos. ignat. merc. nitr-ac. puls. siaph. verat. zinc.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Inflammation, ramollissement, carie et autres affections des os ; Suites fâcheuses de l'abus du mercure ; Affections scrofuleuses avec glandes engorgées ; Rachitisme ? ; Carreau ? ; Fièvres intermittentes ; Teigne ; Ophthalmies ; Prosopalgie et odontalgie rhumatismales ? ; Hématurie ; *Flueurs blanches, opiniâtres* ; Raccourcissement des tendons de la jambe, etc., etc.

 *Voy. la note, page. 17.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions, déchirements rhumatis-*

maux et tension dans les membres, avec faiblesse paralytique. — Douleurs tressaillantes qui laissent longtemps après elles une sensation pénible. — Douleurs tractives dans un côté du corps, avec frissons. — **Accès de douleurs et autres souffrances accompagnées de frissons et d'horripilation.* — Douleurs rongeantes d'excoriation dans les membranes muqueuses. — *Brûlement dans les organes de la digestion.* — **Inflammation et gonflement des os.* — **Ulcération des os.* — *Tressaillement et frémissement des muscles.* — Tractions et sensation d'accablement dans les articulations. — Brisement et pesanteur dans tous les membres. — Lourdeur et paresse du corps. — Marche courbée. — **Amaigrissement ou bouffissure du corps et du visage, avec ventre gros, chez les enfants.* — Glandes douloureuses. — *Prédominance des souffrances d'un seul côté du corps.* — Exacerbation des symptômes le soir. — *Douleurs aggravées en touchant la partie affectée et par le mouvement.* — Grande susceptibilité à l'air froid.

PEAU. — Desquamation générale de la peau du corps. — **Prurit, surtout la nuit, plus violent et plus douloureux après s'être gratté, et quelquefois avec gonflement de la partie qu'on a grattée.* — Prurit rongeur, comme par de la vermine. — *Éruptions miliaires, quelquefois chroniques.* — Furoncles. — *Ulcères enflammés, avec brûlement et élancement, ou avec douleur rongeur d'excoriation.*

SOMMEIL. — Forte envie de dormir le jour, avec sommeil agité et non réparateur, la nuit. — Secousses dans le corps pendant le sommeil. — Réveil de bonne heure (vers 2 ou 3 heures du matin), par un cauchemar.

FIÈVRE. — **Frissonnement, frissons et froid de tout le corps, surtout aux mains et aux pieds, avec soif violente, et quelquefois sans désir de se réchauffer.* — Après les frissons, sommeil avec sueur. — **Fièvre, accompagnée de mal à la tête, pâleur du visage, région splénique douloureuse, gonflée et dure, faiblesse, et *grande susceptibilité à l'air froid; *type tierce.* — Fièvre inflammatoire, violente.

MORAL. — Humeur hypochondriaque, avec tristesse et pleurs. — Angoisse et inquiétude, surtout dans la solitude, avec désir de la société. — *Maussaderie.* — Emportements. — Inaptitude au travail. — Faiblesse de la mémoire. — *Émoussement de l'intelligence.* — Conception lente. — *Les idées se perdent fréquemment.*

TÊTE. — Embarras stupéfiant dans la tête, comme si on était ivre, ou comme après des pollutions immodérées. — Vertige à faire tomber de côté, avec scintillement devant les yeux. — *Maux de tête, avec horripilation et frissons, aggravés en plein air.* — *Maux de tête pressifs et étourdissants, d'un seul côté du cer-*

veau. — Douleur d'écartement compressive ou crampoïde dans la tête. — Violentes douleurs pulsatives et pressives dans toute la tête, le front, le nez et les dents, aggravées par le mouvement le plus léger. — Mal de tête martelant, avec vomissement de mucosités. — *Sensation de torpeur avec douleurs tractives dans un côté de la tête. — *Douleurs ostéocopes dans le crâne*, aggravées par le toucher. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu et des cheveux au toucher. — Prurit rongéant au cuir chevelu. — *Éruption pruriente à la tête, parfois avec suintement.

YEUX. — Douleur comme si le globe des yeux était trop volumineux, avec pression. — Cuisson dans l'angle interne des yeux. — *Inflammation des yeux. — Myopie ou presbyopie. — Étincelles devant les yeux. — Pupilles contractées.

OREILLES. — Otalgie avec traction et tiraillements aigus. — Éruption pruriente et suintante derrière les oreilles. — Dureté de l'ouïe. — Sensation d'obturation des oreilles. — Tintement dans les oreilles, quelquefois avec envie de dormir.

NEZ. — *Excoriation de l'intérieur du nez*. — Diminution de l'odorat, avec sensation de sécheresse dans le nez, et quelquefois envie inutile d'éternuer. — Éternement fréquent, accompagné de douleur d'excoriation dans la poitrine. — *Coryza fluent*, avec sécrétion de mucosités liquides et jaunes, excoriation et brûlement dans le nez, et éruption aux lèvres.

VISAGE. — *Pâleur du visage. — *Pression crampoïde et étourdisante, dans les os des joues, quelquefois d'un seul côté, et s'étendant jusqu'à l'œil, à la tempe, à l'oreille, aux dents; au cou et dans l'épaule. — Tractions dans les os des mâchoires. — Tressaillement continu et pénible dans les joues et les paupières. — Furoncles à la face. — Excoriation et brûlement aux lèvres et aux commissures des lèvres. — Lèvres gonflées et gercées, avec exfoliation. — Lèvre supérieure ulcérée avec douleur brûlante au toucher. — Élançements dans les glandes sous-maxillaires.

DENTS. — *Douleurs dans les dents cariées. — *Élançements tractifs, brûlants ou térébrants, dans les dents et jusque dans les os des joues et les tempes. — *Douleurs tressaillantes et déchirantes dans les dents. — *Sensation comme si les dents étaient agacées, et qu'elles fussent trop longues. — Les maux de dents sont aggravés par le toucher et le mouvement, ainsi que pendant les frissons, le soir. — Pendant les maux de dents, ébullition de sang à la tête, frissons et constipation. — Dents enduites de mucosités fétides. — *Dents qui se carient promptement*. — Vésicules brûlantes aux gencives.

BOUCHE ET GORGE. — Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la langue. — Brûlement continu dans la bouche. — Parole embar-

rassée. — Douleur pressive dans la gorge en avalant. — Apreté, excoriation, grattement cuisant, et élancement dans la gorge et le palais. — *Brûlement dans la gorge* et dans l'œsophage. — Inflammation de la gorge. — *Constriction et rétrécissement du pharynx.*

APPÉTIT ET ESTOMAC. — Goût amer de la bière, que l'on rejette. — Faim violente l'après-midi et le soir. — Répugnance pour la viande. — *Renvois fréquents et à vide*, surtout après avoir bu. — *Nausées* avec accumulation d'eau dans la bouche, horripilation et tremblement de tout le corps. — Vomissements violents de mucosités verdâtres et amères, accompagnés de maux de tête. — *Vomissement de sang.* — *Pression à l'estomac.* — Brûlement et sensation de chaleur dans l'estomac. — Inflammation de l'estomac. — Contraction du diaphragme.

VENTRE. — Ventre dur et tendu. — *Douleurs abdominales*, chroniques, *crampoides*, *tirailantes*, *aiguës*, pressives, constrictives et lancinantes. — Pesanteur dans le ventre. — Sensation de chaleur et *brûlement dans le ventre.* — Inflammation des intestins. — Pression expansive dans l'anneau inguinal. — Traction dans les glandes de l'aîne. — *Coliques flatulentes* avec gargouillements et borborygmes dans le ventre, *gêne de la respiration et frissons.*

SELLES. — Évacuations alvines difficiles, de la consistance d'une bouillie épaisse, avec besoin pressant. — **Constipation.* — Selles peu abondantes, molles, fréquentes. — *Diarrhées violentes avec douleurs insupportables dans le ventre.* — Après la selle, constriction de l'anus qui se referme sur le rectum qui est sorti. — *Avant et après la selle, froid et horripilation.*

URINES. — Diminution de la sécrétion des urines. — Nuages floconneux et *sédiment rougeâtre* dans les urines. — **Pissement de sang.* — Douleur d'excoriation dans l'urèthre. — Écoulement de mucosités par l'urèthre.

PARTIES GÉNITALES. — Déchirement, tressaillement et lancination dans la verge. — Lancinations déchirantes et brûlantes au bout du gland. — Sécrétion abondante du smegma derrière le gland comme une *gonorrhée bâtarde.* — Gonflement du scrotum. — **Leucorrhée chronique* comme du blanc d'œuf; quelquefois aussi séreuse.

LARYNX. — *Enrouement*, avec brûlement et sécheresse dans la gorge, irritation qui provoque la toux et gêne de la respiration. — **Toux violente en étant couché.* — *Toux sèche avec vomiturition et vomissement* le soir et la nuit.

POITRINE. — Gêne de la respiration. — Douleurs dans la poitrine en inspirant, *comme si les poumons étaient adhérents*, et la cavité de la poitrine trop resserrée. — Pression à la poitrine. — *Tension douloureuse des muscles de la poitrine.* — Douleur d'excoriation

et brûlement sur le sternum. — *Points dans la poitrine*, aggravés en inspirant.

TRONC. — Douleurs aux reins. — Douleur contractive et tensive dans le dos et jusque dans le sacrum. — Élançements dans le dos. — Roideur douloureuse de la nuque et du cou. — Déchirements saccadés dans les côtés du cou. — Douleur d'excoriation dans les aisselles.

BRAS. — Douleur dans l'articulation de l'épaule, comme si elle allait se déboîter. — Tension tractive et rhumatismale dans les bras, avec faiblesse paralytique. — Douleurs tressaillantes dans les épaules, les bras, les mains et les doigts. — Gonflement et chaleur du bras et de la main, avec tressaillement et picotement dans les muscles.

JAMBES. — Tressaillement dans l'articulation coxo-fémorale, et jusque dans le genou. — *Raccourcissement de la jambe*. — Douleurs ostéocopes dans les cuisses et les jambes. — Déchirement, tractions et tensions dans les cuisses, les jambes, les pieds et les orteils. — Tension et roideur dans les genoux. — Tressaillement et douleur pressive dans le tibia. — Gonflement dur des mollets. — Douleur tressaillante dans les orteils.

146. — MILLEFOLIUM.

MILL. — Millefeuille. — HARTLAUB ET TRINKS. — *Doses usitées* : 0, 30. — Médicament encore très-peu connu, et qui, jusqu'ici, n'a été employé que contre des *Hémorrhagies*, et principalement contre quelques espèces d'*Hématurie* et d'*Hémoptysie* (surtout chez les phthisiques).

SYMPTOMES. — Écoulement de sang par presque toutes les ouvertures du corps. — Douleurs tractives aiguës, et élançements dans le côté droit de la tête. — Sensation comme si tout le sang se portait vers la tête. — Mouvements violents et battements douloureux dans la tête. — Saignement de nez. — **Crachement de sang*. — Vomissement de sang. — Crampes d'estomac, avec sensation comme s'il y avait un liquide qui coulât de l'estomac vers l'anus. — Douleur brûlante dans l'estomac. — Sensation comme si l'estomac était contracté et rempli de terre. — Hémorrhoides fluentes. — **Pissement de sang*. — Perte de sang par la matrice. — Douleurs tractives, aiguës, dans les genoux et les jambes. — Engourdissement fréquent des pieds.

147. — MORPHIUM ACETICUM.

MORPH-AC. — Acétate de Morphine. — ARCHIVES DE STAFF.

ANTIDOTES? — Durée d'action?

COMPARER : *Opium* et tout ce qui a trait à cette substance.

GÉNÉRALITÉS. — Le mouvement et l'action de se redresser de son lit augmentent plusieurs souffrances et causent des nausées et mal à la tête. — Toutes les souffrances disparaissent après des efforts corporels. — La position couchée soulage les souffrances. — La lecture et la tension d'esprit et l'usage du vinaigre augmentent le mal de tête. — Tremblement et manque de fermeté dans la main, en écrivant. — Douleur de meurtrissure dans les extrémités inférieures, avec formication pruriteuse dans les extrémités supérieures. — Tressaillements convulsifs aux bras, à la tête et au visage, pendant un sommeil agréable et plein de rêves. Soubresaut des tendons. — *Secousses violentes de tout le corps*, parfois avec vertige, chancellement et étourdissement. — Engourdissement et pesanteur dans les membres, en se levant de son siège. — Lassitude des membres, du sacrum, du cou et des articulations, avec pouls irrégulier, conjonctive injectée, face rouge et bouffie, lèvres pâles. — Accès de défaillance, avec pupilles dilatées, langue pâle, bouche amère et pâteuse. — Accès (de syncope) avec perte de connaissance, respiration pénible, tête tirée en arrière, face bleuâtre, sueur visqueuse aux parties supérieures du corps, frigidité des extrémités inférieures, pouls petit, intermittent, et secousses violentes de tout le corps.

PEAU. — Démangeaison à la peau, parfois avec éruption de petites bosses rondes. — Éruptions de petites papules roussâtres, par-ci par-là, surtout aux bras et aux cuisses. — *Prurit violent à la peau.* — Éruption par tout le corps.

SOMMEIL. — Somnolence de plusieurs heures, avec rêves de toutes sortes, mais en gardant la connaissance parfaite de son état. — *Sommeil agité, interrompu*, avec réveil en sursaut. — *Sommeil tranquille, profond*, de plusieurs heures. — *Pendant le sommeil* : tressaillement des membres ou des muscles de la face; peau sèche avec prurit; joues rouges; face couverte de sueur et pouls fréquent. — *Après le sommeil, au réveil* : mal à la tête; accablement général; roideur des membres; douleurs dans les bras; éruption de petites papules; douleurs le long de la colonne vertébrale; lassitude, dégoût, angoisse; douleur dans le creux de l'estomac

et dans la vessie, avec fort besoin d'uriner et urines claires, mais peu abondantes.

FIÈVRES. — Chaleur par tout le corps, avec extrémités froides, pulsation des carotides et étourdissement. — *Sueurs abondantes*, parfois avec pouls plein; étourdissement et tressaillements convulsifs légers, ou bien avec pouls fréquent et pupilles dilatées. — *Pouls* : *accélééré*; lent, plein et intermittent; dur, petit et fréquent; fréquent, avec mal de tête violent et pesanteur au front.

MORAL. — Émoussement des forces intellectuelles. — Incapacité de travailler et de s'occuper de choses intellectuelles. — Grande tranquillité d'esprit. — Forte excitation. — Inquiétude avec mal à la tête et douleur dans la région ombilicale.

TÊTE. — *Étourdissement*, parfois avec pupilles dilatées, gargouillement dans le ventre et pouls fréquent. — Mal de tête augmenté par la lecture, la tension de l'esprit et l'usage du vinaigre. — Tête entreprise avec douleur sourde. — Vertige avec envie de dormir. — Pesanteur au front. — *Forte chaleur à la tête*, parfois se répandant par tout le corps, avec pulsation des carotides. — — Brûlement violent dans l'occiput, se répandant jusqu'à l'abdomen. — Mal de tête violent, avec face rouge, conjonctive rouge et injectée, pouls fort et battant violemment. — *Tension dans la tête*, parfois avec pouls accéléré, ou bien avec pesanteur pressive dans la tête, comme si les os pariétaux allaient être écartés. — *Douleur dans le côté droit de la tête*, parfois avec pupilles dilatées, ou bien insupportable, et avec agitation, rougeur et sueur de la face, air stupide et triste, et prurit à la peau. — Mal de tête pulsatif, avec face rouge et bouffie. — *Violente douleur au front*, parfois avec sueur froide au dos, ou bien avec lassitude, chaleur brûlante de la peau et pouls fréquent. — Douleur à l'occiput, avec pression au-dessus des yeux. — Douleur pulsative à la tête, avec face rouge. — Mal de tête expansif, avec chaleur à la face.

YEUX. — Pupilles ou fortement contractées, ou très-dilatées. — Pression au-dessus des yeux. — Sensation de plénitude dans les orbites. — Yeux comme ecchymosés, avec face bouffie. — *Conjonctive comme injectée, yeux flamboyants, rouges*, avec douleur sourde au côté droit du front. — Yeux comme couverts d'un voile, avec élancements en dedans. — Faiblesse de la vue. — Yeux brillants, avec regard stupide. — Regard farouche, désorienté. — Yeux proéminents, avec face rouge.

OREILLES. — Tintement dans les oreilles.

FACE. — *Face rouge*, parfois avec bouffissure, paupières gonflées, lèvres bleuâtres, ou bien avec lèvres pâles, yeux proéminents, bout de la langue rouge, palais couleur écarlate. — Rougeur cir-

conscrite des joues, avec air stupide, yeux brillants, pesanteur de la tête, sueur froide par tout le corps et envie de dormir. — Couleur livide et sueur de la face. — Face animée, avec lèvres livides, grande soif et envie de vomir. — Lèvres rouges, comme injectées. — Lèvres bleuâtres.

BOUCHE. — *Langue rouge*, parfois avec pupilles dilatées, ou bien avec dégoût et sécheresse contractive du gosier. — *Rougeur des bords et du bout de la langue*, parfois avec couleur violette au milieu. — Langue pâle, lourde. — Sécheresse de la langue. — Palais d'une rougeur écarlate et douloureuse.

GORGE. — Gorge irritée, avec soif ardente et coliques dans l'estomac. — Sécheresse et contraction dans la gorge.

APPÉTIT ET GOUT. — *Goût de la bouche amer et âcre.* — Appétit diminué, parfois avec pesanteur à la tête et constipation. — Pendant et après le repas, augmentation de l'étourdissement et de la pesanteur de la tête au point de forcer à se coucher. *Soif ardente*, avec langue sèche.

ESTOMAC. — *Dégoût*, parfois avec langue rouge et sécheresse de la gorge, ou bien avec envie de dormir et suivi de sueur générale. — *Nausées et envie de dormir* : avec respiration difficile, langue pâle et lourde, et pouls accéléré; avec douleur à la région ombilicale, en se levant de la position couchée; avec lassitude des articulations; avec envie de dormir, pression à la tête ou rapports; avec tête lourde et chaude, puis faiblesse des membres, et face pâle. — Nausées et envie de vomir après avoir mangé. — *Vomissements* : après avoir pris du lait, avec évacuations alvines abondantes; des aliments ingérés, le soir en se levant, après les nausées; avec douleurs à la région ombilicale, et pouls contracté, petit et intermittent; vomissement de matières verdâtres. — *Douleur violente à l'estomac, comme des coliques*, parfois avec soif ardente, gorge irritée, mal à la tête et pupilles dilatées. — Pression dans la région de l'estomac, avec envie de dormir. — *Douleur dans le creux de l'estomac*, avec respiration difficile, envie de dormir, nausées et envie de vomir, et parfois augmentée immédiatement après avoir mangé. — *Brûlement violent dans le creux de l'estomac*, avec formation pruriteuse se répandant le long de la ligne blanche jusqu'aux jarrets.

VENTRE. — Ballonnement du ventre, avec chaleur par tout le corps, extrémités froides, soif ardente, langue sèche.

ANUS ET SELLES. — *Constipation*, parfois très-opiniâtre, ou avec pesanteur à la tête, ou bien suivie de diarrhée. — Selle tardive, avec pression douloureuse et évacuation peu abondante. — *Diarrhée aqueuse*, avec douleurs à l'estomac, à la région ombilicale ou à la vessie.

URINES. — Douleur à la région de la vessie. — Urines totalement supprimées, avec besoin sans résultat. — *Urines troubles et muqueuses*, ou bien claires et limpides.

PARTIES VIRALES. — Douleur dans les organes génitaux et urinaires, surtout dans le cordon spermatique droit.

POITRINE. *Respiration anxieuse, avec douleur vive dans la poitrine* et pouls plein et fort. — Pendant l'inspiration, vive douleur dans le ventre et le long de la colonne vertébrale.

EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES. — Tremblement léger et manque de fermeté dans la main, en écrivant.

148. — MOSCHUS.

MOSCH. — Muac. — HAHNEMANN. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : 24 heures environ.

ANTIDOTES : Camph. n-mos?

COMPARER : Asa. bry. cocc. coff. con. croc. ign. n-mos. op. puls. spig. staph. stram.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — *Convulsions*; Syncope; *Faiblesse hystérique*; *Différentes affections hystériques* et hypochondriaques; Surexcitation nerveuse, avec insomnie; *Céphalalgies hystériques* et nerveuses; Migraine; *Épistaxis*; Impuissance?; *Souffrances asthmatiques*; Asthme de Millar?; Croup?; *Spasmes pulmonaires*, surtout chez les *personnes hystériques*, etc., etc.

 *Voy. la note, page 47.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Picotement dans les membres, quelquefois avec douleurs des parties affectées. — Douleurs cram-poïdes dans les membres. — Tremblement et tressaillement par tout le corps. — Faiblesse que l'on ressent plutôt pendant le repos que dans le mouvement. — *Faiblesse jusqu'à tomber évanoui, avec froideur nocturne de toute la peau du corps. — **Accès de défaillance*, surtout la nuit, le soir ou au grand air, suivis de maux de tête. — Douleur de luxation et de brisement à la partie sur laquelle on est couché. — Les souffrances s'aggravent lorsque le corps se refroidit. — Forte susceptibilité au grand air. — Pincements, élancements et prurit qui force à se gratter, à différentes parties du corps. — *Tétanos*. — **Convulsions, avec crampes de*

la poitrine. — *Symptômes hystériques*, même chez des hommes.

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir le jour*, avec bâillements fréquents et profonds. — *Somnolence.* — La nuit, impossibilité de rester longtemps couché dans la même position; la partie sur laquelle on repose est douloureuse, comme si elle était luxée ou brisée. — *Rêves vifs de choses infamantes*, et dans lesquelles rien ne réussit. — **Insomnie pendant toute la nuit* par surexcitation du système nerveux.

FIÈVRE. — Circulation du sang accélérée. — Sensation fréquente, comme s'il soufflait un air frais, surtout sur les parties découvertes. — Sensation de froid, le plus souvent à la colonne vertébrale, avec douleurs tractives. — Le grand air semble *froid*, on recherche le feu. — Horripilation fréquente et légère, partant de la tête et se répandant sur tout le corps. — Accès de chaleur brûlante, le soir. — *Tous les matins, sueur.*

MORAL. — Grande distraction et absence d'esprit, parfois avec paroles confuses. — Préoccupation, pendant laquelle on se parle à soi-même et on gesticule, comme si on avait perdu la tête. — Grande activité, avec faiblesse qui fait qu'on laisse tout tomber des mains. — *Plaintes et lamentations à cause de souffrances excessives, sans que le malade puisse dire où est son mal*; en le questionnant, il se plaint plus violemment encore, mais sans dire où il souffre. — *Crainte de mourir et peur excessive de la mort.* — Anxiété hypochondriaque, quelquefois avec battement de cœur. — *Humeur excessivement querelleuse et grande irascibilité, avec emportement jusqu'à la fureur.* — Perte de la mémoire.

TÊTE. — Vertige et vacillement devant les yeux, au moindre mouvement de la tête. — Vertige jusqu'à faire perdre connaissance, ou avec évanouissement. — Vertige, avec sensation comme si l'on faisait une chute. — *Vertige avec nausées et vomissements*, besoin de se coucher, et désir de café à l'eau. — *Étourdissement* comme par l'ivresse. — *Maux de tête, avec nausées et vomissement*, qui forcent à se coucher. — Pesanteur de la tête. — *Mal de tête compressif* et étourdissant, surtout immédiatement au-dessus de la racine du nez. — **Traction crampoïde et tensive dans la tête*, et surtout dans l'occiput, et jusque dans la nuque. — *Congestion à la tête.* — Douleur pressive et térébrante dans la tête, comme si un clou était enfoncé dans le cerveau.

YEUX. — Yeux ternes, avec douleur pressive dans les angles. — Larmolement. — Yeux fixes, étincelants, avec une sorte d'étourdissement et absence d'esprit. — Obscurcissement subit des yeux. Petits boutons rouges sur les paupières supérieures. — Prurit dans les angles des yeux.

OREILLES. — Éruptions aux oreilles, avec douleur brûlante après s'être gratté. — Crépitation et *craquement dans les oreilles*. — Bruissement devant les oreilles. — Dureté de l'ouïe. — Écoulement de cérumen par les oreilles.

VISAGE ET NEZ. — *Chaleur du visage*, quelquefois sans rougeur et avec yeux ternes. — Chaleur d'une joue sans rougeur, tandis que l'autre est rouge sans chaleur. — Teint terreux. — Tension dans les muscles de la face, comme s'ils étaient trop courts. — **Epistaxis*. — Fourmillement au bout du nez, comme par des insectes. — Exfoliation des lèvres.

ESTOMAC. — Goût putride des aliments. — Rapports violents, quelquefois avec nausées. — *Accès de nausées subites*. — Nausées qui remontent de l'épigastre, avec rétraction du nombril et douleurs crampoïdes. — *Vomissements violents surtout le matin*, et souvent accompagnés de douleur à l'estomac et à la poitrine, et de ballonnement de l'épigastre. — *Pression à l'estomac*. — *Sensation de plénitude et de gêne dans la région de l'estomac et de l'épigastre*, quelquefois avec malaise, augmentée après avoir mangé modérément. — Sensation d'excoriation cuisante, brûlante, dans la région de l'estomac, après le repas.

VENTRE. — *Accès de contraction douloureuse dans la région ombilicale*, avec suspension de la respiration. — *Sensation de tension dans le ventre, comme si tous les vêtements étaient trop justes*, accompagnée d'une anxiété qui ne permet de se livrer à aucun travail, ni de rester à la même place, mais oblige à courir constamment de côté et d'autre. — Incarcération de flatuosités.

SELLES. — *Constipation, surtout après avoir pris du café*. — *Diarrhée surtout la nuit*, et quelquefois pendant le sommeil. — Diarrhée avec tranchées violentes. — Les selles diarrhéiques sont toujours mêlées de matières stercorales. — Selle couleur de sépia. — Envie pressante et inutile d'aller à la selle.

PARTIES VIRALES. — *Forte exaltation de l'appétit vénérien*, quelquefois avec chatouillement insupportable dans les parties, ou douleurs tensives à la verge. — *Impuissance à la suite d'un refroidissement. — Pollutions douloureuses, sans érection. — Érection avec douleur brûlante dans l'urèthre. — Après le coït, nausées et vomissements.

RÈGLES. — *Menstruation trop hâtive et trop abondante*. — Traction et sensation comme si tout se portait vers le bas-ventre et les parties génitales, pendant les règles.

POITRINE. — *Constriction dans le larynx, comme par la vapeur du soufre*. — Respiration difficile et haleine courte, avec élancements dans la poitrine. — *Constriction crampoïde et suffoquante de la poitrine*, surtout lorsqu'on prend froid. — **Crampes de poitrine*.

*débutant quelquefois par un besoin de tousser, et s'aggravant ensuite jusqu'à porter au désespoir. — Douleur pressive dans la poitrine, qui va jusqu'à suspendre la respiration. — *Elançements dans la poitrine et dans les côtés*, quelquefois avec rougeur et bouffissure de la face, pupilles dilatées, langue rouge et sèche, et soif ardente. — La poitrine est fortement attaquée et douloureuse dans toutes les parties, avec toux violente et sèche. — Sensibilité douloureuse de la poitrine, sous les bras, surtout à la pression. — Battement de cœur anxieux.

TRONC. — MEMBRES. — Tractions violentes dans la nuque et le dos, comme si tout était tendu. — Tractions dans toute l'étendue du bras, et surtout au poignet comme par une crampe. — Brûlement avec sensation de froid aux dernières phalanges des doigts. — Gonflement des mains, avec douleurs lancinantes. — Mouvements convulsifs des mains et des doigts. — Inquiétudes dans les jambes, avec faiblesse paralytique qui oblige à les remuer constamment. — Vibration dans les jambes, comme après une grande fatigue, en étant assis. — Faiblesse paralytique dans les jambes, dès qu'on s'assied, après avoir marché.

149. — MUREX PURPUREUS.

MUR. — Murex à pourpre. — JOURNAL FRANÇAIS (Pétros).

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande fatigue; pendant plusieurs jours *les symptômes sont plus forts en étant assis qu'en marchant*, il cessent quand on marche et reparaissent quand on est assis. — *Peau sèche*, comme si elle allait se gercer. — *Envie de dormir*, quelquefois avec tristesse; grand besoin de dormir, vers 9 heures du soir; sommeil interrompu par des douleurs, comme celles des règles; réveil avec effroi, avec fort besoin d'uriner et émission abondante; *rêves pénibles*, quelquefois avec réveil en sursaut. — *Moral*, anxieux, craintif, peureux; grande tristesse vers le soir, avec répugnance pour la conversation et désordre des idées.

TÊTE — NEZ. — *Mémoire* affaiblie, avec difficulté de trouver les expressions. — *Embarras de la tête*, avec *inaptitude au travail*; quelquefois avec envie de dormir ou tête lourde; tête lourde, comme par un temps étouffé, ou bien fréquente, alternant de temps en temps avec grande clarté des idées; *céphalalgie*, le matin au réveil, se dissipant lorsqu'on se lève; *douleur dans l'occiput*, quelquefois très-vive; douleur dans la tempe gauche; *douleur pressive* dans le front, ou bien aussi dans la tempe droite;

serrement crampoïde au derrière de la tête, avec besoin d'y porter la main ou de renverser la tête, ce qui soulage. — Derrière les oreilles, serrement crampoïde; bruit dans les oreilles, avec aggravation de la pesanteur de la tête. — Nez froid tout le jour, très-pénible. — *Brûlement dans une joue*, la droite le soir, la gauche le matin.

ESTOMAC — SELLES. — *Faim*, quelquefois seulement le matin et absolument nulle pendant le repas. — Dans l'*hypochondre* droit, douleur tensive. — *Coliques*, douleur vive, comme un coup tranchant dans le côté gauche du bas-ventre, qui reste douloureux pendant toute la soirée. — *Selles* difficiles; *constipation*, pendant plus de 5 jours; pression sur l'anus, comme des élancements douloureux.

VOIES URINAIRES. — *Fréquent besoin d'uriner*, le jour; la nuit, avec urine sans couleur. — *Urine*: fétide, avec sédiment blanc et écoulement d'un peu de mucosités après avoir uriné. — Écoulement d'un peu de sang en urinant.

PARTIES GÉNITALES (chez la femme). — *Forte irritation des parties génitales*, avec désir ardent du coït, presque jusqu'à la folie; le plus léger contact renouvelle le désir. — Dans la *matrice*, sensation de sécheresse et de constriction; pulsation; douleur incisive, comme par des instruments tranchants; douleur violente dans le côté droit, traversant le ventre jusque dans le sein gauche; violent élancement à gauche, le soir. — Dans les *grandes lèvres*, sensation de pesanteur et d'extension; sensation de pesanteur dans le vagin, pendant les maux de ventre. — *Leucorrhée*: séreuse; verdâtre, épaisse; devenant sanguinolente; pendant la selle, réapparition d'une leucorrhée sanguinolente. — Dans les *seins*, douleurs violentes; élancements aigus.

LARYNX — POITRINE. — *Voix* altérée, enrouement; *toux*, le matin à jeun; sèche, rare, avec oppression de poitrine. — En *respirant*, sifflement dans la poitrine, le soir. — *Douleur de poitrine*, comme si elle était brisée; élancements et brûlement au-dessous des petites côtes gauches, vers le dos. — *Palpitations de cœur*, et battement des artères.

DOS — EXTRÉMITÉS. — *Lumbago*, quelquefois brûlant et comme à vif; en étant allongé, surtout au lit, douleur dans les hanches et les lombes; douleurs dans la région du bassin. — A l'*avant-bras*, douleur au-dessous du coude; chaleur dans les *main*s. — Dans les *jambes*, *grande faiblesse et fatigue*, quelquefois fléchissement et besoin insurmontable de s'asseoir. — Dans les *cuisse*s; forte douleur de meurtrissure; chaleur ardente, devant; douleur aiguë, devant, en se levant, ne supportant aucun contact; sensation de pulsation, devant.


180. — MURIATIS ACIDUM.

MUR-AC. — Acide muriatique. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 3, 30. — *Durée d'action* : jusqu'à 5 semaines dans quelques affections chroniques.

ANTIDOTES : Camph. bry.

COMPAREZ AVEC : Ars. aur. bell. bry. calc. chin. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. puls. rhus. squill.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections hydropiques?; Éruptions, dartres et autres affections scrofuleuses; Fièvres typhoïdes, putrides; Surdit  ; Affections scorbutiques; Ivrognerie?; H  morrh  ides; impuissance, etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES G  N  RAUX. — D  chirement et douleurs incisives dans les membres pendant le repos, am  lior  es pendant le mouvement. — Douleurs de brisement dans toutes les articulations. — Sensibilit   douloureuse du p  rioste de tous les os, comme dans une fi  vre intermittente. — Gonflements hydropiques. — Paresse et crainte du mouvement, avec d  sir de rester constamment assis. — *Accablement excessif*; d  s que l'on s'assied, les paup  res s'affaissent. — Marche chancelante, par faiblesse des genoux. — *Grande sensibilit   au temps humide.

PEAU. — Prurit et chatouillement voluptueux et lancinant, avec besoin de se gratter. — *  ruptions cro  teuses*, qui d  mangent    la chaleur du lit. — Furoncles, avec douleur lancinante au toucher. — *Ulc  res putrides* et douloureux, avec br  lement sur les bords. — Pustules noires.

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir le jour*, se dissipant d  s qu'on prend de l'exercice. — Insomnie avant minuit. — Avant minuit, ronflement continu, *g  missement*, jactation, paroles et disposition    glisser en bas du lit. — *R  veil fr  quent et de bonne heure*,    cause du froid qu'on   prouve au lit.

FI  VRE. — Pr  dominance du froid. — *Frissonnement*, avec b  illements et pandiculations, sans soif, et non suivis de chaleur. — *Chaleur sans soif*, avec agitation et besoin de se d  couvrir le soir. — Puls intermittent. — *Sueur nocturne*, le soir en s'endormant, ou avant minuit.

MORAL. — Tristesse. — *Taciturnit   et concentration en soi-m  me*, avec anxi  t  , *appr  hensions* et maussaderie. — *H  sitation et in-

quiétude. — Affluence d'idées sur des événements récents, pendant le travail. — Disposition à se fâcher et à s'emporter.

TÊTE. — Vertige tournoyant, avec marche chancelante. — Mal de tête par la marche au grand air, et surtout par un vent âpre. — Mal de tête aggravé en se redressant dans son lit et en se remuant les yeux, se dissipant par un exercice corporel. — *Pesanteur surtout à l'occiput*, avec obscurcissement des yeux, fortement aggravée en regardant fixement un objet. — Mal de tête, *comme si le cerveau était meurtri*. — Accès de secousses, déchirements ou élancements dans la tête.

YEUX. — Cuisson pruriente dans les angles des yeux. — Élançements au travers des yeux. — Gonflement et rougeur des paupières. — *Hémiopie verticale.

OREILLES. — Otalgie, comme des tiraillements crampoïdes et aigus. — *Pulsation dans oreilles. — *Insensibilité du conduit auditif. — Éruption croûteuse dans les oreilles. — *Dureté de l'ouïe, et surdité. — Acuité de l'ouïe, avec sensibilité au bruit. — Tintement, bourdonnement et sifflement devant les oreilles.

NEZ. — Narines ulcérées. — Obturation du nez. — Coryza avec mucosités épaisses, jaunes, ou séreuses et corrosives.

VISAGE. — Chaleur du visage, avec rougeur ardente des joues, en marchant au grand air, sans soif. — *Ephélides. — *Éruption de boutons croûteux, au visage, au front et aux tempes. — Furoncle sur la tempe. — Brûlement aux lèvres. — Bouffissure de la lèvre inférieure. — Éruptions aux lèvres, parfois se couvrant de croûtes.

DENTS. — Odontalgie, avec douleur pulsative, aggravée en buvant froid, soulagée par la chaleur. — Maux de dents, avec pression écartante. — Fourmillement dans les dents. — Gencives scorbutiques.

BOUCHE ET GORGE. — Sécheresse de la bouche, avec paralysie de la langue. — Accumulation abondante de salive. — *Pesanteur de la langue en parlant*, comme du plomb. — Ulcères profonds et pustules sur la langue. — Aridité de la langue. — *Mal de gorge avec douleur d'excoriation et cuisson dans la gorge et le palais.

APPÉTIT. — Goût de graisse rance dans la gorge. — Goût âcre et putride dans la gorge. — Goût douceâtre de tous les aliments, et surtout de la bière, qui répugne. — *Boulimie et soif immodérée*. — *Dégoût de la viande.

ESTOMAC. — *Renvois putrides ou amers. — Vomissement des aliments. — Vomissement de bile, la nuit, avec nausées et renvois. — Malaise à l'estomac, comme si l'on était gravement malade. — *Sensation de vacuité dans l'estomac*. — Douleur contractive dans

l'estomac, avec sensation comme s'il était rétracté. — Tension pressive et *douleur crampoïde dans les hypochondres.*

VENTRE. — *Malaise dans le ventre comme dans une grave maladie.* — *Plénitude et *ballonnement du ventre.* — **Douleurs crampoïdes dans le ventre,* avec tranchées et pincements depuis la région ombilicale jusque dans les côtés, accompagnées de borborygmes. — *Sensation de vacuité dans le ventre.* — Lancination dans les aines.

SELLES. — Évacuation difficile des selles, comme par inactivité du rectum. — Selles d'un moule trop mince. — Diarrhée avec cuisson et brûlement au rectum et à l'anus. — *Diarrhées d'acréments.* — Évacuation involontaire d'une selle liquide et séreuse en urinant. — *Écoulement de sang pendant les selles.* — Chute du rectum en urinant. — Prurit à l'anus. — **Boutons hémorroïdaux, gonflés et bleuâtres,* avec douleur brûlante d'excoriation. — *Hémorroïdes fluentes.*

URINES. — Ténésme de la vessie. — *Envie fréquente d'uriner avec émission abondante.* — Émission immodérée d'une urine aqueuse. — *Relâchement de la vessie et du col de la vessie.*

PARTIES GÉNITALES. — Excoriation du prépuce. — Appétit vénérien engourdi. — **Impuissance.* — Sensation comme si tout affluait vers les parties génitales, comme pour les règles. — Règles trop hâtives.

LARYNX. — *Enrouement chronique.* — Toux violente et sanglotante suivie de gargouillement dans le fond de la poitrine.

POITRINE. — Respiration profonde, avec gémissements. — Élançements dans la poitrine pendant un mouvement violent et en respirant. — Douleur tensive sur le sternum. — Coups incisifs dans la poitrine, avec pression sourde à la partie postérieure de la poitrine, et avec oppression. — Élançements dans la région du cœur. — La nuit, *coup si violent dans le cœur,* qu'on le ressent dans le visage.

TRONC. — *Douleur pressive dans le dos,* comme si on avait été courbé trop longtemps ou qu'on se fût donné un tour de reins. — Élançements dans les omoplates. — Furoncles au dos.

BRAS. — Faiblesse paralytique et douleur de luxation dans l'épaule. — *Pesanteur des bras.* — **Déchirement, pression et tiraillement dans les bras.* — Tension tractive dans l'articulation du coude. — Tractions crampoïdes et pesanteur de l'avant-bras. — Déchirement incisif dans les avant-bras, les mains et les doigts. — Prurit et chatouillement voluptueux et lancinant dans la paume des mains. — *Éruption croûteuse sur le dos de la main, et la partie supérieure des doigts.* — Douleur crampoïde à la partie charnue du pouce, en écrivant. — Gonflement du bout des doigts,

avec brûlement. — Torpeur nocturne et pâlisement des doigts, qui sont comme morts.

JAMBES. — Déchirement et tiraillement crampoïde dans les cuisses. — Taches dartreuses pruriantes sur les cuisses. — Gonflement des genoux. — Tension tractive dans le mollet et le tendon d'Achille en marchant. — Lancinations dans le tendon d'Achille, le jour et la nuit, empêchant de marcher et de dormir. — Ulcères putrides aux jambes. — *Froid aux pieds. — Gonflement de l'extrémité des orteils, avec brûlement.

151. — NATRUM CARBONICUM.


NATR. — Sous-carbonate de soude. — **HAHNEMANN.** — Doses usitées : 12, 30. —

Durée d'action : jusqu'à 40 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES : Ars. ? camph. nitr-spir ? — *On l'emploie comme antidote de* : Chin.

COMPARER AVEC : *Ars. ars. carb-an. carb-veg. caus. chin. ign. kal. lyc. merc. natr-m. n-vom. plumb. puls. sabad. sep. spig. staph. sulf.*

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances rhumatismales, avec raccourcissement des tendons; Affections scrofuleuses; Glandes engorgées; Faiblesse par suite de perte d'humeurs ou d'autres causes débilitantes; Tabes dorsalis?; *Dartres*; Verrues; Éruptions galeuses; Souffrances des lépreux; Souffrances des ivrognes?; Mélancolie et *hypochondrie*; Suites fâcheuses d'un excès d'étude?; *Ophthalmies chroniques*; Ulcères de la cornée; Fistule lacrymale?; Amblyopie amaurotique; Presbyopie; Coryza chronique; Ozène?; Balbutiement?; *Dyspepsie*, gastralgie et autres *affections gastriques*; *Hépatite chronique*; Coliques venteuses; Orchite?; *Priapisme*?; Stérilité?; Dysménorrhée; Flueurs blanches; Catarrhe; Souffrances phthisiques; Maladies du cœur?; *Goutte*, etc., etc.

 *Voy. la note, page 17.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement crampoïde, principalement dans les bras et dans les jambes. — Tractions paralytiques et déchirement dans les articulations, surtout le soir et la nuit. — *Raccourcissement des tendons.* — *Tressaillement dans les membres*, les articulations et les muscles. — *Lancinations fourmillantes dans les muscles. — *Grande disposition aux luxations et aux tours de reins. — Gonflement des glandes. — Exacerbation des symptômes

pendant l'orage. — La plupart des symptômes se manifestent pendant qu'on est assis et se dissipent par le mouvement, la pression et le frottement. — **Pendant les douleurs, angoisse, tremblement et sueur.* — Forte agitation générale du corps, le soir. — Grande sensibilité malade; avec tremblement, même en jouant du piano. — **Relâchement et manque de solidité dans tout le corps.* — Marche incertaine. — Lourdeur et paresse surtout le matin, avec crainte du mouvement. — Brisement paralytique le matin, et grande lassitude dans les membres. — **Après une marche modérée, lassitude à se laisser tomber.* — **Faiblesse prolongée.* — Amaigrissement, avec teint pâle, pupilles dilatées et urine foncée. — **Répugnance pour le grand air.* — **Grande disposition à se refroidir, suivie de rhume de cerveau ou coliques, avec diarrhée.*

PEAU. — **Sécheresse de la peau, avec sueur abondante par le moindre exercice ou le plus léger travail.* — Fourmillement sous la peau. — Gale. — **Éruption dartreuse.* — Les dartres s'étendent et suppurent. — **Cercles jaunes, comme restes de taches dartreuses.* — **Tubérosités lépreuses.* — **Verrues.* — **Élancements, douleurs incisives et brûlement, dans les parties blessées.* — **Éruptions galeuses (au ventre, chez les lépreux).*

SOMMEIL. — **Envie de dormir insurmontable le jour, avec sommeil tardif le soir, et difficulté à se réveiller le matin.* — **Sommeil agité, et plein de rêves vifs et quelquefois confus et lascifs, avec violentes érections et pollutions.* — Rêves anxieux, qui, après le réveil, semblent être vrais. — Rêves effrayants de morts, de déluges, de querelles, de brigands, de diables, de voleurs, etc. — Rêves de voyages. — La nuit, grande agitation dans le corps, ébullition de sang, battement de cœur et cauchemar, mal aux dents, coliques, vertiges avec angoisse, etc. — *Tressaillement et secousses pendant le sommeil.* — Réveil de trop bonne heure.

FIÈVRE. — Horripilation fébrile, avec mains froides et joues chaudes, et vice versa, mais toujours sans soif. — **Froid aux mains et aux pieds.* — *Sueur nocturne, souvent alternant avec sécheresse de la peau.* — *Sueur froide et continue, comme par angoisse.* — **Sueur abondante au moindre travail.*

MORAL. — Tristesse, et découragement avec pleurs et inquiétude sur l'avenir. — **Inquiétude, avec accès d'angoisse, surtout pendant l'orage et les travaux intellectuels.* — **Éloignement pour les individus et la société.* — **Humeur hypocondriaque et dégoût de la vie.* — **Découragement.* — **Disposition à s'effrayer* — **Dépit et malveillance.* — *Disposition à se fâcher et violents accès de colère.* — **Difficulté à concevoir et à combiner des idées en lisant*

et en écoutant. — **Inaptitude au travail intellectuel et à la méditation, qui fatigue la tête.* — Instabilité de l'esprit.

TÊTE. — **Embarras de la tête*, surtout dans l'appartement et pendant le repos. — **Vertige*, surtout après avoir bu du vin, et après un travail intellectuel. — **Mal de tête au soleil*, ou en tournant promptement la tête. — Sensation d'obturation pressive dans la tête, comme si le front allait éclater. — Mal de tête pressif, avec nausées, renvois et obscurcissement des yeux. — Déchirement crampoïde dans le front, jusque dans les yeux et le bout du nez. — **Mal de tête*, avec élancements, quelquefois au travers des yeux. — Secousses à travers la tête. — Mal de tête pulsatif dans le vertex, tous les matins. — Congestion et chaleur à la tête. — **Déchirement à l'extérieur du sinciput*, tous les jours, à une heure fixe.

YEUX. — Brûlement dans les yeux, surtout en lisant et en écrivant. *Lancinations au travers des yeux.* — **Inflammations des yeux et des paupières, avec photophobie.* — Gonflement des paupières. — **Ulcères à la cornée.* — Abscès à la glande lacrymale. — Affaïssissement fréquent des paupières, avec difficulté de les ouvrir. — Trouble de la vue, avec points noirs voltigeants, ou scintillement éblouissant devant les yeux. — **Impossibilité de lire des caractères fins*, comme par presbyopie. — **Duvet devant les yeux.* — Pupilles dilatées.

OREILLES. — Élancements dans les oreilles. — **Grande susceptibilité au bruit.* — Sensation de surdité, comme par obturation des oreilles. — **Dureté de l'ouïe.* — Tintement, musique, bourdonnement, bruissement et pulsation dans les oreilles.

NEZ. — Grande sensibilité du nez. — Desquamation du dos et du bout du nez. — Ulcération au fond des narines. — Obturation du nez, quelquefois avec sortie de morceaux de mucosités dures et fétides. — **Coryza tous les deux jours.* — **Coryza continuel*, et toux provoquée par un refroidissement et le plus léger courant d'air, se dissipant seulement après la transpiration. — Mucosités épaisses, vertes ou jaunes dans le nez.

VISAGE. — **Chaleur du visage.* — Bouffissure de la face. — Gonflement et rougeur des joues. — Rougeur et chaleur brûlante, ou grande pâleur du visage, avec yeux cernés. — Face alternativement pâle et rouge. — **Ephélides à la face.* — Éruption pruriente et humide au nez et à la bouche. — **Taches jaunes sur le front et la lèvre supérieure.* — Couleur jaunâtre de la face. — Gonflement des lèvres. — Éruptions, dartres et ulcères autour de la bouche et sur les lèvres. — Engorgement des glandes sous-maxillaires.

DENTS. — **Odontalgie*, avec douleur fouillante, térébrante, surtout

après et pendant le repas, et particulièrement après avoir mangé des choses sucrées ou des fruits. — Maux de dents pressifs, la nuit, avec gonflement de la lèvre inférieure et des gencives. — Grande sensibilité des dents inférieures.

BOUCHE ET GORGE. — Vésicules dans la bouche et ulcères lisses, avec brûlement. — Bégayement à cause de lourdeur de la langue. — Apreté, grattement et sécheresse de la gorge et du palais. — Accumulation de mucosités dans la gorge.

APPÉTIT. — **Amertume de la bouche.* — Goût acide de la bouche, avec langue chargée d'un enduit épais. — **Forte soif et malaise après avoir bu froid.* — **Faim* violente, dévorante, surtout le matin, par une sensation de défaillance et de vacuité. — Gourmandise. — Répugnance pour le lait et diarrhée après en avoir pris. — **Grande faiblesse de la digestion avec maussaderie et humeur hypochondriaque après le repas* ou le moindre écart de régime. — Après le repas, ballonnement, lourdeur et pression dans l'estomac et l'épigastre.

ESTOMAC. — Renvois fréquents pendant et après le repas. — Rapports douloureux. — **Sensation de fadeur à l'estomac et nausées continuelles.* — Hoquet fréquent, surtout après le repas. — Pyrosis et grattement dans la gorge, surtout après des aliments gras. — **Pression à l'estomac, surtout après le repas.* — **Sensibilité douloureuse de la région de l'estomac et de l'épigastre, au toucher et pendant que l'on parle.* — **Douleurs d'estomac, tractives, pressives et incisives.* — **Crampes d'estomac, contractives.* — Sensation de vacuité dans l'estomac, avec nausées. — Ballonnement de l'estomac et de l'épigastre.

VENTRE. — Douleurs dans les hypochondres. — **Lancinations dans l'hypochondre gauche, quelquefois après avoir bu froid.* — **Lancinations dans la région hépatique.* — Maux de ventre, le matin, après le réveil. — **Ventre gros, ballonné.* — Maux de ventre nocturnes, avec tension dans la partie supérieure du ventre et diarrhée. — Colique avec rétraction de l'ombilic, et dureté des téguments du ventre. — **Élancements et fouillements dans le ventre.* — **Élancements et tractions dans les côtés du ventre.* — Gonflement des glandes de l'aîne. — **Accumulation, incarceration et mouvements douloureux de flatuosités, dans le ventre.* — Expulsion abondante de vents d'odeur aigre ou fétide.

SELLES. — **Envie pressante d'aller à la selle, sans résultat, ou suivie d'une évacuation peu abondante et *insuffisante.* — Selle dure, difficile. — Selles molles ou liquides, avec envie forte et très-pressante et ténésme à l'anus. — Selles diarrhéiques, jaunes. — Diarrhée avec tranchées, après un refroidissement, ou après avoir pris du lait. — *Selles sanguinolentes.* — Sortie du ténia,

pendant la selle. — Pendant et après la selle, brûlement et douleurs incisives dans l'anus et le rectum. — Prurit et fourmillement à l'anus. — Lancinations au périnée.

URINES. — *Envie fréquente et pressante d'uriner*, jour et nuit, avec écoulement peu abondant ou immodéré. — Pissement au lit. — Urine d'un jaune vif, d'odeur acidulée, ou fétide et trouble, avec sédiment muqueux. — *Après et pendant l'émission des urines, brûlement dans l'urèthre. — Tressaillements, tiraillements aigus et cuisson dans l'urèthre. — Urine foncée.

PARTIES VIRILES. — Douleur de meurtrissure dans les testicules. — Pesanteur et traction pressive dans les testicules. — Excoriation au scrotum. — Sécrétion derrière le gland, comme une gonorrhée bâtarde. — Inflammation, gonflement et excoriation facile du gland et du prépuce. — *Exaltation de l'appétit vénérien*, presque comme *priapisme*, avec pollutions et érections continuelles et douloureuses. — Écoulement de liqueur prostatique, en urinant et pendant une selle difficile. — Après le coït, forte disposition à transpirer.

RÈGLES. — *Pression comme si tout se portait vers les parties génitales*, et allait sortir. — *Règles trop hâtives, avec maux de tête, de reins et de ventre. — *Métrorrhagies. — La conception paraît être favorisée par ce médicament. — *Difformité du col de la matrice. — Excoriation à la vulve, entre les cuisses. — *Après le coït, écoulement de mucosités par le vagin. — *Leucorrhée* abondante, épaisse et jaunâtre, *ou fétide, quelquefois précédée de tranchées.

LARYNX. — *Enrouement* et âpreté dans la poitrine, avec coryza, frisson fébrile et toux grattante et douloureuse. — *Catarrhe continu, avec coryza, et toux excitée par le moindre courant d'air ou le plus léger refroidissement, ne se dissipant que par la transpiration. — Toux provoquée par un chatouillement dans la gorge. — Toux violente et sèche, en passant du froid à la chaleur. — *Toux avec expectoration d'un goût salé ou d'un pus verdâtre et fétide. — Expectoration de petits morceaux, avec râle muqueux dans la poitrine. — Toux et expectoration de sang.

POITRINE. — *Haleine courte, quelquefois avec gêne de la respiration. *Dyspnée. — En respirant, tension sur la poitrine. — Pression à la poitrine. — *Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. — *Froid continu au côté gauche. — *Battement de cœur violent et anxieux, surtout en montant un escalier, ou la nuit, en étant couché sur le côté gauche.

TRONC. — *Douleur d'excoriation aux reins. — Lancinations aux reins, en étant assis. — Tractions et tension crampoïde dans le dos et la nuque. — Fourmillement dans le dos. — *Roideur de la

nuque. — Gonflement des glandes du cou. — *Gonflement dur de la glande thyroïde.*

BRAS. — *Pression sur les épaules. — Traction et *déchirement dans les épaules*, les bras et les coudes, *avec lassitude* dans ces parties. — Pesanteur, roideur et douleurs dans les bras, au point de ne pouvoir les lever. — Tressaillement et sensation de tressaillement dans les bras, les mains et les doigts, surtout en saisissant un objet. — Tension tractive dans les avant-bras et les mains. — Verrues aux bras. — °Douleurs incisives dans les mains. — Déchirement et térébration dans les os du métacarpe, surtout le soir et le matin, au lit. — Brûlement dans les articulations de la main, le soir. — Tremblement des mains. — Peau des mains sèche, râpeuse et gercée. — *Verrues sur le dos de la main.* — Taches rouges et *dartres sur les mains.* — Tressaillements dans les articulations des doigts. — Distorsion des doigts. — Prurit brûlant et *vésicules brûlantes sur les doigts*, comme par des orties.

JAMBES. — Grande *pesanteur des jambes et des pieds*, avec roideur en étant assis et en marchant. — Tressaillement dans les cuisses. — Éruption dartreuse aux fesses. — *Raccourcissement des tendons du jarret.* — °Dartres au jarret. — Traction pressive et crampoïde dans les jambes. — *Crampe et traction dans les mollets, comme s'ils étaient trop courts. — Jambes enflées, rouges, enflammées et couvertes d'ulcères. — °Douleurs incisives et *crampes dans les pieds. — Brûlement dans les articulations du pied, le soir. — *Gonflement des pieds ou de la plante des pieds, avec élancements en appuyant le pied. — Disposition à se luxer et se fouler l'articulation du pied. — *Pieds froids.* — **Ulcères chroniques au talon*, provenant de vésicules rongeantes. — Crevasses et excoriation entre les orteils. — Gonflement des orteils, avec déchirement et douleur d'excoriation qui ne permet pas de dormir. — Ampoules au bout des orteils, comme par une brûlure. — Térébration, traction et élancements dans les cors aux pieds.

152. — NATRUM MURIATICUM.


NATR-M. — Muriate de soude. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 12, 30. — *Durée d'action* : 40 à 50 jours dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Ars. camph. nitr-spir. — *On l'emploie comme antidote de* : Chin.

COMPARER AVEC : Arn. ars. carb-a. carb-veg. caus. chin. ign. kal.lyc. merc. natr. n-vom. plumb. puls. sabad. sep. spig. staph. sulf. C'est surtout après merc. que natr-m. fera du bien lorsqu'il se trouvera indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes,

on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales avec raccourcissement des tendons; Paralyse des membres; Affections scorofuleuses; Glandes engorgées; Suites fâcheuses de contrariétés et de colère; Faiblesse par perte d'humeurs et autres causes débilitantes, même par suite d'onanisme; Faiblesse et syncope hystériques; Verrues; Varices; *Fièvres intermittentes*, même celles qui ont été dénaturées par de fortes doses de quinquina; Fièvre typhoïde; *Mélancolie et hypochondrie*; Souffrances par excès d'étude; *Migraine*; Chute des cheveux, par suite de fortes maladies aiguës, ainsi que chez les femmes en couche; *Ophthalmies chroniques*, et blépharophthalmies, surtout chez les individus scorofuleux; *Amblyopie amaurotique*; Presbyopie; Otite avec écoulement purulent; *Coryza*; Croûte de lait?; Affection scorbutique des gencives; Stomacace?; *Dyspepsie*, gastralgie et autres *affections gastriques*; Hépatite chronique?; Coliques venteuses; *Constipation chronique*; Relâchement chronique du ventre; Diabète?; Gonorrhée chronique?; *Priapisme*?; *Impuissance*; Disménorrhée; Aménorrhée; Dyménie des jeunes filles; *Stérilité avec règles trop hâtives et trop abondantes*?; Flueurs blanches; Catarrhe; Souffrances phthisiques; Maladies du cœur?; *Gaître*; Panaris; Suppression de la sueur des pieds, etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Traction pressive dans les membres.

— Roideur de toutes les articulations qui craquent quand on les remue. — *Raccourcissement des tendons*. — *Tressaillement dans les muscles et les membres*. — *Disposition aux luxations et à se donner un tour de reins. — **Paralysies*. — Gonflement des glandes. — *Accès de malaise surtout le matin ou le soir, avec nausées*, faiblesse, pâleur mortelle du visage, *mal à la tête*, engourdissement des membres, *besoin de se coucher*, etc. — **Suites fâcheuses d'une contrariété*. — Les symptômes se manifestent, se renouvellent ou s'aggravent généralement en étant couché, et surtout la nuit, ou le matin; ils sont soulagés en se redressant dans la lit. — Les douleurs nocturnes suspendent la respiration et occasionnent une sorte de paralysie semi-latérale. — Ébullition de sang, générale, avec pulsation dans tout le corps au plus léger mouvement. — Congestion à la tête, à la poitrine et à l'estomac, avec froid aux jambes. — **Malaise et incommodités après avoir beaucoup parlé*. — *Grand relâchement de toutes les forces physiques et morales*, après une fatigue corporelle. — **Pesanteur et paresse*, surtout le matin après s'être levé, avec répugnance

pour le mouvement et la marche. — **Brisement et lassitude excessive dans les membres, surtout le matin et en étant assis.* — **Faiblesse hystérique.* — *Grande faiblesse.* — *Abattement et agilité alternativement dans les membres.* — *Grand amaigrissement.* — **Disposition à se refroidir.* — **Inquiétudes dans le corps avec frissonnement.*

PEAU. — *Éruption miliaire avec douleur lancinante.* — *Tubérosités pruriantes.* — *Éruption urticaire après un exercice violent.* — *Dartres.* — *Furoncles.* — *Verrues.* — *Panaris.* — **Varices.* — **Cors.*

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir le jour.* — **Sommeil tardif et insomnie nocturne, avec efforts inutiles pour s'endormir.* — **Difficulté à se rendormir la nuit, lorsqu'on s'est éveillé.* — *Difficulté à se réveiller et grande lassitude somnolente, le matin, de bonne heure.* — **Sommeil agité, plein de rêves vifs et lascifs, avec érections prolongées et pollutions.* — **Rêves anxieux, pénibles, avec pleurs et paroles pendant le sommeil.* — *Rêves effrayants de querelles, de meurtres, d'incendie, de voleurs, etc.* — *Rêves qui occupent encore l'esprit après le réveil, et que l'on croit être des réalités.* — *Bouillonnement de sang la nuit, avec chaleur anxieuse et battements de cœur.* — *Cauchemar.* — *Somnambulisme.* — **La nuit, douleurs dans le dos, tremblement comme dans les nerfs, émission d'urine fréquente, mal à la tête, coliques, souffrances asthmatiques, grande angoisse dans le corps, etc.*

FIÈVRE. — **Frissons intérieurs, fréquents.* — **Frisson continu et manque de chaleur vitale.* — **Frisson avec et sans soif.* — *Frisson et horripilation avec envie de dormir, suivie d'une légère transpiration.* — *Chaleur et frissons alternatifs, avec maux de tête.* — **Chaleur avec soif ardente.* — **Accablement avant la fièvre.* — **Avant le frisson, maux de tête; pendant le frisson, haleine courte, bâillements et envie de dormir.* — **Pendant la chaleur, maux de tête violents, étourdissement, obscurcissement des yeux, vertiges et rougeur de la face.* — **Fièvres avec douleurs ostéocopes, douleurs dans le dos, teint jaunâtre, mal à la tête, faiblesse, amertume de la bouche, commissure des lèvres ulcérée, absence d'appétit, pression au creux de l'estomac, avec grande sensibilité de cette partie au toucher, etc.; type quotidien, ou tierce; début de la fièvre, généralement le matin, par des frissons suivis de chaleur et de soif.* — **Fièvre typhoïde avec faiblesse, sécheresse de la langue et forte soif.* — *Pouls irrégulier et souvent intermittent.* — **Sueur matutinale.* — **Sueur abondante, trop facilement excitée par le mouvement et la marche.*

MORAL. — **Tristesse mélancolique qui fait rechercher toutes les choses désagréables, et pleurer abondamment; les consolations*

ne font qu'aggraver cet état. — *Inquiétude sur l'avenir. — *Angoisse, quelquefois pendant l'orage, mais surtout la nuit. — *Indifférence*, laconisme, morosité et *inaptitude au travail*. — *Précipitation impatiente, et *irritabilité*. — *Disposition à s'effrayer. — Haine pour des personnes dont on a reçu anciennement des offenses. — **Irascibilité et violent emportement, facilement provoqués*. — Envie de rire. — Mauvaise humeur et gaieté alternative. — **Faiblesse de mémoire*, et oublis excessifs. — Irréflexion et distraction. — On se trompe en parlant et en écrivant. — *Incapacité de réfléchir*, et fatigue par le travail intellectuel. — Maladresse.

TÊTE. — **Embarras douloureux dans la tête*. — *Vertige pendant lequel tout semble tourner devant les yeux, et où l'on risque de tomber en avant, surtout en marchant et en se levant du lit. — *Vertige avec secousses dans la tête et étourdissement*. — **Maux de tête le matin* en se réveillant, en se retournant, et pendant le mouvement du corps ou de la tête, en courant, ou à l'air froid, ou après une contrariété. — **Pesanteur de la tête*, tous les jours, surtout à l'occiput, et forçant à fermer les yeux. — **Mal de tête comme si la tête allait éclater*, ou comme si elle était tendue et comprimée, surtout en écrivant. — *Accès de maux de tête avec nausées et vomissements*. — *Pression et compression dans la tête et surtout dans les tempes et au-dessus des yeux, aggravées en fronçant les sourcils. — **Tiraillements aigus et élancements dans la tête*, surtout au-dessus des yeux, avec besoin de se coucher et obscurcissement de la vue. — *Secousses lancinantes à travers la tête*. — **Battement, pulsations et martellement dans la tête*, surtout pendant le mouvement. — **Battement et tractions dans le front*. — Sensation comme si le cerveau vacillait en remuant la tête. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu, comme s'il était excorié. — Contraction et mobilité du cuir chevelu. — Facilité à se refroidir la tête. — Sueur à la tête, surtout le matin et la nuit. — **Croûtes sur le cuir chevelu*. — **Chute abondante des cheveux*, même des poils de la barbe.

YEUX. — Prurit dans les yeux. — *Élancements, cuisson et brûlement dans les yeux*. — *Inflammation des yeux*. — **Larmes corrosives*. — **Larmolement fréquent*. — °Chassie dans l'angle externe des yeux. — **Agglutination nocturne des yeux*. — *Paupières continuellement rouges et ulcérées*. — **Occlusion spasmodique des paupières*, surtout le matin, le soir (pendant le crépuscule) et la nuit. — Obscurcissement de la vue en se baissant et en marchant, ainsi qu'en lisant et en écrivant. — Vue trouble comme par du duvet ou à travers un voile. — **Confusion des caractères en lisant*. — °Diplopie. — Hémiopie. — **Presbyopie*. — *Vue faible*,

comme par une amaurose commençante. — * Points noirs , traces lumineuses et étincelles devant les yeux. — Myopie.

OREILLES. — *Élancements dans les oreilles. — °Pulsations et battements dans les oreilles. — Gonflement et chaleur des oreilles. — *Écoulement (de pus) par les oreilles. — *Dureté de l'ouïe. — *Tintement, sonneries, grondement et bourdonnement dans les oreilles.

NEZ. — Engourdissement et insensibilité d'un seul côté du nez. — Inflammation et gonflement du nez, d'un seul côté, avec douleurs au toucher. — Térébration dans les os du nez. — Excoriation de l'intérieur du nez. — Croûtes sur le nez. — *Perte de l'odorat. — *Éternuments avortés. — *Obturation et sécheresse du nez. — *Coryza sec, quelquefois le matin seulement. — *Violent coryza, fluent ou sec, avec perte de l'odorat et du goût, et éternument.

VISAGE. — *Face jaunâtre*, terreuse. — Visage luisant comme de la graisse. — Gonflement de la face. — *Prurit et éruption de boutons à la face et au front. — *Douleurs dans les pommettes, pendant la mastication, comme par ulcération. — *Lèvres sèches, gercées, crevassées* ou excoriées et ulcérées, avec croûtes et éruptions brûlantes et cuisantes. — *Éruption dartreuse autour de la bouche. — *Gonflement des lèvres. — °Vésicules sanguinolentes à la face interne de la lèvre supérieure, avec douleur brûlante au toucher. — Éruption granulée et ulcères au menton. — Gonflement fréquent des glandes sous-maxillaires.

DENTS. — *Dents très-sensibles à l'air* et au contact. — *Traction*, comme un arrachement, dans les dents, s'étendant jusque dans l'oreille et la gorge après le repas et la nuit, avec gonflement de la joue. — Élancements, térébration et pulsation dans les dents cariées. — Vacillement et carie des dents. — *Fistules aux gencives. — Gencives gonflées, saignant facilement et très-sensibles aux choses froides ou chaudes. — Inflammation putride des gencives. — Ulcères aux gencives.

BOUCHE. — Ulcères et vésicules sur la langue et dans la bouche, avec cuisson brûlante et douleur au contact des aliments et des boissons. — Crachement de sang. — Parole embarrassée à cause de la pesanteur de la langue. — Torpeur et roideur d'une moitié de la langue. — Sensation prolongée, comme s'il y avait un cheveu sur la langue. — °Salivation abondante.

GORGE. — *Pendant la déglutition, sensation comme s'il y avait une cheville dans la gorge. — Spasme dans la gorge. — Inflammation de la gorge, avec douleur lancinante et ulcération. — *Exspuition de mucosités en renâclant, surtout le matin.

APPÉTIT. — Perte du goût. — *Amertume dans la bouche. — Goût putride ou acide, comme si l'on était à jeun. — Goût putride de

l'eau. — Arrière-goût des aliments, surtout des acides. — **Soif continuelle*, souvent avec nausées, ballonnement du ventre, et autres incommodités après avoir bu. — **Perte de l'appétit* surtout pour le pain, et répugnance pour la fumée du tabac. — **Dégout* pour les aliments, surtout lorsqu'ils sont gras. — Souffrances par les aliments acides et le pain. — **Appétit immodéré*, l'après-midi et le soir. — **Boulimie*, sans appétit, avec plénitude et satiété pour peu que l'on ait mangé. — *°Appétence* pour les acides. — *°Pendant le repas, sueur à la face.* — *°Après le repas, renvois à vide, nausées*, plénitude et ballonnement du ventre et de l'estomac, sommeil, tête embarrassée, aigreurs dans la bouche, **pyrosis*, battements de cœur et pouls intermittent ou accéléré. — *°Après des aliments gras ou du laitage, renvois désagréables.*

ESTOMAC. — Renvois avec goût des aliments. — *Renvois acides et acres*, quelquefois avec goût des aliments. — **Pyrosis* qui remonte de l'estomac. — *Nausées*, surtout le matin. — **Ecoulement d'eau comme des pituites*, avec tournoiement dans l'estomac, suivi quelquefois de vomissement aigre des aliments. — *°Vomissement des aliments* et de bile. — **Pression à l'estomac*, le matin ou dans la journée, *nausées* et chute subite des forces. — **Pression à l'épigastre*, comme s'il y avait un corps dur dans l'estomac. — *Epigastre gonflé et douloureux au toucher et à la pression*, comme s'il était ulcéré. — **Crampes d'estomac* contractives, quelquefois avec nausées. — *°Secousses et griffement au creux de l'estomac.* — Taches rouges au creux de l'estomac.

VENTRE. — **Traction, tension, pression, pincement et élancements dans la région hépatique.* — **Douleur et élancements dans la région splénique.* — *°Crampe dans le diaphragme en se baissant.* — **Ballonnement du ventre.* — **Gonflement du ventre.* — Malaise tensif, pressif et hypochondriaque dans le bas-ventre. — **Douleurs pressives dans le ventre.* — Douleurs abdominales, tractives et contractives, comme les douleurs d'enfantement. — **Tranchées quotidiennes et pincement dans le ventre*, quelquefois le matin et la nuit. — Roideur dans le côté gauche du ventre. — **Incarcération de flatuosités*, quelquefois la nuit. — **Gargouillement bruyant et borborygmes dans le ventre.* — Sortie des hernies.

SELLES. — **Constipation*, quelquefois prolongée, ou tous les deux jours. — *Envie fréquente et pressante d'aller à la selle, sans aucun résultat*, ou avec évacuation peu abondante. — Selle dure et interrompue. — *Évacuation difficile des selles*, souvent avec déchirement et élancements dans le rectum et l'anus. — **Selles par trop fréquentes.* — **Relâchement prolongé du ventre.* — *°Diarrhée avec coliques et évacuation de matières muqueuses.* — *Selles involontaires.* — Écoulement de sang pendant les selles. — **Pen-*

*dant et après les selles, brûlement à l'anus et au rectum. — Élan-
cements, excoriation et pulsation au rectum. — Constriction cram-
poïde de l'anus, et sensation de rétrécissement du rectum. —
Chute du rectum et douleur brûlante à l'anus, avec écoulement
de matières sanguinolentes et sanieuses. — * Boutons hémorroï-
daux à l'anus, douloureux et lancinants. — Excoriation à l'anus
et entre les fesses, et surtout en marchant. — Dartres à l'anus. —
Lombrics.*

URINES. — *Envie fréquente et pressante d'uriner le jour et la nuit,
quelquefois toutes les heures, avec écoulement abondant. — * Émis-
sion involontaire des urines, quelquefois en toussant, en mar-
chant ou en éternuant. — * Émission d'urine, la nuit. — Urine
claire, avec sédiment rouge, briqueté. — * Après l'émission des
urines, écoulement de mucus par l'urèthre. — Écoulement de
mucosités, quelquefois jaunâtres, par l'urèthre comme dans la
gonorrhée.*

PARTIES VIRILES. — *Prurit, dartres et excoriation entre le scrotum
et les cuisses. — Sécrétion derrière le gland, comme une gonor-
rhée bâtarde. — * Excitation immodérée des parties génitales et de
l'imagination pour le coït, ou engourdissement de l'appétit véné-
rien. — Manque d'énergie pendant le coït. — * Impuissance. — Après
le coït, pollutions. — Odeur forte et fétide des parties génitales.*

RÈGLES. — *Pression et sensation comme si tout affluait vers les
parties génitales. — * Règles trop hâtives et trop abondantes ou tar-
dives et rares. — * Règles de trop longue durée. — * Suppression des
règles. — * Maux de tête avant, pendant et après les règles. —
* Avant les règles, morosité et irritabilité. — * Au début des règles,
tristesse. — * Pendant les règles, crampes abdominales. — * Prurit
aux parties génitales. — * Répugnance pour le coït, chez la femme.
— * Flueurs blanches, avec mal à la tête, disposition à la diar-
rhée, coliques et selles muqueuses. — * Leucorrhée âcre, avec
couleur jaune de la face. — Écoulement abondant de mucosités
transparentes, blanchâtres et épaisses, par le vagin. — Élan-
cements dans les seins.*

LARYNX. — ** Enrouement et sensation de sécheresse dans le larynx.
— Accumulation de mucosités dans le larynx, le matin. — * Poi-
trine embarrassée, avec catarrhe et toux. — * Toux provoquée par
un chatouillement dans la gorge ou dans l'épigastre, le jour et la
nuit, surtout en marchant ou en respirant profondément. — * Toux
matutinale. — * Toux suffocante, spasmodique, le soir, au lit. —
* Toux courte, chronique, avec expectoration de mucosités et gon-
flement dans la poitrine. — Toux avec expectoration sanguino-
lente, vomiturition et vomissement. — * En toussant, douleurs dans
la tête, comme si le front allait se briser.*

POITRINE. — **Haleine courte, surtout en marchant vite. — *Respiration gênée, surtout pendant un travail manuel, soulagée au grand air. — *Respiration sibilante, le soir, au lit. — Haleine fétide. — *Douleur de poitrine, comme par une tension intérieure. — *Élancements dans la poitrine et dans les côtés de la poitrine, avec gêne de la respiration, quelquefois en respirant profondément et en toussant. — *Battements de cœur anxieux et violents à chaque mouvement du corps, mais principalement en étant couché sur le côté gauche. — Tressaillement et douleur lancinante dans la région du cœur. — Battement du cœur irrégulier et intermittent. — Mouvement tressaillant du cœur.*

TRONC. — **Douleur de brisement et de paralysie aux reins, surtout le matin. — Élançements, douleurs incisives et fortes pulsations aux reins. — *Déchirement à travers les reins et les hanches. — *Douleurs nocturnes dans le dos. — *Lassitude, tension pressive et tiraillement dans le dos. — *Pression, roideur et tension dans la nuque. — °Goltre volumineux. — °Croûtes sous l'aisselle. — Engorgement des glandes axillaires.*

BRAS. — *Douleur de luxation dans les articulations de l'épaule et des doigts. — *Lassitude et pesanteur paralytique des bras. — Douleur de brisement dans les bras et les mains, mais surtout dans les épaules, qui ne permet ni de lever ni de remuer les bras. — °Fouillement dans les bras. — Secousses dans le coude. — *Lancinations dans les muscles et les articulations des mains et des doigts. — Taches brunâtres sur le dos de la main. — Verrues dans les paumes des mains. — Peau des mains sèche et gercée, surtout autour des ongles. — Mains froides. — Sueur aux mains. — Difficulté à fléchir les articulations des doigts. — *Engourdissement et fourmillement dans les doigts. — Envies fréquentes aux ongles. — Panaris.*

JAMBES. — **Douleurs de luxation dans les hanches, avec élancements. — *Douleurs tractives dans les cuisses, les genoux et les jambes. — Inquiétudes et tressaillement dans les jambes. — *Faiblesse paralytique des jambes, et surtout de l'articulation du pied. — Tressaillement des muscles des cuisses. — °Raccourcissement douloureux des tendons du jarret. — Douleur de luxation dans les articulations du genou et du pied. — *Lassitude dans les genoux et les mollets. — *Dartres dans les jarrets. — Tension dans les jambes et les mollets. — *Grande pesanteur des jambes et des pieds. — °Brûlement dans les pieds. — °Gonflement des pieds. — Froid aux pieds. — °Douleur d'ulcération aux mal-léoles, en appuyant le pied et en y touchant. — °Suppression de la transpiration des pieds. — Rougeur du gros orteil, avec tiraillements aigus et élancements en marchant et en se tenant long-*

temps debout. — Dartres aux malléoles. — *Cors aux pieds, avec douleurs lancinantes et térébrantes.*

153.—NATRUM NITRICUM.

NATR-N. — Nitrate de soude. — ARCHIVES DE STAFF. — Médicament encore très-peu connu.

SYMPTOMES. — Douleurs pressives de brisement dans les articulations. — Tête embarrassée, comme après avoir trop médité. — Douleurs dans le tympan, avec étreinte dans les oreilles. — Goût métallique sur les lèvres et la langue. — *Goût acide.* — Répugnance pour le café. — Renvois aigres. — Muscles abdominaux douloureux et rétractés vers le dos. — Souffrances *par des flatuosités, avec douleurs pressives*, surtout dans l'épigastre et à la poitrine, aggravées par le mouvement, et soulagées par des renvois ou par l'expulsion de flatuosités. — Selle d'un moule volumineux, lentes et difficiles à évacuer.

154.—NATRUM SULFURICUM.

NATR-S. — Sulfate de soude. — HARTLAUB ET TRINKS. — Médicament qui, malgré le nombre de ses symptômes, n'a encore été employé en homéopathie que contre des *Fèvres intermittentes*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement et élancement, ou tressaillement, ou *déchirements tressaillants dans les membres et autres parties*, surtout le soir et la nuit. — *Sensibilité douloureuse des membres qui sont comme brisés*, ou comme après une fatigue. — Tremblement dans le corps, avec mouvements spasmodiques des muscles, et accompagné d'appréhension anxieuse. — La plupart des symptômes se manifestent pendant le repos; le mouvement les soulage. — Au grand air, on se trouve mieux. — Prurit et boutons pruriants, qui brûlent après s'être gratté.

SOMMEIL. — Forte envie de dormir le jour, surtout avant midi; on s'endort, en lisant et en écrivant. — Insomnie causée par une grande agitation. — Sommeil agité, avec *rêves anxieux* et pénibles. — Tressaillement des membres, pendant le sommeil. — *Rêves dans lesquels il semble que l'on vole.*

FIÈVRE. — *Frissons avec froid*, surtout le soir ou la nuit, quelquefois avec angoisse, grelottement, et claquement des dents, généralement sans soif. — Froid intérieur avec pandiculation et bâillement. — Le matin, après avoir marché, frisson grelottant et froid avec chaleur dans la tête, et couleur jaune du visage. — Pendant l'accès de frisson, chaleur au front et aux mains. — Chaleur sèche, générale, l'après-midi. — Sueur nocturne abondante.

MORAL. — Mélancolie et pleurs, surtout après avoir entendu de la musique. — *Mauvaise humeur avec éloignement pour la conversation*, et laconisme. — Humeur querelleuse avec air sombre.

TÊTE. — Vertige, le soir, avec vomissement de mucosités aigres. — Vertige tournoyant après le dîner, avec bourdonnement dans la tête. — Maux de tête en lisant, avec chaleur et transpiration. — Pression et compression dans l'occiput et les deux côtés de la tête, même la nuit. — Douleur au vertex, comme si la tête allait se briser. — Douleurs déchirantes et griffement dans le front, quelquefois immédiatement après le dîner, avec forte envie de dormir. — *Douleurs térébrantes dans la tête*. — *Secousses douloureuses dans la tête*, comme par des étincelles électriques. — Élançements dans les côtés de la tête en se fatiguant les bras. — Maux de tête violents et pulsatifs, surtout dans les tempes. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu en se peignant. — Déchirement à l'extérieur du vertex, la nuit, avec frisson grelottant et claquement des dents.

YEUX. — Pesanteur des paupières, comme s'il y avait du plomb dessus. — *Pression dans les yeux*, surtout le soir, en lisant aux lumières. — Douleur déchirante autour de l'œil. — *Brûlement dans les yeux*, quelquefois le soir et le matin, avec grande sécheresse ou larmolement abondant. — Agglutination nocturne des paupières. — Trouble de la vue. — Après s'être mouché, étincelles devant la vue. — *Photophobie*, surtout le matin, en se réveillant.

OREILLES ET NEZ. — Otalgie, comme si le tympan était poussé vers le dehors. — *Lancinations dans les oreilles*. — Tintement dans les oreilles. — Coryza avec obturation du nez, qui ne permet presque pas de respirer.

VISAGE. — Teint pâle, maladif, comme après une débauche nocturne, avec air sombre. — *Déchirement dans la face*, et surtout dans les pommettes. — Lèvres sèches, brûlantes et qui s'exfolient. — Vésicules enflammées et brûlantes, sur la lèvre supérieure. — Roideur douloureuse dans l'articulation de la mâchoire, qui ne permet pas d'ouvrir la bouche.

DENTS. — Douleurs tractives dans les dents avec vacillement et sensation comme si elles étaient plus longues, soulagées à l'air froid

et en fumant du tabac. — *Maux de dents, la nuit, pulsatifs, battants*, avec grande agitation. — Déchirement dans les dents cariées, la nuit, quand on est levé. — Brûlement dans les gencives. — Gonflement mobile et indolore aux gencives. — Vésicules purulentes aux gencives.

BOUCHE. — *Sécheresse de la bouche*, avec soif, surtout le matin. — Brûlement dans la bouche, à la langue et au palais. — Vésicules brûlantes sur la langue. — Accumulation d'eau acide dans la bouche.

GORGE. — *Mal de gorge avec déglutition douloureuse et empêchée*, et gonflement inflammatoire de la luette et des amygdales. — Constriction et sécheresse dans la gorge.

APPÉTIT. — Goût muqueux. — *Soif ardente*, pour les boissons froides, *surtout le soir*. — Absence d'appétit et répugnance pour les aliments. — Pendant le repas, embarras de la tête et obscurcissement des yeux. — Après le repas, sueur au visage, oppression de poitrine, et accumulation d'eau dans la bouche, avec envie de vomir.

ESTOMAC. — Régurgitation acide. — Hoquet fréquent. — Nausées, avec lancination dans les yeux. — Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, le soir. — Vomissement d'une eau salée, acidulée, ou de mucosités acides, suivi d'un grand accablement et de douleurs brûlantes dans la tête. — Plénitude d'estomac, remontant jusqu'à la poitrine, avec gêne de la respiration, le soir, au lit. — Douleurs térébrantes dans l'estomac.

VENTRE. — Sensibilité douloureuse de la région hépatique au toucher et pendant la marche. — Battement, tension et *élançements dans la région hépatique*. — Élançements dans l'hypochondre gauche. — *Douleurs de meurtrissure dans le ventre*, la nuit, avec maux de reins; les douleurs réveillent et ne sont supportables qu'en étant couché sur le côté. — Brûlement passager parcourant différentes parties du ventre, le soir. — Ballonnement, brûlement et *élançement dans les aines*. — Accumulation douloureuse de flatuosités. — *Coliques flatulentes, avec pincement*. — Gargouillement, borborrygmes et mouvements dans le ventre. — Expulsion fréquente de vents fétides.

SELLES. — Selles dures et noueuses, souvent mêlées de sang et de mucosités. — *Selles fréquentes, molles et diarrhéiques*.

URINES. — *Émission fréquente d'urines*, avec sédiment jaune ou couleur de brique. — Après et pendant l'émission des urines, brûlement dans l'urèthre.

PARTIES GÉNITALES. — *Prurit violent aux parties génitales*. — Sueur au scrotum, le soir. — Exaltation de l'appétit vénérien. — *Règles en retard*, avec colique et rétention ou dureté des selles.

— Pendant les règles, maux de tête et épistaxis. — Sang des règles, âcre et corrosif, ou coagulé, ne coulant que le matin. — Leucorrhée.

LARYNX. — *Toux sèche, provoquée par un chatouillement*, avec âpreté de la trachée-artère, et sensation d'excoriation dans la poitrine, plus violente la nuit, et soulagée en se redressant dans le lit. — Toux avec expectoration, haleine courte et élancements dans le côté gauche de la poitrine.

POITRINE. — Haleine courte, surtout en marchant. — Oppression de poitrine. — *Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine*, douloureux, surtout en toussant.

TRONC. — *Douleur de brisement aux reins*, ou douleur d'ulcération, surtout la nuit. — Lancinations aux reins, en étant assis. — Déchirement et rongement, le long de l'épine dorsale. — *Élancements incisifs*, entre les omoplates. — Déchirements saccadés et tension dans les muscles du côté gauche du cou. — Lancinations dans les aisselles.

BRAS. — *Déchirements dans les os et les muscles des bras et des avant-bras*. — Pesanteur des bras. — Sensation de plénitude et de roideur dans les mains. — Déchirement et *élancements dans les mains et les doigts*. — Tremblement et faiblesse des mains, au point de ne pouvoir tenir rien de pesant. — Brûlement et rougeur sur le dos de la main, comme par des orties. — Douleur lancinante d'ulcération, sous les ongles.

JAMBES. — *Douleurs vives dans les hanches*, en se baissant, et pendant le mouvement, surtout en se levant de son siège, et la nuit, au lit. — Chaleur et brûlement dans les jambes, le soir et le matin. — Déchirement et *traction dans les jambes*, et surtout dans le tendon d'Achille et le mollet. — Grande lassitude et inquiétude dans les pieds. — *Élancements*, déchirement et douleur d'ulcération dans les pieds. — Fort prurit aux orteils, et entre les orteils, surtout le soir, en se déchaussant.

185. — NICCOLUM CARBONICUM.

NICC. — Nickel. — HARTLAUB ET TRINKS. — Médicament encore peu connu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement et *élancements dans les membres* et autres parties. — Exacerbation des symptômes, le soir et la nuit. — On se trouve mieux à l'air frais. — Dartres pruriantes. — Réveil fréquent, la nuit, par agitation. — *Prédo-*

minance du froid. — Chaleur avec soif ardente, surtout le soir et la nuit. — Morosité anxieuse et inquiétude. — Tremblement et frayer, avec désir de la solitude. — Éloignement pour la conversation. — *Disposition excessive à contredire.* — Méchanceté, avec emportement et humeur querelleuse.

TÊTE. — Vertige, avec étourdissement et chancellement, comme par faiblesse, principalement le matin, en se levant. — *Pesanteur et plénitude* douloureuse dans la tête, et principalement dans le front, avec vertige. — Douleur des deux côtés de la tête, comme si elle allait se briser. — Déchirements et élancements dans la tête. — Maux de tête, principalement dans l'appartement et après une promenade au grand air.

YEUX. — *Brûlement fréquent dans les yeux*, surtout vers le soir. — *Tressaillement douloureux dans le globe des yeux*, avec sensation comme s'ils allaient être violemment convulsés. — *Grande faiblesse des yeux*, surtout le soir ; dès qu'on les fatigue, la vue se perd. — Les objets éloignés paraissent être plus grands.

OREILLES ET NEZ. — Élancements dans les oreilles. — Surdit   surbite, avec bourdonnement dans les oreilles, le soir. — Éternument fréquent. — Obturation du nez. — Rougeur et gonflement des parties antérieures du nez, accompagnés de brûlement et de déchirement dans les narines. — Éruption au nez.

FACE. — Sensation de pesanteur à la face, comme si elle était gonflée. — Sensibilité douloureuse et crampe dans l'articulation maxillaire, qui ne permet d'ouvrir la bouche qu'avec difficulté. — Dartres pruriantes aux joues. — Éruptions aux lèvres.

DENTS. — Gonflement des gencives. — Odontalgie rongearite, le soir. — Odontalgie, avec déchirement dans les oreilles. — *En les suçar, il sort des dents molaires une eau acide et f  tide.*

BOUCHE. — Accumulation abondante de salive douce  tre dans la bouche. — Odeur f  tide de la bouche, dont on ne s'aper  oit pas soi-m  me.

GORGE. — Douleur dans la gorge, surtout en parlant et en b  illant, le soir. — Douleur lancinante dans la gorge, pendant la d  glutition. — Inflammation dans la gorge, avec gonflement des amygdales du c  t   droit, ainsi que de la face et du cou, qui est douloureux au toucher. —   tranglement spasmodique, et contraction dans la gorge.

ESTOMAC ET VENTRE. — Go  t farineux dans la bouche, le matin, en se r  veillant. — Renvois, avec go  t de farine roussie. — Absence d'app  tit. — *Soif, le soir.* — *Hoquet violent*, principalement le soir. — *Sensation de vacuit  * dans l'estomac. — Tranch  es dans l'  pigastre et les hypochondres. — Tranch  es, avec diarrh  e.

SELLES. — RÈGLES. — Selle dure, tenace, lente. — *Constipation.* — Diarrhées, précédées de tranchées, ou avec ténésme et brûlement à l'anus. — Augmentation de la sécrétion des urines, même la nuit. — Urines brûlantes. — Règles trop hâtives, mais trop peu abondantes et de trop courte durée. — Leucorrhée.

POITRINE ET MEMBRES. — *Élancements dans la poitrine*, surtout en riant. — Douleur d'excoriation dans la poitrine. — Craquement et douleur de luxation dans la nuque, en se redressant après avoir été courbé. — Dartres pruriantes aux hanches. — Crampes dans les orteils.


136. — NITRUM.

NITR. — Nitrate de potasse. — **HANNEMANN.** — *Doses usitées* : 24, 30. — *Durée d'action* : jusqu'à 7 semaines dans des affections chroniques.

ANTIPOTES : Nitr-spir. — Le camphre augmente les effets du nitr.

COMPARER AVEC : Amm. arn. calc. dros. natr.-m. nitr.-ac. nitr-spir.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — *Inflammations internes* ; *Gastrite* ? ; *Gastralgies* ; *Coliques ventueuses* ; *Diarrhées colicatives* ; *Phthisie laryngée* ? ; *Pneumonie chronique* ; *Souffrances phthisiques*, etc., etc.

 *Voy. la nota, page 17.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs déchirantes, lancinantes et tractives.* — Traction dans les membres, avec faiblesse paralytique. — *Déchirement dans les membres*, le jour et la nuit, ne s'apaisant par la friction que pour peu de temps. — La plupart des symptômes se manifestent le soir, après minuit et après midi. — Les symptômes qui se sont manifestés le jour, se dissipent le soir, lorsqu'on est couché. — Gonflement rapide de tout le corps. — Grand accablement, le matin, avec sensation de chaleur à la face et front brûlant. — *Lassitude plus grande en étant assis que pendant le mouvement.*

PEAU. — Lancinations à la peau, comme par des aiguilles, suivies de brûlement, principalement à la face. — Nodosités de la grosseur d'un pois, même à la face. — *Vésicules brûlantes*, remplies d'une sérosité jaunâtre, qui crèvent lorsqu'on gratte, et cessent alors de brûler.

SOMMEIL. — *Envie de dormir, le jour.* — Sommeil de nuit agité; on ne fait que sommeiller, avec réveil fréquent. — Sommeil comateux. — Rêves anxieux, agités, de choses périlleuses. — *Cauchemar.*

FIÈVRE. — Frisson le soir, avec douleurs. — *Froid après midi,* avec soif; ou froid précédé de mal à la tête, avec adipsie et *suivi de chaleur nocturne,* sans soif ni sueur. — °Fièvre quotidienne, avec douleurs tractives dans les jambes. — *Sueurs abondantes et colligatives.* — Sueur matutinale, surtout à la poitrine.

MORAL. — Anxiété et agitation. — Découragement et peur de la mort.

TÊTE. — *Maux de tête, après avoir mangé du veau.* — Maux de tête, avec contraction des paupières, d'un soir à l'autre, insupportables en baissant la tête. — Maux de tête alternant avec déchirement crampoïde dans les articulations des doigts. — *Pesanteur étourdissante de la tête,* le matin, comme à la suite d'une ivresse. — *Douleurs pressives dans la tête,* aggravées par le café et soulagées par le mouvement de la voiture. — *Compression à l'occiput,* avec roideur de ces parties. — Contraction dans la tête, qui semble aboutir au nez. — Traction crampoïde dans l'occiput et la nuque, qui force à renverser la tête. — *Maux de tête lancinants.* — Les douleurs dans l'occiput sont soulagées en détachant les cheveux. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu.

YEUX. — *Brûlement dans les yeux,* avec larmolement et photophobie, surtout le matin après les lotions d'eau froide. — Cécité passagère. — *Obscurcissement de la vue.* — Cercles colorés devant les yeux. — Auréole irisée autour de la lumière, le soir.

OREILLES. — Élançements dans les oreilles, le soir, aggravés en se couchant dessus. — Tension, élançements et déchirement derrière les oreilles. — Inflammation et gonflement du lobe de l'oreille avec douleur brûlante et tressillante. — Tintement et sonnerie dans les oreilles. — *Surdité permanente,* par paralysie du conduit auditif.

NEZ. — Brûlement dans le nez, avec fouillement et douleur de griffement, aggravée par le toucher. — *Inflammation du bout du nez,* avec douleur lancinante. — Gonflement dans l'intérieur du nez. — Ulcère dans la narine. — *Épistaxis avec sang acre.* — Coryza violent, avec obturation du nez et perte de l'odorat.

VISAGE. — Teint pâle et maladif. — Rougeur et tension dans les joues, avec exacerbation des maux de tête. — Déchirement dans les os du visage.

DENTS. — *Maux de dents,* avec traction lancinante ou douleurs déchirantes dans les dents et la tête. — Élançements dans les dents

carieuses, au toucher. — Maux de dents pulsatifs, la nuit, aggravés par les choses froides. — *Gonflement des gencives*, inflammatoire ou scorbutique; elles saignent facilement.

BOUCHE ET GORGE. — *Haleine fétide*. — Langue chargée d'un enduit blanc. — *Mal de gorge*, avec douleur lancinante et inflammation du voile du palais et de la luette. — Douleur nocturne dans la gorge, comme si elle allait se contracter, avec suspension de la respiration.

ESTOMAC. — *Absence d'appétit, et *soif ardente et continuelle*. — *Appétit*, le soir principalement. — *Nausées*, comme si on allait vomir, surtout la nuit. — Vomiturition et vomissement de mucosités mêlées de sang. — Maux d'estomac, avec sensation comme si quelque chose s'y retournait. — Rongement, faiblesse spasmodique et *pression à l'épigastre*. — **Crampes d'estomac*, violentes, avec douleur contractive. — Élançement dans l'estomac et dans l'épigastre. — Sensation de froid ou *brûlement dans l'estomac*. — (Inflammation de l'estomac.)

VENTRE. — *Maux de ventre*, après avoir mangé du veau, excessivement violents, surtout dans le côté droit. — Fort ballonnement du ventre. — Tranchées qui se dissipent vers le soir. — Douleurs lancinantes dans le ventre. — **Incarcération de flatuosités*, surtout l'après-midi.

SELLES. — *Selles dures*, difficiles et lentes, évacuées avec beaucoup d'efforts. — Besoin pressant d'aller à la selle, avec ténésme. — *Selles molles, avec tranchées*. — **Diarrhées*, quelquefois sans douleurs, ou colliquatives. — Selles sanguinolentes.

URINES. — Besoin fréquent d'uriner, et *émission abondante d'une urine claire*, avec un nuage rougeâtre.

PARTIES GÉNITALES. — Exaltation de l'appétit vénérien. — *Règles trop hâtives et trop abondantes, avec écoulement d'un sang noir*. — Avant et pendant les règles, douleurs violentes dans le ventre et aux reins. — Leucorrhée séreuse, blanche, qui roidit le linge, et s'échappe pendant les douleurs aux reins.

LARYNX. — Enrouement avec raucité et grattement dans la gorge. — Tension et douleurs incisives dans le larynx, avec déglutition empêchée. — Toux qui réveille vers 3 heures du matin, avec maux de tête étourdissants. — *Toux au grand air, ou en montant un escalier, comme aussi chaque fois qu'on retient la respiration. — *Toux sèche*, surtout le matin. — *En toussant, douleurs incisives dans la poitrine*, jusqu'à ce que les mucosités se soient détachées. — **Toux avec élancements dans la poitrine, et expectoration de sang pur*. — °Toux avec expectoration purulente et sueurs colliquatives.

POITRINE. — *Gêne de la respiration*, qui ne permet pas d'être couché

la tête basse. — Oppression de poitrine, en montant. — Douleur de poitrine, avec tension pressive, accompagnée d'une sensation d'âpreté sous le sternum, qui oblige à tousser fort. — *Douleur contractive dans la poitrine*, partant du dos, avec sensation de constriction des poumons. — *Lancinations dans la poitrine*, surtout en respirant profondément, en étant couché et en toussant, accompagnées d'angoisse et d'oppression excessives. — (*Inflammation des poumons.*) — *Violents battements de cœur*, surtout la nuit, au lit.

TRONC. — Douleurs lancinantes dans la région des reins. — *Douleurs violentes aux reins, la nuit et le matin*, au réveil. — Douleurs dans le dos, en se baissant. — *Pression* dans les lombes, pendant le repos, aggravée surtout en toussant. — *Élancements dans et entre les omoplates*, souvent accompagnés de suspension de la respiration, la nuit, en étant couché sur le dos, soulagés en se couchant du côté droit. — Douleur dans la nuque et jusque dans les épaules, comme si on tirait violemment les cheveux.

BRAS. — *Déchirement dans les épaules, la nuit*. — Déchirement et élancements dans les articulations des bras, du coude, des mains et des doigts, principalement la nuit, avec pesanteur et sensation comme si la main était plus volumineuse, et gonflement des doigts. — Torpeur et fourmillement dans les bras et les mains. — *Traction et déchirement dans les bras*, depuis l'épaule jusque dans les doigts. — Douleur de luxation dans les articulations des doigts. — Faiblesse dans les bras, les mains et les doigts, qui ne permet de rien tenir solidement. — Déchirement crampoïde dans les articulations des doigts, alternant avec maux de tête. — Crampes et roideur dans les articulations des doigts.

JAMBES. — *Déchirement dans les jambes*. — Grande lassitude et *faiblesse paralytique dans les jambes*, après une marche modérée. — Déchirement tressaillant dans la plante des pieds. — Torpeur et fourmillement dans les pieds. — Contraction des orteils.

187.—NITRI ACIDUM.


NITR-AC. — Acide nitrique. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 3, 30. — *Durée d'action* : jusqu'à 7 semaines dans les affections chroniques.

ANTIDOTES : Calc. camph. con. hep. mez. petr. sulf. — *On l'emploie comme antidote de* : Calad. ? Calc. merc.

COMPARER AVEC : Acon. aur. bell. calad. calc. chel. con. graph. hep. kal. lyc. magn. merc. mez. mur-ac. nitr. op. petr. phos-ac. plat. puls. rhus. selen. sep. sil. sulf. sulf-ac. thui. C'est surtout après : Bell. calc. hep. kal. natr. puls. sulf.

et *thel.*, que l'acide nitrique fera du bien, lorsqu'il se trouvera indiqué; après l'acide nitrique, on emploiera souvent avec succès : *Calc. petr. puls. sulf.*

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections des personnes à teint brun, cheveux et yeux noirs ou bruns et d'une constitution maigre, sèche et bilieuse, caractère vif et irritable; ou bien des personnes d'une constitution faible, lymphatique ou leucoslegmatique, avec disposition à des diarrhées, des rhumes du cerveau, des flueurs blanches ou autres écoulements muqueux. — Affections rhumatismales; Douleurs ostéocopes, inflammation, carie et autres affections des os, surtout par l'abus du mercure; Affections syphilitiques et sycosiques; Dartres, rhagades, taches et autres suites fâcheuses de l'abus du mercure; Inflammation, engorgement et ulcération des glandes; Affections scrofuleuses et rachitiques; Affections hystériques; abcès; souffrances chlorotiques (?) et icteriques; Inflammations locales internes; Épilepsie?; Engelures; Ulcères mercuriels; Verrues; Loupes?; Mélancolie; Surexcitation nerveuse, surtout par l'abus du mercure; Migraine; Céphalalgies rhumatismales, congestives, hystériques et nerveuses; Chute des cheveux par suite de céphalalgies fréquentes; *Corona Veneris*; Ophthalmies aiguës et chroniques, surtout celles qui proviennent de l'abus du mercure ou d'ulcères syphilitiques répercutés; Obscurcissement de la cornée; Amblyopie amaurotique; Myopie?; Oïte, et otorrhée purulente; Dureté de l'ouïe; Coryza chronique; Ozène; Dartres faciales; Affections scorbutiques des gencives et stomacace, surtout par l'abus du mercure; Amygdalite et autres angines flegmoneuses; Angines syphilitiques et mercurielles, même avec ulcération; Odontalgies, surtout celles provenant de l'abus du mercure; Affections gastriques et hépatiques; Ictère; Coliques flatulentes (et inflammatoires)?; Bubons syphilitiques, mercuriels et scrofuleux; Hernies inguinales; Constipation, ou relâchement chronique du ventre; Diarrhées et dyssenteries; Hémorrhoides; Incontinence d'urine; Gravelle; Gonorrhées chroniques; Condylomes; Orchite; Cancer (?), squirrhe (?) de l'utérus; Aménorrhée; Chlorose?; Flueurs blanches; Induration des glandes mammaires?; Laryngite chronique (phthisie laryngée); Toux convulsive; Coqueluche?; Hémoptysie; Souffrances phthisiques (surtout après l'usage de kali carb.); Spasmes pulmonaires; Rhagades et taches mercurielles aux mains; Engelures aux mains et aux pieds, etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs lancinantes, comme par des échardes, surtout au toucher. — *Déchirement dans les membres, ou tiraillement, surtout après un refroidissement. — °Inflammation et sensibilité douloureuse des os. — °Ulcération des os. — Rachitisme. — Inflammation, gonflement et suppuration des glandes. — Craquement dans les articulations. — Attaques d'épilepsie, précédées de tiraillements dans les membres, et suivies de roideur du corps et de ronflement. — *Douleurs aux changements de temps. — *Douleurs sensibles pendant le sommeil. — Exacerbation des symptômes, le soir et la nuit. — *La promenade en voiture soulage la plupart des symptômes.* — *Grande faiblesse et lassitude générale, avec tremblement, pesanteur des jambes et besoin de rester couché, surtout le soir, ou le matin. — *Amaigrissement excessif. — *Facilité à se refroidir.

PEAU. — *Sécheresse de la peau. — *Eruptions urticaires, pruriantes, même à la face et surtout au grand air. — °Pores noirs. — °Taches brun rougeâtre *et éphélides foncées sur la peau. — °Taches cuivrées ou violettes. — °Dartres pruriantes. — *Douleurs dans les engelures et les cors aux pieds. — *Par un froid modéré, membres comme gelés, enflammés et pruriantes, avec peau gercée. — Gros furoncles. — Plaies et ulcères, avec élancements comme par des échardes, ou avec douleurs brûlantes, et saignant facilement. — Ulcères, avec suppuration sanieuse, sanguinolente et corrosive. — *Douleurs dans les anciennes cicatrices, par le changement de temps. — *Verrues. — °Loupes.

SOMMEIL. — Envie de dormir le jour, par faiblesse, avec vertige. — Sommeil tardif le soir, *et réveil de bonne heure ou difficile, le matin. — Insomnie, comme par surexcitation. — Sommeil incomplet et agité, avec réveil fréquent en sursaut. — Sommeil non réparateur. — La nuit, saignement de nez, mal à la tête, mal aux dents, soif, gastralgie, coliques, douleurs dans les membres, cauchemar, angoisse, battements de cœur, nausées, vomissements et beaucoup d'autres souffrances. — *Affluences de rêves fantastiques, voluptueux, anxieux, effrayants, et souvent avec cris, gémissements plaintifs, paroles et sursauts avec effroi.* — Rêves de morts, de spectres, des occupations de la journée, de crimes, de festins, etc. — Secousses du corps et tressaillement dans les membres, pendant le sommeil.

FIÈVRE. — Froideur générale de la peau. — *Froid continu. — *Fièvre après midi; frisson et chaleur. — Chaleur intérieure, sans soif, continue ou par accès. — Chaleur sèche la nuit, avec forte soif. — *Sueur nocturne fétide, acide. — *Sueur acide, comme de l'urine de cheval, le jour.

MORAL. — *Tristesse. — Mélancolie excessive et accès d'angoisse,

surtout le soir, ou la nuit. — **Inquiétude* sur l'état de sa santé, avec *peur de la mort*. — **Inaptitude* au travail. — **Surexcitabilité*. — Concentration en soi-même. — **Irritabilité* et opiniâtreté. — Emportement. — Rancune prolongée. — Accès de fureur et de *désespoir*, avec jurements et imprécations. — Humeur pleureuse. — Nostalgie. — Caractère peureux et disposition à s'effrayer. — Faiblesse des facultés intellectuelles, avec inaptitude aux travaux d'esprit. — Faiblesse excessive de la mémoire.

TÊTE. — **Vertiges* en marchant et en étant assis. — **Vertiges* qui forcent à se coucher, surtout *le matin ou le soir*. — Vertiges avec faiblesse, nausées ou mal à la tête. — Mal de tête, le matin, au réveil. — Grande sensibilité de la tête au bruit des voitures ou d'une marche pesante. — *Accès de maux de tête*, avec nausées et vomissements. — Sensation de plénitude et de pesanteur dans la tête, avec tension et pression jusque dans les yeux. — **Déchirement* dans le front, le vertex et l'occiput. — *Lancinations* dans presque toutes les parties de la tête, qui obligent quelquefois à se coucher et troublent le sommeil de la nuit. — **Maux de tête pulsatifs*. — **Congestion à la tête*, avec chaleur intérieure. — *Douleurs ostéocopes* dans la tête, tractives et pressives. — **Sensibilité douloureuse* du cuir chevelu; la coiffure gêne. — Tension du cuir chevelu. — **Prurit* au cuir chevelu. — Éruption humide à la tête. — **Chute des cheveux*. — **Plaques ulcérées*, suintantes et brûlantes, à la tête.

YEUX. — Yeux ternes et creux. — *Pression et élancements* dans les yeux. — **Inflammation des yeux*. — **Ulcération* des yeux. — **Taches de la cornée*. — Gonflement des paupières. — Larmoiement fréquent, surtout en lisant, avec sensibilité douloureuse des yeux. — Difficulté d'ouvrir les yeux le matin (ils sont entourés d'un cercle jaune). — **Paralyse* de la paupière supérieure. — **Pupilles difficiles à contracter*. — Myopie. — Diplopie. — **Brouillard*, taches, filets, étincelles et *points noirs*, *voltigeant devant la vue*. — Vue trouble et obscurcissement des yeux. — Éblouissement à la lumière du jour.

OREILLES. — **Élancements* dans les oreilles. — Sécheresse de l'intérieur de l'oreille. — **Ulcération* de l'apophyse mastoïde. — **Écoulement par les oreilles*. — Excoriation derrière les oreilles, avec prurit et suppuration. — **Obturation des oreilles*. — *Durété de l'ouïe*, principalement par allongement des amygdales. — **Éclatement*, battement et *grondement* dans les oreilles. — Craquement dans les oreilles, pendant la mastication. — Gonflement des parotides. — **Loupe* sur le lobe de l'oreille.

NEZ. — Bout du nez rouge et couvert de vésicules croûteuses. — Dârtres pruriantes aux ailes du nez. — *Picotements lancinants*

dans le nez, au toucher. — *Douleur d'excoriation, brûlement et croûtes dans le nez. — *Saignement de nez, provoqué par des pleurs, ou le matin, d'un sang noir. — *Sensation d'une odeur fétide en respirant par le nez. — Odeur fétide par le nez. — *Excroissance, comme un fic, dans le nez. — *Éternuments avortés. — *Sécheresse et obturation du nez. — Violent coryza fluent, avec maux de tête, toux, gonflement et ulcération du nez. — Écoulement de mucosités épaisses et corrosives, par le nez. — Mucosités fétides et jaunâtres dans le nez.

VISAGE. — Pâleur du visage, avec yeux enfoncés. — Couleur jaune de la face, surtout autour des yeux, avec rougeur des joues. — Douleur crampoïde et déchirement dans les joues et les pommettes. — Gonflement des joues. — *Éruption boutonneuse à la face, au front et aux tempes. — *Pustules au visage, à bords rouges et larges, se recouvrant de croûtes. — Gonflement érysipélateux de la joue, avec douleur lancinante, nausée et fièvre. — Peau furfuracée sur toute la face. — Éruptions pruriantes et dartres dans les favoris. — Pores noirs au visage. — Gonflement des lèvres. — *Lèvres gercées. — Ulcération des lèvres et des commissures des lèvres. — *Ulcères à la partie rouge des lèvres. — Furoncles au menton. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires.

DENTS. — Odontalgie, avec douleur tressaillante, lancinante, tractive, ou *pulsative, principalement la nuit, ou le soir, au lit. — Douleur dans les dents cariées. — Jaunissement et *vacillement des dents. — *Gencives saignantes, blanches et gonflées.

BOUCHE. — Odeur fétide et putride de la bouche. — Excoriation de la langue, du palais et de la face interne des gencives, avec douleur lancinante, aiguë. — *Salivation, quelquefois par accès fébriles. — Grande sécheresse de la bouche, avec soif ardente.

GORGE. — Ulcère, avec douleur lancinante dans la bouche et la gorge. — *Inflammation de la gorge, avec douleurs lancinantes, surtout en avalant des liquides. — *Tonsilles rouges et gonflées. — *Sensation brûlante et douleur d'excoriation dans la gorge.

APPÉTIT. — *Amertume de la bouche, surtout après avoir mangé. — Goût aigre, avec brûlement dans la gorge. — *Goût douceâtre dans la bouche. — *Forte soif, même le matin en se levant. — *Dégout pour la viande et les choses sucrées. — Répugnance pour le pain, qui laisse un goût aigre et fait vomir. — *Appétence pour la terre, la craie, la chaux, ou pour les aliments gras et le hareng. — Faim vive avec dégoût de la vie. — *Difficulté de digérer le laitage. — *Nausées par des aliments gras. — *Sueur pendant et après le repas. — Après avoir bu pendant le repas, douleur d'excoriation dans la gorge, l'œsophage et l'estomac.

mac, ou coliques. — **Après le repas, plénitude dans l'estomac, lassitude avec chaleur, sueur et battement de cœur par le moindre mouvement, ou nausées, renvois, flatuosités, mal de tête avec vomissement, sommeil, angoisse, etc.*

ESTOMAC. — **Renvois aigres. — *Envie de vomir. — Pyrosis. — Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, après avoir bu vite. — Hoquet. — *Nausées fréquentes et envie de vomir, souvent avec angoisse, tremblement et frissonnement. — Vomissements amers et aigres, avec renvois fréquents (après le repas). — Pression à l'estomac. — Brûlement ou sensation de froid à l'estomac. — Douleur au cardia en ingérant les aliments. — Crampe d'estomac contractive. — *Lancinations dans l'épigastre.*

VENTRE. — *Pression tensive et élancements dans l'hypochondre gauche. — Douleurs abdominales comme à la suite d'un refroidissement. — *Fort ballonnement du ventre, même le matin. — *Fréquemment, pincements et douleurs incisives dans le ventre. — *Douleur d'ulcération dans le bas-ventre. — *Élancements dans le ventre, surtout en y touchant. — *Hernie inguinale, chez les enfants aussi. — *Gonflement et suppuration des glandes de l'aîne. — *Facilité à se refroidir le ventre. — *Accumulation de flatuosités dans le ventre. — *Grondement et borborygmes dans le ventre. — *Incarcération de flatuosités, surtout le matin et le soir.*

SELLES. — **Évacuations alvines, difficiles, irrégulières. — *Selles dures, sèches. — Selles trop fréquentes. — *Envie pressante d'aller à la selle. — *Selles diarrhéiques, quelquefois muqueuses ou d'odeur putride. — Évacuation fétide et non digérée. — Selles sanguinolentes, dysentériques, avec ténésme. — Coliques avant les selles. — Après les selles, surexcitabilité et accablement. — Douleur brûlante et *prurit à l'anus et au rectum. — Excoriation suintante à l'anus. — *Gonflement des boutons hémorrhoidaux de l'anus, qui saignent à chaque selle.*

URINES. — *Besoin fréquent d'uriner, avec émission peu abondante d'une urine fétide, de couleur foncée ou brunâtre. — *Incontinence d'urine. — *Émission d'urine douloureuse. — Urine froide. — *Urine fétide. — Sédiment rouge, et sable dans les urines. — Cuisson et brûlement en urinant. — Écoulement de mucosités quelquefois sanguinolentes, ou de pus, par l'urèthre. — Gonflement de l'orifice de l'urèthre.*

PARTIES VIRILES. — *Fort prurit aux parties génitales. — Chute des poils aux parties. — Excoriation entre le scrotum et les cuisses. — Taches rouges se recouvrant de croûtes, au prépuce. — Sécrétion derrière le gland, comme une gonorrhée bâtarde. — Gonfle-*

ment, inflammation et phymosis du prépuce. — **Ulcères comme des chanores*, au prépuce et au gland. — **Épicroissance comme des fics*, au prépuce et au gland, avec douleur cuisante et saignement au toucher, et suintement d'un pus d'odeur fétide et doucesâtre. — **Testicules relâchés*. — *Gonflement inflammatoire des testicules*, avec traction douloureuse dans le cordon spermatique, jusque dans le côté du ventre. — **Absence d'appétit vénérien et d'érections*. — Grande lasciveté avec écoulement abondant de liqueur prostatique. — Érections nocturnes, douloureuses et presque spasmodiques. — **Pollutions par trop fréquentes*.

RÈGLES. — Prurit, douleur brûlante et sensation de sécheresse à la vulve. — Lancinations dans le vagin. — Excoriation à la vulve, entre les cuisses. — Ulcères avec prurit brûlant dans le vagin. — Règles trop hâtives. — **Suppression des règles*. — Pendant les règles, crampes dans le bas-ventre, et pression vers les parties génitales. — Leucorrhée fétide, muqueuse, rongeante. — Écoulement fétide, brun-rougeâtre, par le vagin. — **Nodosités dures au sein*. — Atrophie des mamelles.

LARYNX. — **Enrouement avec coryza*, toux et douleurs lancinantes dans la gorge. — **Apreté dans les bronches*. — Grattement et élancements dans la trachée-artère, surtout après une lecture ou une conversation soutenue. — Toux avec élancements et douleur d'excoriation dans la gorge et la poitrine. — **Toux, seulement le jour*. — **Toux sèche, surtout le soir, en se couchant*. — **Toux aboyante*. — Toux avec vomissement. — Toux ébranlante, la nuit, avec suspension de la respiration, presque comme dans la coqueluche. — En toussant, lancinations dans les reins, ou mal à la tête, à l'estomac, aux hypochondres, ou douleur d'excoriation et élancements dans la poitrine. — **Expectoration purulente, jaunâtre, par la toux*. — Toux courte, avec expectoration d'un sang noir, coagulé.

POITRINE. — **Respiration sibilante*, surtout pendant un travail manuel. — **Gêne de la respiration*. — **Haleine courte*. — Perte d'haleine et battement de cœur en marchant et en montant un escalier. — Crampes contractives à la poitrine. — Élancements et points dans la poitrine et les côtés. — Douleur d'excoriation dans la poitrine, en respirant et en toussant. — *Congestion à la poitrine*, avec angoisse, chaleur et battement de cœur.

TRONC. — **Douleur dans le dos et aux reins*, après un refroidissement. — **Élancements dans et entre les omoplates*. — *Roidure de la nuque*. — **Gonflement des glandes du cou et des aisselles*. — *Suppuration des glandes axillaires*.

BRAS. — Douleur pressive dans l'articulation de l'épaule. — *Traction dans les bras*. — Tremaillage des muscles aux bras. —

Douleur de brisement dans les bras, qui ne permet pas de les lever. — *Traction et déchirement dans les avant-bras et les mains.* — Faiblesse et tremblement des avant-bras et des mains. — Verrues aux bras. — *Gercures et rhagades aux mains. — *Taches cuivrées aux mains. — Mains froides. — *Peau des mains râpeuse. — Douleur tensive dans l'articulation des doigts. — Gonflement des doigts, surtout dans les articulations, avec douleur lancinante. *Doigts morts et engourdis, à l'air froid. — **Engelures aux doigts et aux mains.* — *Dartres entre les doigts. — *Taches blanches sur les ongles.

JAMBES. — Douleur de luxation dans la hanche, qui force à boiter. — Lassitude, pesanteur et **froid aux jambes* et aux pieds. — *Traction et déchirement dans les jambes et les pieds.* — **Inquiétudes dans les jambes*, le soir. — *Prurit aux cuisses. — *Douleurs dans les cuisses, en se levant de son siège. — Douleur dans le jarret qui ne permet pas d'appuyer le pied. — Roideur et élancement dans le genou. — Fléchissement de l'articulation du genou et du pied. — *Faiblesse du genou.* — *Crampe violente dans le mollet*, surtout la nuit, et vers le matin, ainsi qu'en marchant après avoir été assis. — *Tressaillement dans les mollets. — *Élancements dans les talons en appuyant le pied. — **Sueur des pieds*, quelquefois fétide, avec excoriation entre les orteils. — Sueur aux pieds. — *Engelure aux orteils.*

158.—NITRI SPIRITUS DULCIS.

NITR-SP. — Éther nitrique. — Médicament encore entièrement inconnu dans ses effets primitifs, mais qui est l'antidote de plusieurs médicaments, et qui a été employé en homœopathie contre : *Souffrances cérébrales dans des fièvres typhoïdes*, et *Souffrances par l'abus du sel de cuisine.*


SYMPTOMES (qui ont été enlevés par ce médicament). — **Apathie complète*, avec absence de tout désir, stupeur, regard fixe et hagard, faiblesse excessive, sommeil avec murmures. — *Grande fatigue; la position couchée peut seule soulager et tranquilliser. — **Amaigrissement excessif.* — **Mauvaise humeur excessive*, irascibilité, irritabilité, emportement et humeur querelleuse, avec pleurs faciles, dégoût pour le travail et la conversation. — **Aggravation des souffrances après midi.* — *Face pâle, avec yeux caves et cernés. — *Ardeur dans la bouche. — *Sensation de contraction dans la gorge, avec douleur comme par une cheville dans le gosier. — *Pyrosis. — *Goût aigre dans la bouche. —

°Manque d'appétit. — °Nausées continuelles, dégoût et accumulation d'eau dans la bouche. — °Après le repas, vomissement de matières aigres et de mucosités, suivi de mal à la tête et de frissons. — °Douleur contractive et pression dans l'estomac, avec sensation de plénitude, immédiatement après le repas. — °Élançements, tranchées et douleurs brûlantes dans le ventre. — °Frissons et douleurs tractives aiguës, dans le dos. — °Règles trop peu abondantes et irrégulières.

159. — NUX JUGLANS.

N-JUGL. — Noix du noyer, *juglans regia*. — Gazette autrichienne.
ANTIDOTES? — DURÉE D'ACTION? — DOSES USITÉES.

AVIS CLINIQUES. — Ce médicament n'ayant été malheureusement étudié, jusqu'ici, que par l'école *autrichienne* ou *spécifiste*, c'est-à-dire à de très-fortes doses seulement, il n'a encore fourni aucun de ces symptômes qui indiquent les médicaments d'une manière spéciale et précise dans les cas particuliers d'une maladie, et qui ne s'obtiennent ordinairement que lorsque les substances sont étudiées aussi au moyen des dernières atténuations. Toutefois l'on verra si les symptômes suivants pourront indiquer quelquefois les cas précis dans lesquels on emploierait avec succès la noix contre certaines maladies telles que : — Fièvres intermittentes; *Affections scrofuleuses de toute sorte*; Souffrances rachitiques; Glandes engorgées; *Ulcères, dartres, ophthalmies, diarrhées syphilitiques, scrofuleuses et mercurielles*; Flueurs blanches; Colère, etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

GÉNÉRALITÉS. — Lassitude, abattement et sensation de relâchement des muscles. — Aggravation de quelques souffrances, le soir et la nuit, ainsi qu'après le dîner; soulagement après les selles.

PEAU. — Prurit à divers endroits, sans éruption visible. — Petites pustules à la face, surtout à la bouche, comme dans la coupe-rose. — Petits boutons rouges, se remplissant d'une humeur épaisse, au cou, à la face, aux épaules et au dos. — Petites vésicules, comme de l'*eczéma rubrum*, avec prurit brûlant, rougeur et gerçure à la peau, suintant un liquide qui roidit le linge et le teint en jaune verdâtre, et s'aggravant par la transpiration. —

Petites papules comme celles du *lichen*, sur le cou-de-pied, avec rougeur, fort prurit, épaissement de la peau et croûtes dures. — *Taches rouges*, avec des papules, ou bien avec un point purulent au milieu. — Petite tumeur dure, rouge et ronde, au bras, comme une petite glande endurcie, ou une tumeur enkystée. — Ulcère au pénis, à bords épais et durs, à fond lardacé et saignant facilement. — Tumeur dure, rougeâtre et très-douloureuse sur la joue, partant de la gencive et ayant au milieu une tache ronde, rouge foncé, molle et affaissée, formant un abcès qui se vide à l'intérieur.

SOMMEIL. — Pandiculations et bâillements fréquents. — *Grande agitation et jactation, le soir au lit*, parfois avec sensation comme si l'on volait dans l'air, avec vertige tournoyant. — *Sommeil nocturne, agité*, avec beaucoup de rêves effrayants. — Réveil en sursaut, pendant la sieste, comme par des secousses électriques, aux avant-bras et aux mains, à chaque effort de s'endormir.

FIÈVRE. — Le soir, face brûlante avec extrémités froides. — Accès fréquents de chaleur fugace. — *Pouls plus fréquent, le soir*, parfois avec chaleur brûlante des mains.

MORAL. — Humeur chagrine et mécontente, le soir. — Grande répugnance pour la conversation et les discussions. — Paresse d'esprit, inattention en lisant, et répugnance pour le travail.

TÊTE. — Vertiges. — Agitation et excitation comme par ivresse, avec sensation comme si l'on volait dans l'air. — *Pesanteur dans la tête*, le matin, avec tête entreprise. — *Douleur au front*, parfois surtout en secouant la tête et en remuant les yeux. — *Mal de tête au-dessous des yeux, surtout du côté gauche*, parfois pressif et augmenté par le mouvement. — Céphalalgie avec embarras de la tête et brûlement dans les yeux. — Mal de tête, comme une migraine, sur une petite place circonscrite de l'os pariétal gauche, s'exacerbant fortement par la conversation. — Chaleur brûlante à la tête, avec froid glacial aux extrémités, le soir, au lit.

YEUX. — Douleur aux yeux, comme si un coryza allait se déclarer. — Brûlement dans les yeux.

NEZ. — Embarras au nez, comme le commencement d'un coryza.

FACE. — Petites pustules à la face, surtout autour de la bouche, comme dans la couperose. — Tumeur dure, rougeâtre et douloureuse, à la joue et à la lèvre, formant abcès suppurant.

DENTS. — Odontalgie sourde, tractive, dans les dents cariées, le soir, et augmentée par la chaleur du lit. — Abcès très-douloureux aux gencives.

BOUCHE. — Afflux de salive à la bouche. — Langue couverte de mucosités blanches, le matin en se réveillant.

GORGE. — Accumulation de mucoosités, forçant à renâcler souvent.

APPÉTIT ET GOUT. — *Goût amer de la bouche*, particulièrement le matin au réveil, où la bouche est aussi pâteuse. — Appétit augmenté. — Soif vive, on bien adipsie complète au dîner et au souper, avec une sorte de déplaisir au vin, et plaisir de garder la bouche sèche. — Répugnance pour la pipe, le soir. — Après le repas, aggravation de la plupart des symptômes.

ESTOMAC. — *Renvois violents et bruyants*, et grande disposition et envie de rendre des rapports. — Hoquet, surtout après avoir mangé des aliments lourds. — *Mal au cœur et nausées*, avec accumulation d'eau dans la bouche et envie de vomir, ou bien avec brûlement dans l'estomac. — Vomissement des aliments, le soir au lit. — *Grande plénitude, sensation et ballonnement de l'estomac*, ne permettant de rien manger malgré le meilleur appétit, et soulagés par des rapports. — Pression dans l'estomac.

VENTRE. — *Élancements dans le côté gauche, tant du ventre que de la région hypochondriaque, surtout en se baissant*, en riant et en marchant vite. — *Pression douloureuse dans le bas-ventre*, surtout du côté gauche, soulagée par des rapports ou par l'émission de vents. — Douleur violente dans la partie inférieure du bas-ventre, passive et tractive, avec règles trop hâtives. — *Grande plénitude, ballonnement, tension, pesanteur du ventre*, parfois avec besoin fréquent d'aller à la selle, ou après la selle même, ou avec *amélioration par des rapports et l'émission de vents*. — *Flatuosités continues et émission fréquente de vents*, surtout dans la position couchée. — Gargouillements dans le ventre et borborygmes. — Les vents émis n'ont presque pas d'odeur. — Dureté tympanitique du ventre.

SELLES. — Parfois selles dures et constipation, ou bien besoin fréquent d'aller à la selle. — Selles liquides, précédées de pincements dans le ventre. — Après la selle, amélioration du ballonnement et de la pesanteur du ventre, ou bien brûlement et pression à l'anus. — Prurit à l'anus, le soir, au lit, avec élancements qui forcent à se lever.

URINES. — *Besoin presque continuel d'uriner, émission très-fréquente, jour et nuit, et sécrétion des urines fortement augmentée*. — Émission d'urine involontaire, goutte à goutte, si le besoin pressant n'est pas satisfait sur-le-champ. — Urines claires, couleur de vin blanc, et sans dépôt.

PARTIES VIRILES. — Érections fréquentes, jour et nuit. — Ulcère, près du frein du prépuce, à bords épais et durs, à fond lardacé et saignant facilement.

RÈGLES. — Règles trop hâtives de quinze jours, précédées de fortes

douleurs dans les aines, et durant huit jours, avec sang abondant en caillots noirâtres.

POITRINE. — Élançements fugaces, comme dans les deux poumons.

— Oppression de la poitrine pendant et avant la marche. — Prurit au sternum, forçant à se gratter.

TRONC. — Élançements au sacrum, tellement violents qu'ils font tressaillir. — Boutons rouges, comme ceux de l'*acné*, se remplissant d'un pus épais, au dos, à la nuque et aux épaules. — Sous les aisselles, petites vésicules, comme d'un eczéma rouge, avec prurit brûlant, suintement léger, et rougeur, excoriation et gerçure à la peau. — Furoncles très-douloureux, gros et purulents, à l'épaule et à la région du foie.

EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES. — Taches larges, pruriteuses, avec une bosse purulente au milieu, au pli du coude. — Petite tumeur indolore, dure, rouge et ronde, au bras, comme une petite glande endurcie, ou une tumeur enkystée. — Papule douloureuse et purulente, se formant à l'avant-bras sur une petite place rouge, brûlante et pruriteuse. — Furoncle très-douloureux, gros et dur, au biceps du bras droit. — Ancienne dartre à la main redevient pruriteuse et rouge. — Tiraillement et sensation de faiblesse paralytique à la main droite. — Prurit aux doigts, ou bien au bras, le soir au lit. — Tiraillement au pouce et à l'index de la main droite, comme par foulure.

EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES. — Douleurs dans l'articulation coxo-fémorale, en marchant. — *Douleur gênant la marche, à l'articulation du genou*, tantôt lancinante, ou rhumatismale, ou comme faiblesse paralytique. — Tiraillement comme par foulure, au gros orteil droit. — Brûlement et prurit aux jambes, le soir, au lit. — Petites papules, comme celles du lichen, au cou-de-pied, avec rougeur, fort prurit, épaississement de la peau et croûtes dures.

160. — NUX MOSCHATA.


N-MOS. — Noix muscade. — HELBIG. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : ?

ANTIDOTE : *Semina cari carvi*. (eumin.)

COMPARER AVEC : Con. ign. magn. mosch. n-vom. op. sep. puls. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections principalement des femmes et des enfants ; Affections occasionnées par l'influence d'un froid (humide) ; Affections rhu-

matismales; Névralgies?; Affections scorbutiques?; Éclampsie des enfants?; *Accès de défaillance et autres paroxysmes hystériques*; Convulsions?; Affections scrofuleuses et rachitiques?; Tabes dorsalis?; Atrophie des enfants?; Fièvres intermittentes; Fièvres typhoïdes; Coma?; Imbécillité?; Apoplexie?; Céphalalgie par indigestion; Amblyopie amaurotique?; *Éphélides*?; *Odontalgie des femmes enceintes*; *Odontalgie par l'air froid et humide du soir*; Paralysie de la langue et des organes de la déglutition?; Angines?; Aphthes dans la bouche?; *Nausées et vomissement des femmes enceintes*; Dyspepsie, surtout chez les vieillards?; Gastralgie?; *Engorgement du foie* (et de la rate?); Coliques flatulentes, néphrétiques et vermineuses?; Coliques des enfants?; *Diarrhées*, surtout par suite de faiblesse ou par refroidissement; Diarrhées putrides et sanguinolentes; *Diarrhée chez les enfants*; Dysenteries; Calculs urinaires?; Dysurie?; Impuissance!; Spermatorrhée?; Accouchement laborieux, douleurs d'enfantement fausses, spasmodiques ou trop faibles?; Prodrômes d'avortement?; *Odontalgie et souffrances gastriques* (et toux?) *des femmes enceintes*; Aménorrhée, par suite d'un refroidissement dans l'eau; Dysménorrhée?; Métorrhagies?; Chute du vagin, du rectum, etc.?; Toux catarrhale, par refroidissement dans l'eau; Phthisie? *Souffrances asthmatiques*; Hémoptysie?; *Maladies du cœur*, etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs fouillantes et pressives*, qui passent d'un endroit à l'autre, et qui n'occupent jamais qu'un petit espace, ne durent que peu d'instant, mais reparaissent bientôt. — Traction dans les membres, surtout pendant le repos, comme après un refroidissement. — **Par un temps froid* (humide), *douleurs dans les membres et les articulations*, et autres incommodités. — Les symptômes sont aggravés à l'air froid; la chaleur extérieure les soulage. — Affections accompagnées d'envie de dormir et de disposition **aux évanouissements*. — **Accès d'évanouissement*. — Convulsions. — État de refroidissement, comme quand on se rafraîchit subitement après la sueur, avec douleur dans la nuque et dans tous les os. — Grande sensibilité douloureuse de tout le corps; même en étant couché mollement, la partie sur laquelle on repose est bientôt douloureuse. — Grande agitation du système musculaire. — Après la plus légère fatigue, lassitude et besoin de se coucher. — *Grande lassitude*, surtout *aux reins et dans les genoux*, comme après une longue course, avec envie de dormir.

PEAU. — *Peau froide et sèche, peu disposée à la transpiration.* —

°Engelures. — Taches bleuâtres à la peau.

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir.* — Somnolence comateuse et assoupissement.

FIÈVRE. — Grande sensibilité à l'air froid, qui occasionne bientôt des frissons avec pâleur du visage. — Frissons fréquents. — °Fièvre tierce double, avec envie de dormir, langue blanche, râlement, expectoration sanguinolente, et soif modérée pendant la chaleur. — °Fièvre maligne, avec diarrhée putride ou colliquative? — Sueurs sanguinolentes.

MORAL. — *Humeur changeante*, avec désir tantôt d'une chose, tantôt d'une autre. — *Forte disposition à se moquer de tout*, surtout en plein air, et quelquefois avec air stupide, comme par imbécillité. — Affluence incessante d'idées facétieuses. — Humeur changeante, tantôt sérieuse, tantôt gaie. — Faiblesse de la mémoire et publi. — *Lenteur de la marche des idées, *étourdissement*, conception difficile. — *Manque d'idées*, comme par absence d'esprit. — Démence et aliénation mentale. — *Manie*, avec paroles bizarres et gestes inconvenants. — Délires.

TÊTE. — *Embarras et pesanteur pressive dans la tête, et surtout dans le front. — *Chancellement*, avec angoisse, roideur du corps et étourdissement. — *Vertige*, comme par ivresse, avec délires et radotage, ou avec étourdissement. — *Mal de tête, comme par une indigestion, surtout après le déjeuner. — Maux de tête pressifs, avec pesanteur et embarras de la tête. — *Douleur dans la tête et surtout dans les tempes*, avec chaleur intérieure, et sensation comme si le cerveau vacillait, en remuant la tête. — Sensibilité douloureuse de la tempe, au toucher. — Maux de tête pressifs et pulsatifs, surtout au-dessus de l'œil gauche. — Les maux de tête se manifestent généralement après le repas, et plus particulièrement après le déjeuner.

YEUX. — Sécheresse des yeux, et sensation de sécheresse, qui gêne les mouvements des paupières. — Larmoiement abondant et douleurs brûlantes dans les yeux. — Tension autour des yeux et dans les paupières. — Sensation de plénitude dans les yeux, avec rétrécissement des pupilles.

ORBITES. — Otalgie avec douleurs lancinantes. — Douleur dans les trompes d'Eustache, comme par un corps âpre, au changement de temps, et surtout aux approches de la pluie ou du vent.

VISAGE. — *Pâleur du visage, et cercles bleus autour des yeux. — Sensation de gonflement dans toute la moitié gauche du visage, avec picotement brûlant, comme par le fluide électrique.

NEZ. — Obturation du nez, quelquefois semi-latérale.

DENTS. — °Douleurs lancinantes et déchirantes dans les dents, s'étén-

dant jusque dans les oreilles et les tempes, avec lancinations dans les dents en les suçant, et exacerbation des douleurs par l'air et le contact. — *Déchirement nocturne dans les dents, avec impossibilité de rapprocher les mâchoires, qui sont comme paralysées. — *Douleurs lancinantes dans les dents, aggravées par la chaleur extérieure. — *Odontalgie produite par l'air humide du soir, avec douleurs compressives dans les dents et douleurs dans la nuque; il semble que les dents vacillent; l'eau chaude soulage les douleurs. — Maux de dents, après avoir travaillé, les mains dans l'eau, ou par suite d'un refroidissement. — Secousses dans les dents, après avoir bu de l'eau froide. — Dents émoussées comme si elles étaient enduites de chaux. — Saignement des gencives.

BOUCHE. — Sécheresse et sensation de sécheresse dans la bouche, sans soif. — Haleine fétide. — Accumulation abondante de mucosités épaisses et de salive dans la bouche. — Sensation de torpeur de la langue, au toucher, comme si elle était de cuir. — Sécheresse et sensation de sécheresse de la langue. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Gonflement des follicules muqueux sous la langue.

GORGE. — Grande sécheresse et sensation de sécheresse dans la gorge, avec grâtement.

APPÉTIT. — Goût dans la bouche, comme après avoir mangé beaucoup de sel. — Goût pâteux ou goût de craie dans la bouche. — Faim et appétit immodérés, surtout vers midi. — Diminution de l'appétit et prompt satiété. — Absence de soif. — *Accablement et malaise après le repas. — *Faiblesse de la digestion et de l'estomac.

ESTOMAC. — Renvois âcres, peu après le repas. — Nausées par le mouvement de la voiture. — Après le repas, et surtout après le déjeuner, aggravation des souffrances, et principalement des maux de tête. — Plénitude de l'estomac, avec gêne de la respiration. — Sensation de chaleur et douleur brûlante à l'estomac. — Ballonnement de l'estomac. — Crampes d'estomac, avec grande faiblesse de la digestion. — Pression dans l'estomac, comme par incarceration de flatuosités.

VENTRE. — Pression dans le foie, comme par des corps durs et pointus. — *Gonflement du foie. — *Sensation de pesanteur dans les hypochondres et la partie supérieure du ventre. — Colique avec douleur déchirante. — *Ballonnement du ventre, avec nausées et fouillement dans la région ombilicale. — Tranchées, comme par des vers, avec envie de dormir. — *Souffrances par des flatuosités, la nuit, troublant le sommeil.

SELLES. — Selles molles, lentes, difficiles à évacuer. — *Diarrhées par faiblesse, ou à la suite d'un refroidissement. — *Diarrhées

sanguinolentes, °putrides. — °Diarrhées comme des œufs brouillés, avec absence complète d'appétit (chez les enfants). — Diarrhée de matières non digérées. — °*Diarrhée, avec absence d'appétit et envie de dormir chez les enfants.* — Diarrhée muqueuse, comme par des vers.

URINES ET PARTIES VIRILES. — En urinant, douleurs brûlantes et incisives. — Strangurie douloureuse. — Urine odeur de violette. — Absence d'appétit vénérien. — Faiblesse des fonctions génitales. — Défaut d'érections, même pendant des idées voluptueuses. — Écoulement de liqueur prostatique.

RÈGLES. — Menstrues irrégulières. — Avant les règles, maux de reins et lassitude, avec pression à l'estomac, écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, et douleurs hépatiques. — Pendant les règles, sensation comme si tout affluait vers le bas-ventre, et tractions dans les membres. — Flux menstruel, épais et de couleur foncée. — °Suppression des règles. — Mamelles trop petites et vides de lait.

LARYNX. — Voix chevrotante. — **Enrouement et catarrhe.* — °Enrouement subit en marchant contre le vent. — Toux avec douleur dans la poitrine, comme si elle était à vif. — °*Toux sèche, avec suspension de la respiration, après un refroidissement dans l'eau.* — °Toux sèche, qui s'établit pendant un travail échauffant, ou à la chaleur du lit. — Toux avec expectoration de sang.

POITRINE. — Dyspnée. — **Haleine courte, surtout après le repas.* — Gêne de la respiration. — Rétrécissement de la gorge, comme un étranglement. — **Oppression de poitrine,* venant ordinairement de l'épigastre. — Plénitude et sensation pénible d'un fardeau sur la poitrine. — **Battement de cœur,* quelquefois avec accès d'évanouissement. — Tremblement du cœur.

TRONC. — Traction dans les muscles de la nuque, à l'impression d'un air humide. — *Douleurs de brisement aux reins et dans le dos.* — Douleurs dans le dos, en étant en voiture. — Lassitude aux reins et dans les genoux.

161.—NUX VOMICA.

N-VOM. — Noix vomique. — **HAHNEMANN.** — *Doses usitées : 15, 24, 30.* — *Durée d'action : 15, 20 jours, et même plus longtemps.*


ANTIDOTES : Acon. alcohol. camph. cham. coff. cocc. puls. vinum. — *On l'emploie comme antidote de :* Ambr. ars. calc. cham. chin. cocc. coff. colch. cupr. dig. graph. lach. petr. phos. puls. stram. sulf. tabac.

COMPARER AVEC : Acon. alum. ambr. amm. arn. ars. bis. bry. calc. cann. caps. carb-veg. caus. cham. chin. cocc. coff. colch. con. cupr. dig. dros. dulc. fer.

graph. hyos. ign. ipsc. lach. laur. lyc. magn. magn-m. merc. mur-ac. natr. natr-m. n-mos. op. petr. phos. sep. stram. sulf. tabac. tart. mgs. — C'est surtout après : *Ars. ipsc. lach. petr. phos. et sulf.*, que la noix vomique fera du bien, lorsqu'elle se trouvera indiquée. — Après la noix vomique, on trouvera souvent convenables : *Bryon. puls. sulf.*

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — *Souffrances par l'abus du café, du vin, ou d'autres boissons spiritueuses ou drogues narcotiques; Suites fâcheuses d'un refroidissement, d'une colère, ou d'un excès d'étude, ou de veilles prolongées, ou d'une vie sédentaire; Affections principalement des personnes d'un tempérament vif, colérique ou sanguin, aux yeux et aux cheveux noirs, teint pâle ou jaunâtre ou vivement coloré; Constitution bilieuse, sèche et maigre, ou pléthorique et forte, ou lymphatique, faible et épuisée, ou constitution veineuse, avec disposition aux hémorroïdes, à l'hypochondrie, à l'hystérie et à la mélancolie; Affections périodiques et intermittentes; Souffrances et douleurs dans les membres par un temps rude et tempétueux; Affections rhumatismales; Prodromes et métastases arthritiques; Congestions sanguines à la tête, à la poitrine, ou au ventre; Faiblesse physique et nerveuse par suite d'onanisme, de pollutions ou autres pertes débilitantes; Accès d'évanouissement et de faiblesse hystérique ou hypochondriaque; Atrophie des enfants scrofuleux; Faiblesse musculaire et difficulté d'apprendre à marcher, chez les enfants?; Affections des glandes et des vaisseaux lymphatiques; Accès de convulsions, d'épilepsie, de tétanos et de danse de Saint-Guy; Paralysies, principalement des extrémités inférieures; Souffrances chlorotiques, ou ictériques: Furoncles; Engelures; Ecchymoses; Éruptions miliaires; Affections à la suite des morbilles, telles que miliaire blanche, toux catarrhale, etc., etc.; Fièvres inflammatoires avec affections gastriques, muqueuses ou bilieuses; Fièvres quotidiennes tierces et quarts; Fièvres typhoïdes; Fièvres lentes; Aliénation mentale des ivrognes; Affections morales par excès d'étude, ou par suite d'une humiliation ou d'une colère; Manie; Mélancolies hypochondriaques et hystériques; Congestion cérébrale avec vertiges; Apoplexie sanguine; Céphalalgie catarrhale, congestive, nerveuse, ou hystérique; Migraines; Maux de tête par l'abus du café, ou de boissons spiritueuses, par des études forcées, ou par un temps âpre et venteux; Ophthalmies catarrhales, ou scrofuleuses (ou arthritiques?); Photophobie scrofuleuse; Hémorrhagie des yeux; Coryza dans la période inflammatoire; Otalgie inflammatoire; Prosopalgie et odontalgies rhumatismales avec fluxion; Odontalgie par l'abus du café; Dentition difficile des en-*

fants, avec fièvre; *Stomacace*; Angine scarlatine; *Angine catarrhale*; Angine pharyngée, uvulaire et tonsillaire; *Gastralgie*; Gastrite; *Affections gastrico-muqueuses ou bilieuses*; *Dyspepsie même avec vomissement des aliments*; Vomissement des ivrognes, des femmes enceintes, etc., etc.; Rétrécissement et squirrhe du cardia?; Choléra?; Douleurs hépatiques?; *Hépatite*; Engorgement et dureté du foie et de la rate, même par l'abus du quinquina; Carreau; Congestions abdominales et stagnation dans le système de la veine porte; Coliques spasmodiques, flatulentes et hémorrhoidales; Hernies ombilicales et crurales?; *Hernies incarcerationnées*; Hernies inguinales; Péritonite; *Constipation opiniâtre*, principalement par suite d'une *vie sédentaire* ou par l'abus du café; Diarrhées muqueuses et sanguinolentes; Dysenterie; Rétrécissements spasmodiques de l'anus et de l'urèthre; *Hémorrhoides aveugles et saignantes*; Ischurie et strangurie spasmodiques, ou par suite de la gravelle; Catarrhe de la vessie; Gonorrhée bâtarde; Orchite; Inflammation du cordon spermatique; Satyriasis?; *Coliques menstruelles avec règles trop hâtives*; Suppression des lochies; Aménorrhée?; Flueurs blanches; Chute de la matrice et du vagin; Céphalalgie; Odontalgie, nausées, vomissement, coliques, constipation et autres *souffrances des femmes enceintes*; Métrite?; Douleurs d'enfantement ou tranchées trop violentes; Abortus; *Péritonite puerpérale*; Excoriation des mamelles; Ophthalmie, catarrhe nasal, hernies, constipation, convulsions et autres *souffrances des nouveau-nés*; Catarrhe inflammatoire des voies aériennes, avec toux, Grippe; Coqueluche?; Toux convulsive; Bronchite; *Pleurésie*?; Asthmes spasmodiques, flatulents et congestifs; Maux de reins; Sciatique; Gonite arthritique, etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — **Douleurs lancinantes*, ébranlantes, ou *douleurs tressaillantes*, déchirantes et tractives, avec sensation de torpeur et de faiblesse paralytique des parties affectées. — Douleurs qui paraissent tellement insupportables qu'on aimerait mieux s'ôter la vie. — **Douleurs de meurtrissure dans les membres et dans les articulations*, le plus souvent le matin au lit, et pendant ou après le mouvement. — **Tension et roideur*, engourdissement et torpeur, lourdeur, lassitude et paralysie des membres. — Tremblement des membres. — Palpitation des muscles, ou sensation comme si quelque chose y remuait. — Immobilité des articulations. — Contractions crampiformes de plusieurs parties. — **Accès de convulsions*, de crampes, de tétanos et autres spasmes, quelquefois avec cris, renversement de la tête, trem-

blement des membres, évacuation involontaire des selles et des urines, vomissement, sueur abondante, soif et respiration râlante. — *Toute émotion fâcheuse renouvelle les accès épileptiques. — Les accès de chorée sont suivis d'une sensation de torpeur et d'engourdissement dans les parties affectées. — **Accès de mal-aise*, principalement après le dîner, le soir ou la nuit, et quelquefois *avec nausées qui remontent du creux de l'estomac, anxiété, faiblesse et tremblement des membres, chaleur passagère et pâleur du visage*, tintement dans les oreilles, douleurs au creux de l'estomac, fourmillement aux pieds et aux mains, et besoin de se coucher. — **Accès de défaillance* après le moindre effort, principalement *après la promenade au grand air*, et quelquefois *avec vertiges*, étourdissement, scintillement, noirceur devant les yeux et bouillonnement du sang. — **Grande lassitude et fatigue*, même *le matin* en se réveillant, ou après s'être levé, et *grand épuisement après la moindre promenade au grand air*. — *Chute rapide et générale des forces et *grande faiblesse des muscles*, avec marche vacillante et prostration. — **Surexcitation de tout le système nerveux* avec *trop grande impressionnabilité de tous les organes*, principalement de la vue et de l'ouïe. — **Sensibilité excessive et répugnance pour le grand air* et le courant d'air, avec disposition à se refroidir facilement. — **Lourdeur du corps, paresse et horreur de tout mouvement*, avec *grand besoin de rester couché* ou assis, positions dans lesquelles presque toutes les douleurs sont soulagées. — *Les souffrances qui ont apparu pendant le repos dans l'appartement, s'améliorent par la promenade au grand air, et *vice versa*. — *Le café, le vin, la fumée du tabac, la méditation et les veilles, ainsi qu'un temps venteux, provoquent ou aggravent aussi beaucoup de souffrances. — **Le matin, au lever*, ou le soir vers les 8 ou 9 heures, ainsi qu'*après le dîner*, on se trouve ordinairement le plus mal, et bien des souffrances apparaissent *périodiquement* à l'une ou à l'autre de ces époques. — **Amaigrissement du corps*.

PEAU. — *Couleur pâle ou jaunâtre de la peau. — **Jaunisse*, avec dégoût des aliments et accès d'évanouissement. — **Peau froide et bleuâtre* pendant les frissons. — Prurit picotant et brûlant, le matin ou le soir, en se déshabillant, et même là nuit. — Sensibilité et douleur d'excoriation sur toute la peau, avec sensation de torpeur à l'endroit que l'on touche. — Éruptions d'un prurit brûlant. — *Engelures avec prurit brûlant; **gerçures saignantes et gonflement d'un rouge pâle*. — **Furones*. — **Taches bleuâtres*, comme par des sugillations après une contusion. — **Ulcères à bords élevés de couleur rouge pâle*. — Éruptions miliaires et boutonneuses, avec prurit brûlant.

SOMMEIL. — **Grande envie de dormir, principalement le matin, en se levant, ou après le dîner, ou le soir de bonne heure, et souvent avec insomnie la nuit.* — Sommeil du matin excessivement doux et prolongé, avec réveil difficile. — **Sommeil trop court avec difficulté de s'endormir avant minuit, et impossibilité de rester au lit après 3 heures du matin.* — **Le soir au lit, grande affluence d'idées, empêchant souvent de dormir jusqu'au matin.* — **État comateux avec sommeil lourd et profond pendant le jour.* — **Sommeil nocturne, léger, avec réveil fréquent, ou comme une espèce de coma vigil, avec réveilleries pleines de trouble et d'agitation, et sorte d'ennui, comme si la nuit était trop longue.* — **Pendant le sommeil, sursauts fréquents avec effroi, gémissements, lamentations, beaucoup de paroles, pleurs, délires, avec envie de s'enfuir de son lit, respiration ronflante ou sibilante, et coucher sur le dos, les bras levés sur la tête.* — **Rêves continuels, fantastiques, terribles et anxieux, ou voluptueux, pleins de cruautés et d'horreurs, ou de méditations et de soucis; rêves de vermine, de corps mutilés, de la chute des dents, des occupations de la journée et d'affaires urgentes.* — La nuit, agitation dans les cuisines, anxiété et inquiétude, chaleur et ébullition de sang. — *Au réveil, le matin, douleur de meurtrissure dans les membres, grande lassitude avec besoin de rester couché, et accès de pandiculations et de bâillements convulsifs.* — Cauchemar.

FIÈVRE. — **Frissonnement, horripilation et froid, principalement la nuit, ou le soir après s'être couché, ou le matin, ou au grand air, ou au moindre mouvement, même pendant la chaleur, ainsi qu'après avoir bu, après s'être fâché, et en se découvrant.* — **Froid, frissons et horripilations partielles, principalement au dos et aux extrémités.* — **Pendant les frissons, peau, mains et pieds, visage ou ongles froids et bleutés; ou douleur, congestion de sang et chaleur à la tête, avec rougeur et chaleur du visage ou (de l'une) des joues; soif de bière; contraction crampoïde des pieds et des orteils; ou élancements dans le côté et dans le ventre, douleurs au dos et aux reins, tiraillement dans les membres, pandiculations, bâillements spasmodiques et besoin de se coucher.* — **Chaleur principalement la nuit, ou vers le matin ou en se promenant au grand air, et quelquefois seulement à la tête ou au visage, avec rougeur des joues, ou aux pieds et aux mains, avec froid partiel ou horripilations et frissons au reste du corps.* — **Pendant la chaleur, vertige, mal à la tête, frissons pour peu qu'on se remue ou qu'on se découvre, soif, ou répugnance pour les boissons, avec sécheresse de la bouche, nausées, vomissements, bourdonnements des oreilles, urines rouges, douleurs à la poitrine.* — **Accès fébriles, surtout le matin ou le soir, ou la*

nuit, et composés pour la plupart de *frissons avec chaleur partielle* (suivie de sueur), ou de *chaleur précédée, suivie ou mêlée de frissons*, ou de chaleur alternant avec des frissons avec *soif continuelle de bière*, quelquefois même avant les frissons et après la chaleur; type quotidien ou *tierce*. — ° *Accès fébriles avec congestion et douleurs à la tête et souffrances gastrico-muqueuses ou bilieuses*, ou avec perte de connaissance, grande faiblesse et prostration, même déjà au début de l'accès. — * *Pouls plein et fréquent*, ou petit, accéléré ou faible, ou intermittent. — *Sueurs abondantes*, quelquefois fétides, ou acides, ou d'une odeur de moisi; sueurs froides et visqueuses; *sueurs partielles ou semi-latérales*, principalement à la tête et aux parties supérieures du corps; *sueurs nocturnes*, principalement après minuit ou vers le matin; sueurs pendant le mouvement au grand air; sueurs alternant avec des frissons, ou suivies de chaleurs et de soif de bière. — Pendant les sueurs, quelquefois rémission des douleurs, ou endolorissement des parties sur lesquelles on est couché, horripilations ou coliques pour peu qu'on se découvre, envie de vomir, chaleur au visage et aux mains, sécheresse des lèvres et de la partie antérieure de la bouche.

MORAL. — * *Humeur hypochondriaque et chagrine*, morose, soucieuse et triste, quelquefois avec envie de pleurer, sans le pouvoir. — * *Mélancolie*, avec *grande inquiétude sur son état, besoin de parler de sa maladie*, désespoir de la guérison, et *crainte d'une mort prochaine*. — Désir de la solitude, du repos et de la tranquillité, avec répugnance pour la conversation. — * *Angoisse, anxiété et inquiétude excessives*, souvent avec agitation qui ne permet de rester nulle part, comme si on avait commis un crime, et qui pousse jusqu'au suicide. — * *Les accès d'angoisse ont lieu le plus souvent le soir en se couchant, ou après minuit, vers le matin, et sont quelquefois accompagnés de battements de cœur, chaleur et sueur, nausées et vomissements, pupilles dilatées et serrement de cœur*. — * *Exaltation et surexcitation morale*, avec *impressionnabilité extrême de tous les organes*, sensibilité excessive à la moindre douleur, au moindre bruit ou mouvement, *facilité extraordinaire à s'effrayer*, et grande sentimentalité qui fait que même par la musique on est touché jusqu'aux larmes. — * *Exaspération inconsolable et lamentations, plaintes et cris* (pendant les souffrances), quelquefois avec chaleur et rougeur des joues. — Caractère craintif, méfiant et soupçonneux, avec *incertitude et indécision*. — * *Humeur pleureuse* avec grande susceptibilité et irritabilité, *disposition à se fâcher et à s'emporter facilement, envie de critiquer et de faire des reproches*. — * *Humeur acariâtre, méchanceté, querelles, injures et invectives*, avec paroles

impudiques pleines de jalousie, mêlées de pleurs et de cris. — **Mauvaise humeur, dépit et colère*, jusqu'à se porter à des violences. — Maladresse et gaucherie. — **Ennui, avec déplaisir et inaptitude à tout travail de corps et d'esprit*. — **Incapacité de méditer*; disposition à se tromper en parlant, difficulté de trouver des expressions convenables; erreur sur les poids et les mesures; confusions fréquentes en écrivant, avec omission de syllabes et de mots entiers. — **Divagations et actions maniaques, visions effrayantes, perte de connaissance et délires quelquefois avec murmures*.

TÊTE. — **Tête entreprise et embarrassée avec obnubilation, comme après une débauche, principalement au grand air et au soleil.* — **Ivresse, stupeur et étourdissements.* — **Vertiges avec sensation de tournoyement et de vacillement du cerveau, principalement pendant ou après le repas, ainsi qu'en marchant et en se promenant au grand air, en éternuant, en toussant, en se baissant, ou en se redressant, le matin ou le soir au lit, en étant couché sur le dos, et souvent avec obscurcissement des yeux, péril de tomber, chancellement, accès d'évanouissement, bourdonnement des oreilles et perte de connaissance.* — **Congestion de sang à la tête, avec bourdonnement des oreilles.* — **Perte de connaissance avec état de coma somnolent, et paralysie de la mâchoire inférieure, des organes de la déglutition et des extrémités.* — **Pesanteur, pression et sensation d'expansion dans la tête, comme si le front allait éclater, principalement au-dessus des yeux.* — **Douleur de meurtrissure dans le cerveau.* — **Douleurs déchirantes et tractives, ou tressaillantes dans la tête, ou élancements, ou coups et douleurs pulsatives, ou fouillement et sensation comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, ou tension et serrement, ou douleur d'ulcération.* — *Secousses et résonnement dans le cerveau à chaque pas.* — **Les maux de tête sont souvent profondément dans le cerveau, ou à l'occiput, ou d'un seul côté, ou dans le front jusqu'aux yeux et à la racine du nez; ils apparaissent principalement le matin après le réveil ou le lever, ou après le repas ou au grand air, ou périodiquement tous les jours à la même heure, et ils s'aggravent ou se renouvellent par les travaux de tête et toute méditation, par le vin, le café, un temps âpre et chaud, en marchant et en se baissant, ou en remuant la tête.* — **Maux de tête avec inaptitude à la méditation, ou avec perte de connaissance et délires, ou avec nausées, rapports et vomissements, ou avec chaleur et rougeur des joues, et frissons au reste du corps, ou avec fatigue, lassitude et grand besoin de se coucher.* — *Renversement de la tête en arrière, pendant les convulsions.* — **Endolorissement du cuir chevelu, et de la racine des cheveux avec*

grande sensibilité au toucher. — Douleur d'excoriation au cuir chevelu, par un vent âpre. — Petites tumeurs douloureuses au front. — Sueur visqueuse au front en se promenant au grand air. — Sueur semi-latérale à la tête, pendant les douleurs semi-latérales.

YEUX. — *Yeux cernés et larmoyants. — *Douleurs pressives et tensives dans les yeux, *principalement en les ouvrant et en regardant le jour. — *Douleurs déchirantes nocturnes dans les yeux, ou douleur *brûlante*, cuisson, sensation et sécheresse, *prurit et démangeaison* comme par du sel, principalement dans les angles. — Douleur de meurtrissure dans l'œil. — *Yeux *enflammés*, avec rougeur et gonflement de la sclérotique, ou de la conjonctive. — *Couleur jaune de la sclérotique, principalement à la partie inférieure des globes. — *Ecchymose de la sclérotique, et *suintement sanguinolent des yeux*. — *Angles des yeux rouges et pleins de chassie, avec agglutination nocturne. — Pupilles dilatées ou contractées. — *Prurit brûlant ou douleurs vives, tractives, ou sensation d'excoriation aux paupières et aux bords, principalement le matin, et en y touchant. — *Gonflement et rougeur des paupières. — Contraction des paupières, comme par une pesanteur. — Yeux fixes, brillants. — *Sensibilité excessive des yeux à la lumière du jour, principalement le matin. — Scintillement ou points noirs et grisâtres devant les yeux. — Presbyopie. — Obscurcissement amaurotique des yeux. — Sensation comme si tous les objets étaient plus éclairés qu'ils ne le sont réellement. — Étincelles comme des éclairs devant les yeux.

OREILLES. — Serrement dans l'oreille, principalement en mâchant et en serrant les dents. — Fourmillement et prurit dans les oreilles, surtout la nuit. — *Coups et élancements aigus et douloureux dans les oreilles, qui forcent à crier, principalement le matin au lit. — En avalant, douleur à l'oreille, comme si elle était pressée en dehors. — Sibilement, sifflement, *bourdonnement et tintement dans les oreilles, ou craquement en mâchant. — Les paroles résonnent fortement dans les oreilles de la personne qui les prononce. — Gonflement des parotides.

NEZ. — Prurit insupportable au nez. — Douleur d'excoriation ou d'ulcération dans les narines. — *Obturation du nez, quelquefois d'un seul côté, et souvent avec prurit dans les narines et écoulement de mucosités. — *Enchifrènement, principalement le matin ou la nuit, et coryza sec, avec chaleur et pesanteur au front et obturation des narines. — *Coryza fluent le jour ou le matin, avec sécheresse et obturation nocturne du nez. — Grattement dans le nez et la gorge, chaleur dans les narines et éternument fréquent pendant le coryza. — Mucosités sanguinolentes dans le nez. — Saignement

de nez, et sortie de caillots de sang par les narines. — Exhalaison fétide par le nez. — *Grande sensibilité de l'odorat. — Odeur devant le nez, comme du soufre brûlé, du fromage pourri, ou de la mouchure de chandelle.

VISAGE. — °Aspect maladif, avec yeux cernés et nez pointu. — **Visage pâle, jaundtre* (surtout autour du nez et de la bouche) et *terreux*. — **Chaleur et rougeur du visage* ou (de l'une) *des joues*, °alternant quelquefois avec pâleur. — Sueur froide au visage. — Palpitations musculaires, le soir au lit, ou fourmillement pruriant au visage. — **Douleurs déchirantes et tractives dans le visage*, °quelquefois *seulement d'un côté jusque dans l'oreille*, avec gonflement de la joue. — Tension autour de la bouche, du nez et des yeux, avec enflure de ces parties. — **Gonflement du visage*, quelquefois *seulement d'un côté*, et avec couleur pâle de la tumeur. — Petits boutons purulents aux joues et à la tête. — **Sécheresse*, gerçure et exfoliation douloureuse des lèvres. — *Croûtes et ulcérations à la partie rouge des lèvres* et aux coins de la bouche. — Petits boutons purulents autour des lèvres et au menton. — Sensation d'excoriation et petits ulcères à la surface intérieure des lèvres. — Éruption dartreuse au menton. — Distorsion de la bouche. — *Serrement spasmodique des mâchoires*. Élançement dans les glandes sous-maxillaires en avalant.

DENTS. — **Douleurs d'excoriation* ou d'ulcération, ou douleurs tractives *tressaillantes*, avec élançements, ou fouillement et térébration *dans les dents et dans les mâchoires*, ou seulement dans les dents cariées; principalement *la nuit*, ou *le matin* au réveil, ou *après le dîner*, ou *en se promenant au grand air*, ou en inspirant l'air frais, ou le soir, ou en méditant et par un travail intellectuel; souvent *jusque dans la tête, les oreilles et les pommettes*, ou avec engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires, *gonflement et endolorissement des gencives, taches rouges et chaudes aux joues et au cou*, humeur plaintive et découragement. — °Les maux de dents n'occupent souvent qu'un seul côté; ils s'aggravent quelquefois à la chaleur de la chambre et s'améliorent au grand air. — **Les boissons et les soupes chaudes*, ainsi que *l'eau froide*, °le vin et le café, renouvellent ou aggravent également les maux de dents. — Vacillement et chute des dents. — **Gonflement putride et douloureux des gencives*, quelquefois avec pulsation comme dans un abcès, brûlement, tiraillements et *saignement facile*. — **Ulcère aux gencives*.

BOUCHE. — **Odeur fétide*, °putride et cadavéreuse, de la bouche, principalement *après le repas et le matin à jeun*. — Grande sécheresse, principalement de la *partie antérieure de la bouche et de la langue*, surtout après minuit. — Douleur dans la bouche, à la

langue et au palais, comme si tout était à vif et excorié. — *Accumulation de mucosités d'un blanc jaunâtre, dans la bouche. — *Ulcères d'une odeur fétide, *boutons et vésicules douloureuses dans la bouche, à la langue et au palais. — *Gonflement inflammatoire du palais. — *Accumulation d'eau dans la bouche; salivation nocturne; salive sanguinolente; crachement de sang. — *Langue chargée d'un enduit blanc, *épais, ou jaunâtre; ou langue sèche, gercée, brunâtre ou noirâtre. avec rougeur vive des bords. — *Grande pesanteur de la langue, avec difficulté de parler, et sensation, en parlant, comme si la langue s'épaississait. — *Parole balbutiante.

GORGE. — *Grattement et douleur d'excoriation dans la gorge, principalement en avalant et en inspirant l'air frais. — Sensation de gonflement au palais, et *douleur en avalant à vide, comme s'il y avait une tumeur ou un tampon dans la gorge, ou comme si le pharynx était rétréci. — Élançements dans la gorge, principalement en avalant, et quelquefois jusqu'aux oreilles. — *Gonflement de la luette et des tonsilles, *avec douleurs pressives et lancinantes. — *Étranglement et contraction spasmodique dans la gorge. — Brûlement dans la gorge, principalement la nuit, et quelquefois jusque dans la bouche et l'œsophage.

APPÉTIT. — Goût de bouche salé, soufré, douceâtre, métallique, herbacé, ou muqueux. — *Goût acide de la bouche, principalement le matin, ou après avoir ingéré des aliments. — *Goût acide des aliments, et principalement du pain (de seigle ou de froment) et du lait. — *Goût putride, principalement le matin. — Goût amer de la bouche, des crachats, des aliments et principalement du pain. — Insipidité des aliments, principalement du lait, de la viande, du café et du tabac. — *Manque d'appétit et dégoût des aliments, principalement du pain de seigle, du tabac et du café, et quelquefois avec soif continue. — *Soif, quelquefois avec dégoût de toutes les boissons, principalement du lait et de la bière, ou avec désir de la bière ou du lait. — *Désir d'eau-de-vie ou de craie. — Faim, quelquefois avec dégoût des aliments, ou prompte satiété. — Boulimie périodique après midi. — *Pendant le repas, chaleur à la tête, sueur au front, nausée et accès de défaillance. — *Après le repas, rapports et régurgitations, nausées, envie de vomir et vomissements des aliments, pressions et douleurs crampeuses dans l'estomac, ballonnement pressif à l'épigastre, coliques, pyrosis, tête entreprise et douloureuse, malaise et humeur hypochondriaque, anxiété, vertiges, et accès de défaillance, froid et frissons avec chaleur à la tête et au visage et rougeur des joues, fatigue et envie de dormir. — Les boissons gênent l'estomac et causent souvent des nausées, avec

envie de vomir. — *Le pain de seigle et les acides causent également des souffrances; mais les aliments les plus gras sont quelquefois bien supportés.

ESTOMAC. — Envie inutile d'expulser des renvois, avec sensation douloureuse de contraction spasmodique de l'œsophage. — **Rapports et régurgitations fréquentes et souvent amères et acides.*

— **Hoquet fréquent et violent.* — **Pyrosis*, principalement après avoir pris des acides ou des aliments gras. — **Nausées et envie de vomir* continuelles, principalement le matin, ou pendant le repas, ou après avoir bu ou mangé. — Écoulement d'eau de l'estomac. — **Vomituration et vomissements violents de matières muqueuses et aigres ou des aliments, ou de matières insipides, ou de bile*, *principalement après avoir bu ou mangé, ou le matin, ou même la nuit, et souvent avec mal à la tête, crampes aux jambes et aux pieds, anxiété et tremblement des membres. — **Régurgitation et vomissement de sang*, mêlé de caillots et de matières noires, avec tranchées, bouillonnement dans la poitrine, et écoulement d'un sang noir avec les selles dures. — **Pression à l'estomac et à l'épigastre, comme par une pierre*, ou douleurs crampoïdes, contractives, et rongeantes; principalement après avoir bu ou mangé, ou le matin, ou en se promenant au grand air, ou après avoir pris du café, ou la nuit, et souvent avec tension et ballonnement de l'épigastre, oppression et constriction de la poitrine, rapports, vomituration et vomissements. — **Douleurs de meurtrissure, pulsation, douleur brûlante, sensation d'excoriation et douleurs pénibles à l'estomac.* — **Sensibilité douloureuse du creux de l'estomac au toucher et à toute pression*; les vêtements serrés sont insupportables. — **Grande anxiété dans la région précordiale, comme si le cœur allait éclater.* — **Sensation au cardia, comme si les aliments s'y arrêtaient et remontaient dans l'œsophage.*

VENTRE. — Douleur contractive aux hypochondres. — *Sensibilité douloureuse de la région hépatique à tout contact et à tout mouvement, avec douleurs pulsatives, lancinantes, pressives et tensives.* — Gonflement et dureté de la région hépatique. — **Pression, tension, et plénitude et ballonnement du ventre*, et surtout de l'épigastre, principalement après le repas. — **Coliques, avec douleurs crampoïdes, contractives et compressives, ou tranchées et élancements, ou douleurs vives et tractives, dans la région ombilicale, dans les côtés et dans le bas-ventre, principalement après le repas, ou après avoir pris du café, ou le matin, et souvent avec envie de vomir, rapports, chaleur du visage, lassitude et envie de dormir.* — Mal de ventre au grand air, comme par un refroidissement, avec sensation, comme si

une diarrhée allait se déclarer. — *Sensation de pesanteur et de gonflement dans le ventre. — *Chaleur et brûlement, ou *sensation d'excoriation, comme si tout était à vif*, ou douleur de meurtrissure dans le ventre. — *Congestion de sang et bouillonnement dans le ventre. — *Mouvement dans le ventre, comme par quelque chose de vivant, et commotion des intestins en marchant. — *Coliques flatulentes, quelquefois le matin, mais principalement après avoir bu ou mangé, et souvent avec douleurs pressives, comme par des pierres, affluence de flatuosités qui s'incarcèrent dans les hypochondres ou remontent vers la poitrine, borborygmes fréquents et grondement dans le ventre, pression sur l'anus, le périnée et les voies urinaires, maux de reins, ballonnement du ventre, anxiété, fatigue et besoin de se coucher. — *Douleur de meurtrissure dans les téguments du ventre, principalement en toussant, en riant, etc., etc., avec sensibilité douloureuse au toucher. — Palpitation des muscles abdominaux, avec sensation comme si quelque chose y courait. — *Sensation de faiblesse dans l'anneau inguinal, comme s'il allait sortir une hernie. — Gonflement des glandes inguinales. — Excoriation dans le pli de l'aîne.

SELLES. — *Envie fréquente, mais inutile et anxieuse, d'aller à la selle, avec sensation comme si l'anus était rétréci ou fermé. — *Constipation opiniâtre, souvent comme par inactivité ou par étranglement des intestins, avec selles dures, difficiles et trop volumineuses. — *Évacuations incomplètes, avec coliques et sensation de constriction du rectum. — *Alternation de constipation et de selles diarrhéiques. — Selles moitié molles ou liquides, moitié dures avec beaucoup de vents. — *Petites selles diarrhéiques aqueuses, ou muqueuses et sanguinolentes, avec coliques et tranchées, maux de reins et téneisme, douleur d'excoriation dans le rectum et douleur brûlante à l'anus. — *Selles muqueuses blanchâtres, ou verdâtres, couleur foncée. — *Sortie de glaires et de mucosités sanguinolentes, ou de sang pur, même avec les selles non diarrhéiques. — Douleur contractive dans le rectum pendant et hors le temps des selles. — *Constriction et rétrécissement spasmodique du rectum. — *Gonflement et occlusion de l'anus. — *Hémorroïdes, avec douleur d'excoriation, élancement, douleur brûlante et pression à l'anus et dans le rectum, principalement en méditant et pendant un travail de tête. — Écoulement de sang par l'anus. — Prurit, chatouillement et fourmillement dans l'anus et le rectum, comme par des ascarides. — Sortie d'ascarides. — Pression et prurit au périnée.

URINES. — *Envie inutile d'uriner, avec pression sur les voies urinaires, douleurs pénibles au col de la vessie, et *émission dou-

loureuse des urines, goutte à goutte. — °Rétrécissement spasmodique de l'urèthre. — *Évacuation douloureuse d'urines épaisses. — *Évacuations fréquentes d'urines aqueuses et pâles, quelquefois avec sortie de mucosités épaisses ou de matières purulentes, par l'urèthre. — °Urines rougeâtres avec dépôt couleur de brique. — °Douleurs dans la région rénale, comme s'il y avait un corps étranger, avec impossibilité d'être couché sur le côté malade, *émission rare de quelques gouttes d'une urine saturée, et sortie de sang par l'urèthre. — *En urinant, douleur brûlante au col de la vessie et à la partie antérieure de l'urèthre. — Prurit et douleur d'excoriation dans l'urèthre, avant, pendant et après l'émission des urines.

PARTIES VIRILES. — *Démangeaison et prurit au gland et à la surface intérieure du prépuce. — *Excoriation et rétraction du prépuce. — °Sécrétion abondante du smegma, derrière le gland. — Prurit, élancements et douleur constrictive dans les testicules. — *Appétit vénérien exalté, avec érections et pollutions fréquentes, principalement le matin. — Pollutions avec flaccidité de la verge, et quelquefois suivies de froid et de faiblesse dans les extrémités inférieures. — Après le coït, chaleur sèche du corps et sécheresse de la bouche. — °Gonflement inflammatoire des testicules, avec sensibilité douloureuse au toucher, dureté et rétraction des testicules. — °Douleur crampoïde et sensation d'étranglement dans le cordon spermatique. — Flaccidité de la verge, pendant le coït.

RÈGLES. — °Gonflement de la matrice avec grande sensibilité au toucher. — *Chute du vagin ou de la matrice. — °Douleurs crampoïdes et contractives dans la matrice et le bas-ventre, jusqu'aux cuisses, avec pression douloureuse vers les parties (et écoulement de mucosités). — *Chaleur brûlante dans les parties, avec désirs vénériens. — *Extase érotique facile et à la moindre excitation, principalement le matin au lit. — *Règles trop hâtives et trop peu abondantes. — Retour des règles à l'époque de la pleine lune. — *Pendant les règles, coliques spasmodiques, nausées et accès d'évanouissement le matin, grande fatigue, céphalalgie avec frissons et douleurs rhumatismales dans les membres. — *Écoulement de mucosités jaunâtres et fétides, par le vagin. — *Douleurs d'excoriation aux mamelons.

LARYNX. — *Enrouement catarrhal et âpreté douloureuse du larynx et de la poitrine, principalement le matin, ou le soir au lit, avec grattamento dans la gorge, accumulation de mucosités tenaces qu'il est impossible de détacher, mal à la tête, chaleur et rougeur du visage, frissonnements et constipation. — *Sensation d'étranglement dans le gosier, avec péril de suffocation. — Impossibilité de parler à haute voix. — *Toux sèche, et quelquefois continuelle,

fatigante, *et même *spasmodique*, *excitée le plus souvent par une sensation de *titillation et de prurit*, ou *d'âpreté et de grattement dans la gorge*, apparaissant principalement *le matin* ou *le soir* au lit, ou *la nuit*, surtout après minuit, ou *après le dîner*, ou *périodiquement* tous les deux jours. — *Renouvellement ou provocation de la toux par le *mouvement*, la méditation ou la lecture, et étant couché sur le dos. — *En toussant, élancements et *douleurs d'excoriation au larynx*, mal à la tête comme si le crâne allait éclater, douleur de meurtrissure à l'épigastre, *et quelquefois même avec vomissement, péril de suffocation et saignement par le nez et par la bouche. — En se promenant au grand air, la toux sèche devient humide, et l'expectoration s'établit. — Crachats d'un sang coagulé par la toux.

POITRINE. — *Gêne de la respiration, haleine courte, *constriction asthmatique* et *oppression de la poitrine*, principalement *la nuit*, ou *le matin*, ou *le soir au lit*, en étant couché, ainsi qu'en montant, ou en marchant, ou *après le dîner*, et souvent avec *étouffement*, *anxiété*, pression dans l'épigastre, bourdonnement des oreilles, pouls accéléré et sueur. — *Pendant les accès asthmatiques, tout vêtement serré autour des hypochondres est insupportable. — **Respiration lente* et sibilante, alternant quelquefois avec respiration accélérée. — Haleine fétide et d'une odeur acide. — Besoin de respirer profondément. — *Douleur de constriction et de contraction crampoïde à la poitrine. — **Pression tensive dans la poitrine comme par un poids*, principalement *la nuit* et *au grand air*, et souvent avec gêne de la respiration. — *Élancements dans la poitrine et dans les côtés, augmentés en respirant et par le mouvement du thorax. — Chaleur et brûlement dans la poitrine, quelquefois la nuit, avec agitation, *anxiété* et *insomnie*. — Douleur de meurtrissure à la poitrine, souvent avec haleine courte, et principalement au sternum et dans les côtés. — Pulsation dans la poitrine et dans les côtés. — Élancements et coups dans la région du cœur. — **Battements de cœur*, principalement après le dîner, étant couché, ou le matin, et quelquefois avec nausées et envie de vomir, et sensation de pesanteur à la poitrine.

TRONC. — **Douleurs de meurtrissure dans le dos et aux reins*, avec sensation de faiblesse dans ces parties, comme après l'enfantement. — **Maux de reins nocturnes* qui ne permettent pas de se retourner dans le lit. — Douleur de luxation, ou comme après un tour de reins, dans le dos et dans les omoplates. — **Douleurs rhumatismales, tractives*, et brûlantes, au dos, quelquefois le soir. — *Convulsions dans le dos, avec renversement de la tête. — Élancements et douleur de constriction entre les omoplates. —

Tiraillement, douleur de meurtrissure, roideur, et sensation de pesanteur dans la nuque. — Gonflement des muscles du cou, avec douleur, comme s'ils étaient trop courts.

BRAS. — Douleurs rhumatismales, avec sensation de faiblesse dans les épaules et les bras. — Paresse, lourdeur, fatigue et manque de force dans les bras. — Paralysie du bras, avec insensibilité et sensation comme si le sang y bouillonnait. — *Tiraillement dans les bras, avec *sensation de torpeur et immobilité*, principalement la nuit. — Miliaire pruriente aux bras. — Gonflement des muscles de l'avant-bras, avec douleur, comme s'ils étaient brûlés. — Engourdissement et torpeur des avant-bras, le matin. — Douleur de luxation dans les poignets. — Faiblesse paralytique de la main. — Engourdissement facile des mains et des doigts. — Mains froides et frileuses. — *Sueur forte et quelquefois fraîche à la paume des mains.* — Chaleur à la paume des mains. — Enflure des veines aux mains et aux bras. — Gonflement pâle des mains et des doigts. — *Contraction crampoïde des mains et des doigts*, avec douleur comme si les tendons étaient trop courts, principalement pendant les frissons, ou après minuit. — Gonflement chaud et douloureux du pouce, et qui passe en abcès à l'articulation. — *Rougeur et prurit brûlant aux doigts, comme des engelures.

JAMBES. — Boutons avec prurit rongant à la fesse. — *Élancements, douleur de luxation et tressaillement dans l'articulation coxo-fémorale. — **Douleurs vives et lancinantes dans les cuisses, avec torpeur et faiblesse paralytique*, aggravées par le mouvement et le contact. — *Douleur de brisure aux cuisses.* — Miliaire, avec prurit brûlant et *furoncles aux cuisses* et aux genoux. — Froid, ou sueur, aux cuisses, la nuit. — *Grande pesanteur, chancellement, faiblesse et tremblement des jambes, avec fléchissement des genoux*, et impossibilité de marcher ou de rester debout. — L'enfant tombe facilement en marchant. — **Roideur et tension dans les jarrets, comme si les tendons étaient trop courts*, principalement en se levant de son siège. — Sensation de sécheresse dans l'articulation du genou, avec craquement en le remuant. — °*Gonflement douloureux du genou*, avec nodosités goutteuses. — *Disposition des jambes à s'engourdir facilement.* — °Paralysie, froid et insensibilité des jambes. — Douleur tensive et *crampes dans les mollets*, principalement la nuit; ou le soir, ou après minuit, ou le matin, *au lit.* — Crampes dans les pieds et les orteils. — °Gonflement rouge de la jambe, avec taches noires, douloureuses. — Luxation facile du cou-de-pied. — Gonflement du dos des pieds. — Engourdissement facile des pieds (pieds morts). — Contraction des orteils. — *Prurit brûlant aux orteils comme par des engelures.

162.—OLEANDER.

OLEAND. — Laurier-rose. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 6, 30. — *Durée d'action* : 3 à 4 semaines, dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Camph. cocc. n-vom.

COMPARER AVEC : Anac. chin. cin. cocc. n-vom. puls. sabad.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre : *Paralysies* ; *Dartres aux oreilles* ; *Éruptions à la tête* et sorte de faiblesse intellectuelle se manifestant par la *distrac-tion*.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tension crampôide*, comme si les os étaient brisés, dans les membres et autres parties du corps. — *Grande faiblesse*, qui permet à peine de marcher. — Sensation de vibration et de résonnement dans tout le corps. — Tension dans tout le corps. — Roideur paralytique des membres, et paralysies sans douleurs. — Accès d'évanouissement, comme par faiblesse, quelquefois avec perte de connaissance, se dissipant après avoir transpiré. — Faiblesse et lassitude générale, avec tremblement des genoux, en étant couché, et des mains, en écrivant. — Accablement, comme si la vie allait s'éteindre. — Besoin d'étendre les mains. — Torpeur et insensibilité de tout le corps.

PEAU. — Prurit rongeur qui force à gratter, quelquefois en se déshabillant. — Peau très-sensible, avec rougeur et excoriation pour peu que l'on gratte.

SOMMEIL. — *Bâillement fréquent avec horripilation* et tressaillement des muscles. — Besoin de se coucher, avec une sorte de somnolence. — Insomnie et agitation la nuit. — *Rêves agités et lascifs*, et réveil fréquent.

FIÈVRE. — Accès fréquents d'horripilation subite. — Sensation de chaleur avec frisson général. — Chaleur fugace, surtout pendant un travail intellectuel. — Puls fréquent et plein, ou irrégulier et variable. — Manque de chaleur vitale.

MORAL. — Tristesse et manque de confiance en soi-même. — *Répu-gnance pour le travail*, et grande paresse. — Irrascibilité, morosité, et mauvaise humeur. — Humeur qui ne supporte aucune contradiction. — Emportement colérique, suivi d'un prompt repentir. — Faiblesse de la mémoire. — *Grande distraction et inadvertance*.

— *Étourdissement.* — *Esprit obtus, avec conception difficile.* — *Rêveries poétiques sur l'avenir.*

TÊTE. — *Vertige tournoyant*, avec chancellement des jambes. — *Vertige*, en se levant, après avoir été couché, ou en regardant en bas lorsqu'on est debout. — *Vertige*, avec tournoisement, obscurcissement et scintillement devant les yeux. — *Maux de tête avec étourdissement*, comme si le cerveau était tendu. — *Pesanteur douloureuse de la tête*, soulagée en se couchant. — *Pression sourde dans la tête comme si le front allait éclater.* — *Battement douloureux et pulsatif dans la tête.* — *Térébration dans le cerveau.* — *Pression à l'extérieur de la tête.* — *Prurit rongeur au cuir chevelu*, avec cuisson après s'être gratté. — *Croûtes furfuracées ou humides*, à la tête, avec prurit, surtout la nuit, et brûlement après s'être gratté. — *Desquamation du cuir chevelu.*

YEUX. — *Douleur dans les yeux*, comme après les avoir trop fatigués par la lecture. — *Pression dans les yeux.* — *Douleur brûlante et tension dans les paupières*, surtout en lisant. — *Obscurcissement des yeux*, en regardant de côté.

OREILLES. — *Pression aiguë dans les oreilles.* — *Traction crampoïde à l'oreille.* — *Chant, tintement et roulement dans les oreilles.* — *Taches dartreuses, rouges et râpeuses devant l'oreille*, avec suintement fétide derrière l'oreille.

NEZ. — *Pression étourdissante et sourde*, au nez. — *Prurit autour du nez.*

VISAGE. — *Face pâle, hâve*, avec cercles bleus autour des yeux. — *Pression sourde et engourdisante dans les os de la face*, et surtout dans les pommettes, jusque profondément dans la tête. — *Chaleur des joues, sans rougeur, et vice versa.* — *Pâleur du visage*, alternant avec rougeur foncée. — *Gonflement rouge du visage*, autour des yeux. — *Éruption tuberculeuse à la face et au front.* — *Lèvres brunâtres et sèches.* — *Sensation de torpeur et de gonflement dans la lèvre supérieure.* — *Gonflement autour des commissures des lèvres.*

DENTS. — *Maux de dents pendant la mastication*, avec pression incisive. — *Déchirement et traction dans les dents*, parfois la nuit, mais *seulement au lit*, se dissipant dès qu'on se lève. — *Sensation de vacillement des dents*, avec gencives d'un blanc bleuâtre.

BOUCHE. — *Sécheresse de la bouche*, avec langue chargée d'un enduit blanc. — *Langue rude, sale, blanche*, avec érection des papilles. — *Perte de la parole.* — *Douleur brûlante dans la gorge.*

APPÉTIT. — *Tous les aliments ont un goût trop fade ou insipide.* — *Goût pâteux dans la bouche.* — *Boulimie*, avec tremblement des

main, tant on désire des aliments, souvent avec absence d'appétit. — *Soif*, surtout d'eau froide. — En mangeant avidement, à midi, étourdissement.

ESTOMAC. — Renvois d'odeur putride. — *Renvois à vide, violents*, quelquefois après le repas. — *Nausées avec envie de vomir*, accumulation de salive dans la bouche, suivie de faim violente. — Vomissement des aliments ou de sérosités amères d'un vert jaunâtre. — Sensation de vacuité à l'estomac, avec plénitude du ventre. — Battements et pulsations dans l'épigastre, comme après un fort échauffement.

VENTRE. — Pincements dans le ventre, comme pour une diarrhée. — Élançements et rongement dans le ventre. — Sensation de vide et de faiblesse dans les intestins. — *Gargouillement et borborygmes dans le ventre*, avec émission abondante de vents d'une odeur putride.

SELLES. — Envie d'aller à la selle, sans résultat. — *Selles liquides, molles, jaunes.* — *Évacuation*, presque involontaire, d'une selle non digérée. — Douleur brûlante à l'anus, avant, après et hors le temps des selles.

URINES. — Augmentation de la sécrétion des urines. — Urines brunes, brûlantes, avec sédiment blanchâtre. — Émission d'urine fréquente, surtout après avoir pris du café.

LARYNX. — Toux courte, ébranlante, provoquée par un chatouillement dans le pharynx. — Accumulation de mucosités visqueuses dans la trachée-artère.

POITRINE. — Oppression de poitrine, en étant couché, avec respiration profonde et lente. — Respiration faible. — Douleur gravative et compressive, ou sensation d'un grand vide dans la poitrine. — Lancinations sourdes ou tensives dans la poitrine, sur le sternum et les côtes, surtout en respirant profondément. — Sensation de froid dans la poitrine. — Points au diaphragme. — Tractions au-dessus du cœur, aggravées en se baissant. — *Battements de cœur* violents et quelquefois *anxieux*, avec sensation comme si la poitrine se dilatait.

TRONC. — Douleur dans le dos, comme si l'on s'était donné un tour de reins. — Lancinations tensives, brûlantes et aiguës dans le dos. — Pulsation violente des carotides. — Déchirement dans la nuque, le soir, au lit.

BRAS. — Douleur de luxation dans les bras, en les levant. — *Tressaillement* dans les muscles des bras. — *Tractions cramptoïdes* et déchirement dans les bras et les doigts. — *Pression sourde dans les avant-bras, les mains* et les doigts, comme après un coup ou une meurtrissure. — Veines gonflées aux mains. — Gonflement et roideur des doigts, avec douleur brûlante.

JAMBES. — Douleur de foulure dans les fesses. — *Sensation de faiblesse dans les cuisses, les jambes, les pieds, et la plante des pieds*, comme si ces parties étaient engourdies. — *Pression sourde et quelquefois lancinante dans les cuisses, les pieds et les orteils.* — *°Paralysie des jambes et des pieds.* — Sensation de vibration et de résonnement dans les jambes et les pieds, surtout dans la plante des pieds. — Traction crampoïde dans les jambes et les pieds. — Crampes dans les mollets, en étant assis. — Froid continuels aux pieds.

163.—OLEUM ANIMALE.

OL-AN. — Huile animale de Dippel, purifiée. — HARTLAUB ET TRINKA. — *Doses usitées* : 18, 24, 30.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions crampoïdes à diverses parties.* — Traction et déchirement dans les membres. — Fourmillement à diverses parties. — Tension dans quelques membres, comme si les tendons étaient trop courts. — *Roideur et faiblesse paralytique dans les membres*, avec accablement et tremblement. — Accès d'évanouissement. — Marche mal assurée.

PEAU. — Fort prurit général et à diverses parties de la peau, quelquefois cuisant ou brûlant. — Vésicules ressemblant aux boutons de gale. — Excoriation dans les articulations.

SOMMEIL. — *Forté envie de dormir, le jour, avec bâillement et pandiculations fréquentes*, surtout après le dîner. — Sommeil prolongé, le matin. — *Sommeil tardif, le soir.* — Réveil fréquent ou de très-bon matin, sans que l'on puisse se rendormir. — Sommeil très-léger, troublé par le moindre bruit.

FIÈVRE. — *Frisson, horripilation et froid*, fréquemment accompagnés de chaleur à d'autres parties, ou alternant avec chaleur. — Augmentation de la chaleur naturelle, surtout après une promenade en plein air. — Chaleur sèche, le soir. — Chaleur fugace, souvent avec sueur à la tête, à la poitrine et aux mains. — Accès de sueur passagère, surtout pendant le repos.

MORAL. — *Tristesse*; on est concentré en soi-même. — Distraction et absence d'esprit fréquentes. — Perte des idées.

TÊTE. — Tête entreprise, avec obnubilation comme si on était étourdi. — Étourdissement et vertige, en se baissant. — Sensation de torpeur et paralysie d'un seul côté de la tête. — *Pression dans la tête*, et principalement dans le front, quelquefois par le moindre travail de tête. — Traction et déchirement dans la tête, comme

après un refroidissement. — Térébration violente, et élancements dans la tête, surtout immédiatement au-dessus des yeux. — *Congestion*, avec chaleur et battement dans la tête. — Déchirement à l'extérieur de la tête, avec tension et sensation d'excoriation. — Prurit et douleur brûlante, lancinante, au cuir chevelu.

YEUX. — Douleur dans les yeux, comme si un grain de sable s'y était introduit. — Pression et traction dans le globe des yeux. — *Prurit, cuisson et élancements dans les yeux*, se dissipant par le frottement. — Douleur brûlante dans les yeux, surtout le soir, aux lumières. — Larmolement des yeux et agglutination nocturne. — *Frémissement et tressaillement dans les paupières* et les sourcils. — *Vue trouble*. — Myopie. — Nuages sombres devant les yeux.

OREILLES. — Élancements dans les oreilles. — Térébration et déchirement dans les oreilles. — Chant, tintement et bourdonnement dans les oreilles, augmentés par le bruit.

NEZ. — Chatouillement et fourmillement pruriant dans le nez. — Excoriation de l'intérieur du nez. — Boutons brûlants et suintants à la cloison du nez. — Éternument avec sensation douloureuse d'expansion et d'excoriation dans la poitrine. — Sécheresse du nez. — Coryza avec mucosités épaisses dans le nez, qui occasionnent une tension douloureuse. — Violent coryza sec.

VISAGE. — Teint pâle, terreux. — Fourmillement dans le visage. — Douleur brûlante dans les joues et aux pommettes. — *Tension et traction crampôide et paralytique, à la face*, quelquefois d'un seul côté. — Lèvres gercées. — Tressaillement des lèvres, le matin, en dormant. — Crampe de la mâchoire, qui permet à peine d'ouvrir la bouche.

DENTS. — *Odontalgie, avec douleur tractive ou déchirante*, souvent partant de l'oreille. — Déchirement tressaillant et pulsation dans la racine d'une dent cariée, avec sensation de froid au bout des dents.

BOUCHE ET GORGE. — Sécheresse de la bouche, le matin, au réveil. — *Accumulation abondante de salive blanche dans la bouche*. — Cuisson et sensation brûlante sur la langue. — Mal de gorge, comme si un corps dur s'y était introduit, surtout pendant la déglutition. — Vomiturition, constriction, *sécheresse et grattement dans la gorge*. — Douleur brûlante dans la gorge. — *Accumulation de mucosités visqueuses dans la gorge*.

APPÉTIT. — Goût gras et pâteux. — *Aigreur dans la bouche*. — Absence d'appétit. — *Horreur pour la viande* et pour tous les aliments, hormis le pain.

ESTOMAC. — Renvois avec goût des aliments ou goût d'urine. — Renvois à vide et brûlants. — *Dégoût et nausées avec envie de vomir*,

surtout pendant et après le repas, ou avec pression à la poitrine. — Estomac très-sensible à la pression extérieure. — *Pression dans l'estomac et la région précordiale*, quelquefois après avoir bu de l'eau froide. — Constriction de l'estomac. — Sensation comme si quelque chose se retournait dans l'estomac. — Douleur de brisement dans la région de l'estomac. — Sensation de froid ou de chaleur brûlante à l'estomac.

VENTRE. — *Élancements* sourds et pression dans la région hépatique et à la rate. — Plénitude et ballonnement du ventre, avec sensibilité douloureuse au moindre mouvement du corps. — Douleur crampoïde dans le ventre, à des places circonscrites. — Pincements dans le ventre, et surtout après des boissons ou des aliments chauds. — *Douleurs incisives dans le ventre*, et surtout dans la région ombilicale, quelquefois avec diarrhée. — Douleurs contractives dans le ventre, s'étendant jusqu'à l'estomac, avec nausées. — Fouillement et tranchées dans toute l'étendue du ventre. — Traction dans la région des aines jusque dans les testicules. — Accumulation de flatuosités avec gargouillement et mouvement dans le ventre. — Expulsion fréquente de vents fétides.

SELLES. — Constipation. — *Selles dures, rares, difficiles*, ne s'expulsant que par de grands efforts. — Selles molles, fréquentes. — *Diarrhée avec tranchées* avant, pendant et après la selle. — Après la selle, douleur de meurtrissure dans le ventre, ou douleur brûlante et pression à l'anus.

URINES. — Envie pressante et fréquente d'uriner, avec ténésme et émission peu abondante. — Pression sur la vessie. — Jet d'urine mince. — *Urine pâle, plus abondante*, et qui dépose promptement un nuage. — Urine verdâtre. — Urine qui se trouble, avec sédiment comme de l'argile. — *Douleur brûlante en urinant*.

PARTIES VIRILES. — Traction, élancements et douleurs incisives dans la verge. — Douleurs tractives dans les testicules. — Gonflement et rétraction des testicules avec sensibilité douloureuse au toucher. — Érections et pollutions nocturnes.

RÈGLES. — *Règles trop hâtives avec écoulement peu abondant* d'un sang noir, et accompagnées de douleurs incisives dans le ventre et les reins, maux de tête lancinants et lassitude dans les mains et les pieds. — Leucorrhée avec mucosités séreuses et claires.

LARYNX. — Enrouement et âpreté dans la gorge. — *Contraction crampoïde de la trachée-artère*, surtout la nuit. — Petite toux sèche, généralement en un seul coup, avec chatouillement dans la gorge.

POITRINE. — *Suspension de la respiration, en étant couché* sur le dos, comme si le pharynx était comprimé, se dissipant en changeant de position. — Oppression de poitrine en montant, par bal-

lonnement du ventre. — Douleur de brisement dans la poitrine. — Pression et élancements dans la poitrine. — Douleurs incisives dans la poitrine. — Bouillonnement anxieux, avec *sensation de chaleur et douleur brûlante dans la poitrine*, et accompagné d'une sensation de chaleur qui semble remonter du ventre. — Pression et douleur de meurtrissure au cœur.


TRONC. — *Sensibilité douloureuse, roideur et tension dans le dos et la nuque.* — Douleur de luxation dans les reins, surtout en se baissant et en étant assis.

BRAS. — *Traction et déchirement dans les bras, les mains et les doigts.* — Élancements dans les bras et les mains. — Fourmillement dans les doigts. — Torpeur des doigts.

JAMBES. — *Traction crampoïde et tension dans les cuisses et les jarrets, comme si les tendons étaient trop courts.* — *Traction et déchirement dans les cuisses, les jambes, les pieds et les orteils.* — Élancements dans les genoux et les pieds. — Fourmillement dans les jambes. — *Grande faiblesse des jambes.* — Roideur des jambes en marchant.

164.—OLEUM JECORIS MORHUÆ.

OL-JEC. — Huile de foie de morue. — Médicament encore entièrement inconnu dans ses effets primitifs, mais qui a été recommandé, même par des médecins homœopathes, contre : *Affections scrofuleuses et rachitiques; Ophthalmie et blépharophthalmie scrofuleuses; Photophobie; Tubercules dans les poumons et dans le ventre; Dartres; Croûtes de lait; Nodosités au sein; Affections rhumatismales et arthritiques; Tumeur blanche, etc., etc.*

 *Voy. la note, page 17; d'où il résulte que, pour employer ce médicament avec succès, il faut que le médecin homœopathe en étudie les effets sur l'homme en état de santé.*

165.—ONISCUS ASELLUS.

ONIS. — Cloporte. — Médicament encore très-peu connu dans ses effets primitifs, mais qui, dans quelques provinces de l'Allemagne, est employé fréquemment comme un remède domestique contre l'*Épilepsie*.

SYMPTOMES. — Bâillements fréquents, avec pandiculations. — Pesanteur sourde de la tête. — Pression douloureuse au-dessus de

la racine du nez. — Térébration derrière l'oreille droite, avec battement plus fort des artères. — Crampes dans le gosier comme s'il allait se former. — Nausées avec pression continue à l'orifice de l'estomac. — Besoin pressant et subit d'aller à la selle, avec évacuation prompte et liquide. — Douleur brûlante à l'anus. — Érections fréquentes, avec éloignement pour le travail. — Renâchement de mucosités striées de sang.


166. — OPIUM.

OP. — Opium. — HAHNEMANN. — *Doses usitées*. 3, 9, 30. — *Durée d'action* : 24 heures à 5 jours, selon les circonstances.

ANTIDOTES : Camph. calc. con. hep. mez. petr. sulf. — *On l'emploie comme antidote de* : Calad. calc. merc.

COMPARER AVEC : Acon. bell. bry. camph. cann. chin. cic. coff. colch. con. croc. dig. hep. hyos. ipec. kal. men. merc. morph-ac. mosh. nitr-ac. n-mos. n-vom. petr. phos. phos-ac. plumb. puls. rut. samb. stram. tab. tart. thui. — C'est surtout après : Bell. hep. kal. merc. puls. thui. que l'opium est efficace, lorsqu'il est indiqué; après l'opium, on trouvera quelquefois convenables : Calc. petr. puls.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections plutôt récentes qu'anciennes ; Torpeur nerveuse et manque de réaction vitale contre les médicaments administrés ; Souffrances des ivrognes ; Affection des vieillards ; Convulsions, tétanos, épilepsie et autres affections spasmodiques ; Paralysie ; Suites fâcheuses d'une frayeur avec peur, ou d'une joie subite ; Asphyxie ; Coma somnolent ou vigile ; Fièvres intermittentes, typhoïdes, et soporeuses ; Delirium tremens ; Manie ; Imbécillité ; Céphalalgie congestive, avec vertiges ; Apoplexie ; Encéphalite ; Amblyopie amaurotique ; Cataracte ; Trimus ; Ptyalisme par l'abus du mercure ; Ileus ; Hernies enflammées et étranglées ? ; Constipation, principalement par torpeur du canal intestinal, après des diarrhées fréquentes, ou par manque d'exercice, et surtout chez des personnes vigoureuses, pléthoriques et bien nourries, ainsi que chez les enfants et les femmes enceintes ; Tympanite ; Ischurie ; Fièvre de lait, avec état soporeux ; Douleurs d'enfantement supprimées, fausses ou spasmodiques ; Orthopnée paralytique ; Toux et asthme suffoquants, etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Insensibilité générale de tout le

système nerveux. — Fortes inquiétudes dans les membres. — Tremblement dans tout le corps, avec secousses, tressaillements dans les membres, et froid général. — **Accès de convulsion*, surtout le soir, vers minuit, avec sommeil, mouvements involontaires de la tête et des bras, et poings fermés. — **Convulsions épileptiques*, la nuit, ou le matin, avec accès de suffocation, perte de connaissance et de sensibilité, et mouvements violents des membres. — Après chaque accès de convulsions, sommeil. — Relâchement de tous les muscles. — **Convulsions avec cris*. — Sensation de bourdonnement et de vibration dans tout le corps. — Absence de douleurs pendant les affections. — Irritabilité excessive des muscles qui sont sous l'empire de la volonté, et diminution de celle de tous les autres. — Les personnes qui font abus de l'opium vieillissent de bonne heure. — **Tétanos*. — **Renversement du corps*. — *Paralysies*. — Sensation de force et de vigueur, ou évanouissement et grande faiblesse. — Amaigrissement général. — Gonflement hydropique de tout le corps. — Aggravation et renouvellement des souffrances en s'échauffant.

PEAU. — Peau bleuâtre, avec taches bleues. — Prurit continu à la peau, avec petites élévations rondes et incolores. — Desquamation de l'épiderme. — Engelures.

SOMMEIL. — **Somnolence comateuse*, avec gonflement et bouche ouverte, yeux ouverts et convulsés, face rouge et bouffie, mâchoire pendante, perte de connaissance, respiration difficile, lente ou même intermittente, pouls lent ou même supprimé, et mouvements convulsifs des muscles de la face, des coins de la bouche et des membres. — **Envie excessive de dormir*, avec impossibilité absolue de s'endormir. — *Sommeil incomplet*, sans que l'on puisse se réveiller. — Sommeil agité, avec rêves anxieux. — *Insomnie*, avec jactation anxieuse, inquiétude et délire. — *Carpologie* pendant le sommeil. — Gémissements en dormant. — Secousses effrayantes dans les membres pendant le sommeil. — Cauchemar. — *Rêves lascifs, effrayants et anxieux*.

FIÈVRE. — *Froid général de la peau*, surtout aux membres. — Froid et roideur de tout le corps. — *Chaleur brûlante du corps*, avec forte rougeur de la face, anxiété, délires et agitation. — **Pouls généralement plein*, lent et intermittent, ou accéléré et dur. — *Fièvre, avec sommeil soporeux*, gonflement, mouvements convulsifs des membres, excréctions supprimées et sueur chaude. — *Fièvre*, quelquefois avec perte de connaissance ou délire.

MORAL. — *Insouciance* ou grande anxiété et inquiétude. — Inconstance et versatilité. — *Grande disposition à s'effrayer*, et caractère peureux. — *Hardiesse téméraire et inconsidérée*. — *Tranquillité de l'âme*, avec rêveries agréables, et oubli des souffrances.

— *Stupidité et imbécillité.* — *Perte des sens.* — Grande affluence d'idées, avec gaieté et disposition à faire des réflexions sublimes et profondes. — *Erreurs de l'imagination.* — *Manie, avec idées bizarres °ou fixes; il semble qu'on n'est pas chez soi. — **Délires, avec visions effrayantes* °de souris, de scorpions, etc., et envie de s'enfuir. — *Divagations.*

TÊTE. — Embarras dans la tête, avec sensation de chaleur dans les yeux, et besoin de les fermer. — *Tête entreprise comme à la suite de l'ivresse.* — **Étourdissement comme dans l'ivresse.* — *Vertige* en se redressant dans le lit, qui force à se recoucher. — *Vertige*, après une frayeur. — **Accès comme un coup de sang, avec vertige*, bourdonnement d'oreilles, *perte de connaissance, face rouge, chaude, bouffie*, yeux rouges et à demi fermés, pupilles dilatées et insensibles, écume à la bouche, mouvements convulsifs des membres, *respiration lente, ronflante*; avant l'accès, insomnie ou sommeil, avec rêves anxieux; ébullition de sang et chaleur générale; après l'accès, surexcitabilité nerveuse, rires et divagations. — Mal de tête aggravé en remuant les yeux. — Céphalalgie, avec tension pressive dans la tête. — Sensation comme si le cerveau se déchirait. — *Grande pesanteur de la tête.* — **Congestion à la tête*, avec forte pulsation.

YEUX ET OREILLES. — Paupières pendantes, comme paralysées. — Sensation comme si le globe des yeux était trop volumineux. — **Yeux rouges, enflammés.* — Tremblement des yeux et des paupières. — **Yeux fixes, à moitié fermés, convulsés*, proéminents, vitreux. — **Pupilles dilatées* et immobiles. — *Obscurcissement de la vue.* — Étincelles devant les yeux. — Bourdonnement d'oreilles. — Tintement dans les oreilles.

VISAGE. — *Visage, pâle, terreux, hâve*, avec yeux creux et taches rouges sur les joues. — **Face rouge foncé*, quelquefois brunâtre, *chaude et bouffie.* — Pâleur et rougeur alternatives de la face. — Veines gonflées, à la face et à la tête. — **Relâchement de tous les muscles de la face.* — **Tremblement, secousses et mouvements convulsifs* des muscles de la face. — Lèvres gonflées. — **Lèvres et mâchoire inférieure pendantes*, par laxité. — **Tressaillement des coins de la bouche.* — **Distorsion de la bouche.* — *Crampes de la mâchoire.*

BOUCHE ET GORGE. — Dents vacillantes. — Sécheresse de la bouche, avec forte soif. — *Salivation abondante.* — Crachement de sang. — Ulcères dans la bouche, et sur la langue. — Langue noire. — *Paralysie de la langue.* — Parole faible, basse, avec impossibilité de parler haut sans faire de grands efforts. — Sécheresse de la gorge. — Gonflement et mouvements dans la gorge, avec déglutition gênée, par accès quotidiens. — *Impossibilité d'avaler.*

APPÉTIT. — Perte du goût. — Goût amer ou aigre dans la gorge. — *Soif ardente*, surtout pour la bière. — Accès de *boulimie*, avec absence d'appétit et *répugnance pour tous les aliments*. — Lenteur et faiblesse de la digestion.

ESTOMAC. — Nausées avec envie de vomir et vomituration. — *Vomissements avec douleurs violentes à l'estomac et convulsions*. — Vomissements de sang ou de matières verdâtres. — **Vomissement de matières fécales et d'urine*. — Sensibilité douloureuse et ballonnement de l'estomac et de l'épigastre. — Pression constrictive à l'estomac, avec angoisse excessive. — *Pesanteur à l'estomac*. — Compression du diaphragme.

VENTRE. — **Ventre dur* et ballonné, comme par une *tympanite*. — *Pesanteur dans le ventre*, comme par un fardeau. — Pulsation, pression, *pesanteur* et tiraillement dans le ventre.

SELLES. — **Constipation*, quelquefois de *longue durée*. — *Selles fétales*, noires. — Diarrhées écumeuses et liquides, avec douleur brûlante à l'anus et ténésmes violents. — *Selles involontaires*.

URINES. — **Rétention d'urine*, comme par inactivité de la vessie. — Urine rare, foncée, avec sédiment briqueté. — Pissement de sang.

PARTIES GÉNITALES. — **Excitation de l'appétit vénérien*, avec *érections et pollutions* fréquentes. — Extases amoureuses. — Diminution de l'appétit vénérien et impuissance. — Douleurs crampoïdes dans la matrice.

LARYNX. — *Enrouement pénible*, comme par accumulation de mucosités dans la trachée-artère, avec grande sécheresse de la bouche et langue blanche. — Voix faible, basse. — Toux violente, sèche, creuse, aggravée après le repos. — *Toux*, pendant la déglutition, ou *en respirant*, avec *suspension de la respiration*, et couleur bleue du visage. — *Toux*, avec *expectoration de sang et de mucosités épaisses et écumeuses*.

POITRINE. — **Respiration bruyante, ronflante et râlante*. — *Respiration difficile, lente et intermittente*, comme par paralysie du poudmon. — **Gêne de la respiration et étouffement avec forte angoisse*. — Asthme spasmodique. — *Accès de suffocation*, en faisant des efforts pour tousser. — Pression à la poitrine, avec élancements dans les côtés, en inspirant. — Tension et *constriction dans la poitrine*. — Chaleur et douleur brûlante dans la poitrine, surtout dans la région du cœur.

TRONC ET MEMBRES. — *Renversement du dos*. — Gonflement des veines et battement dans les artères du cou. — *Tressaillements et mouvements convulsifs dans les bras*. — Paralysie des bras. — *Tremblement des bras et des mains*. — Engelures aux doigts. — Gonflement des veines des mains. — *Tressaillements et mouve-*

ments convulsifs des jambes. — Faiblesse, torpeur et paralysie des jambes. — Pesanteur et gonflement des pieds. — Engelures aux orteils.

167. — PÆONIA.

PÆON. — Pivoine. — HARTLAUB ET TRINKS. — Médicament encore très-peu connu.

SYMPTOMES. — Chaleur brûlante à la face, au dos et à la poitrine, avec froideur des membres. — Céphalalgie, avec douleur pressive dans le côté gauche, après le repas. — Térébration et tressaillements déchirants dans les tempes. — Douleurs rongeantes dans la tête. — Prurit et lancinations dans les paupières. — Fourmillement dans le bout du nez. — Tressaillement dans les cartilages de l'oreille, et pincements derrière l'oreille. — Chaleur brûlante à la face. — Fourmillement dans la lèvre supérieure. — *Pression anxieuse à l'épigastre.* — Pincements dans les muscles abdominaux. — Diarrhée de la consistance de la bouillie, avec relâchement dans le ventre, et suivie de douleur brûlante à l'anus. — Ulcère suintant et fétide à l'anus, vers le périnée. — Pulsation dans la cavité (du côté droit) de la poitrine, s'étendant jusqu'à la nuque. — Pression aux environs du sternum, pendant le repas. — *Lancinations dans la cavité de la poitrine et à travers le cœur.* — Lancinations aiguës sous les aisselles. — Pincements dans le dos. — Élançements dans le dos, se dissipant par le grattement. — Crampe dans le poignet. — Chatouillement, comme si un insecte rampait dans l'avant-bras. — Élançements et fourmillement dans les doigts. — Crampe dans l'articulation du genou, pendant qu'on est assis. — Coups dans le genou, du dedans au dehors. — *Orteils contractés et gonflés*, avec prurit brûlant et douleurs incisives saccadées.

168. — PARIS QUADRIFOLIA.

PAR. — Parisette à quatre feuilles, Raisin des renards. — ARCHIVES DE STAFF.
— Doses usitées : 9, 30. — Durée d'action : 2 à 4 jours, suivant les circonstances.

ANTIDOTES : Acon. coff.

COMPAREZ AVEC : Hell. ign. kal. natr-m. n-vom. puls. sabad.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Lancinations continuelles dans tous*

les membres. — Serrement crampeide dans les articulations, ou sensation en les remuant et en les tournant, comme si elles étaient brisées, gonflées et luxées. — *Sensation de lourdeur dans tout le corps.*

PEAU. — Fort prurit à diverses parties. — Fourmillement sous-cutané, sans prurit. — Douleur d'excoriation de la peau, au toucher. — *Panaris.*

SOMMEIL. — Forte envie de dormir le jour et le soir, de bonne heure. *Sommeil incomplet, interrompu et agité*, la nuit, avec jactation continuelle et *affluence de rêves.* — Rêves voluptueux, avec érections et pollutions.

FIÈVRE. — Frissons, surtout à la poitrine, au ventre et aux jambes, avec chair de poule et bâillements. — *Froid intérieur continu*, avec *tremblement intérieur.* — *Sueur matutinale*, pruriente, qui force à se gratter. — Froid d'un seul côté du corps.

MORAL. — Disposition à traiter les autres avec mépris et dédain. — *Disposition à dire des fadaïses*, et à se complaire dans ce que l'on dit. — *Manie avec loquacité.* — Répugnance pour le travail de tête. — Mécontentement, mauvaise humeur.

TÊTE. — Tête entreprise, embarrassée. — Vertige en lisant à haute voix, avec difficulté de parler et d'y voir. — *Douleurs de tête aggravées par la méditation.* — Douleur pressive dans la tête, qui se dissipe en appuyant la main dessus. — Sensation de gonflement dans la tête, avec pression, comme si tout allait sortir par les tempes et les yeux. — Tension dans le cerveau et les téguments du front. — *Élancements et lancinations dans la tête.* — Céphalalgie pulsative la nuit, avec grande agitation. — Céphalalgie pulsative, avec sensation de balancement en montant un escalier. — Mal à la tête, après avoir fumé. — Douleur d'excoriation à l'extérieur du vertex, au toucher. — Sensibilité douloureuse et chute des cheveux. — Tension du cuir chevelu au front et à l'occiput. — Croûtes sur la tête.

YEUX. — Douleur dans les yeux, comme une pression dans les os des orbites. — *Sensation comme si le globe des yeux était trop volumineux ou gonflé.* — Douleur brûlante dans les yeux, avec *écoulement de larmes*, surtout le matin, après le lever. — Tressaillement et frémissement dans les cils de la paupière supérieure. — *Vue incertaine*, et vacillement devant les yeux.

OREILLES. — Otalgie, avec déchirements. — Diminution de l'ouïe. — Tintement d'oreilles.

NEZ. — Nez comme obstrué dans le haut, avec mouchement de sang. — Odeur putride du lait et du pain. — Obturation du nez, le matin, avec mouchement de mucosités épaisses et sanguinolentes. — *Coryza sec*, alternant avec coryza fluent. — Écoule-

ment de mucosités liquides par le nez et les yeux, et qui provoque une respiration haletante. — Mucosités nasales, rouges ou verdâtres.

VISAGE. — Douleurs de la face, avec élancements brûlants dans les os des joues. — Boutons purulents sous le nez et au menton. — *Boutons sanguinolents*, comme des grains de millet, à la mâchoire inférieure. — Boutons au front, avec douleur pressive au toucher. — Lèvres gercées. — Dartres autour de la bouche.

DENTS. — Odontalgie tractive ou avec pulsations tractives, surtout dans les dents cariées, aggravée par des choses froides. — Douleurs incisives dans les gencives, tous les matins. — Gencives ridées, comme si elles étaient brûlées.

BOUCHE ET GORGE. — Bouche sèche, aride, le matin, au réveil. — Accumulation de salive âpre et astringente. — Écume blanche et muqueuse aux coins de la bouche, le matin. — Douleur d'excoriation et desquamation du voile du palais. — Gonflement dur, de la grosseur d'un œuf, au palais, qui est dur. — Langue âpre et sèche, avec sensation comme si elle était trop volumineuse. — Mal de gorge, comme par la pression d'une boule dans la gorge. — Élancements, grattement et douleur brûlante dans la gorge.

APPÉTIT. — Goût pâteux et fade. — Appétit violent. — Renvois dégoûtants ou pressifs. — Régurgitations aqueuses. — Nausées, avec goût aigre. — Faiblesse et lenteur de la digestion. — Hoquets continuels après le repas.

ESTOMAC. — *Pression à l'estomac*, comme par une pierre, soulagée par des renvois. — Douleur brûlante depuis l'estomac jusque dans le ventre.

VENTRE. — Douleur tensive dans tout le ventre. — *Pression dure dans le ventre.* — Traction incisive et térébration dans un côté du ventre, le soir au lit, en étant couché dessus.

SELLES. — Évacuations alvines fréquentes, mais insuffisantes, et de la consistance de la bouillie. — *Selles diarrhéiques fétides*, comme l'odeur de chair pourrie.

URINES ET PARTIES GÉNITALES. — Diminution de la sécrétion des urines. — Envie pressante et fréquente d'uriner, *avec douleur brûlante pendant l'émission.* — Urine enflammée, avec nuages dans le milieu, sédiment rougeâtre et pellicule irisée après avoir reposé. — Douleur brûlante et élancements dans l'urèthre. — Exaltation de l'appétit vénérien. — Règles trop hâtives.

LARYNX. — Le matin, sensation de sécheresse dans la trachée-artère. — *Enrouement pénible* et voix basse, avec *rendement continuel de mucosités.* — Enrouement périodique. — Douleur brûlante dans le pharynx. — *Toux, comme excitée par la vapeur*

du soufre, dans la trachée-artère, ou comme par des mucosités visqueuses dans le pharynx. — Toux nocturne en étant couché sur le côté gauche. — *Toux avec expectoration de mucosités visqueuses, verdâtres*, venant du larynx.

POITRINE. — Gêne de la respiration, avec besoin de respirer profondément. — Pression dans le côté droit de la poitrine. — Élanchements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. — *Battement de cœur*, pendant le repos et le mouvement.

TRONC. — Douleurs dans le dos et la nuque en se baissant, comme si un fardeau pesait dessus. — Élanchements et *lancinations dans le dos*, comme aussi dans et entre les omoplates. — Tension et faiblesse dans les muscles du cou et de la nuque.

BRAS. — Pesanteur et faiblesse paralytique dans les bras et les articulations des doigts. — Déchirements et tractions dans les doigts, depuis l'épaule jusqu'aux doigts. — Tremblement des mains. — Élanchements dans les doigts. — Doigts tantôt chauds, tantôt froids, tantôt morts. — Engourdissement des doigts. — Panaris.

JAMBES. — Déchirements et traction dans les jambes, et surtout dans l'articulation coxo-fémorale. — Douleur paralytique dans l'articulation du pied. — Fourmillement dans le tendon du talon. — Déchirements, tractions et élanchements dans les orteils. — Froid aux pieds, la nuit, au lit.

169. — PETROLEUM.


PETR. — Huile de pétrole. — **HAHNEMANN.** — *Doses usitées* : 13, 50. — *Durée d'action* : jusqu'à 50 jours, dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : ACON. n-vom.

COMPARER AVEC : Calc. cann. *cham.* ign. *lyc.* magn. *nitr-ac.* n-vom. *phos.* *puls. sulf.* — C'est surtout après : *Nitr-ac.* et *phos.*, que le pétrole est efficace lorsqu'il se trouve indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances par suite de contrariétés; Affections scrofuleuses et rachitiques; Accès de défaillance; Atrophie des enfants; Dartres; *Rhagades*; *Engelures*; Éruptions pustuleuses; Fièvres intermittentes; Mélancolie; *Vertiges chroniques*; *Céphalalgie causée par des contrariétés*, ou même par une chute; Migraine; Teigne; Ophthalmies scrofuleuses; Myopie et presbyopie; Otite, et otorrhée purulente; *Durété de l'ouïe* (surtout après l'usage de l'acide nitrique); Surdité par paralysie du nerf acoustique; *Affections gastriques*; Mal de mer; Souffrances causées par le mouvement de la voiture; Dyspepsie

chronique; Hernie inguinale; Diarrhées muqueuses; Hémorrhoides; Rétrécissement de l'urèthre; Dartres au scrotum; Gonorrhée; Calculs urinaires; Fleurs blanches; Dysménie des jeunes filles; Éruptions pustuleuses des femmes enceintes; Catarrhe avec enrouement; *Rhagades et gerçures aux mains en hiver; Engelures aux mains et aux pieds, etc., etc.*

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs tractives dans les membres.

— Enroissement et engourdissement facile des membres. — Craquement dans les articulations, avec roideur arthritique et douleurs tractives, déchirantes. — Gonflement et induration des glandes, même après une contusion. — Tressaillement des membres, le jour et pendant le sommeil. — Attaques d'épilepsie. — *Accès d'évanouissement avec bouillonnement de sang, chaleur, palpitations et pression au cœur. — *Au moindre effort, grande faiblesse, quelquefois avec trouble de la vue, tremblement du corps, bourdonnement d'oreilles et nausées. — Faiblesse, nausées et autres inconvénients par le mouvement de la voiture. — Aggravation et apparition de plusieurs symptômes par un temps d'orage. — *Chaleur fugace, ébullition de sang et sueur après une promenade ou après s'être fâché. — *Amaigrissement, chez les enfants aussi. — Sensation d'un malaise insupportable et général, avec tremblement et accablement. — Pesanteur et lassitude dans tous les membres. — Grande lassitude le matin et le soir. — Forte disposition à prendre des refroidissements. — *Répugnance pour le grand air, avec frissonnement dès qu'on y est. — Plusieurs symptômes se manifestent le matin.

PEAU. — Grande sensibilité de la surface de la peau. — Miliare urticaire. — Dartres pruriantes. — Plaques pruriantes, excoriées et suintantes, à la peau. — Taches brunes et jaunes à la peau. — *Éruption de pustules pruriantes et brûlantes. — *Rhagades. — Peau malade; toute lésion tend à s'ulcérer. — Furoncles. — Ulcères avec douleur lancinante. — *Chairs luxuriantes dans les ulcères. — Verrues. — Cors aux pieds. — *Engelures, quelquefois douloureuses.

SOMMEIL. — Envie de dormir le jour et le soir, en étant assis tranquillement. — *Sommeil incomplet et agité, la nuit, avec affluence de rêves vifs, anxieux et effrayants, réveil fréquent en sursaut et chaleur anxieuse. — *Le matin, il semble qu'on n'a pas assez dormi.

FIÈVRE. — Frisson avec mal à la tête, et froid aux mains et au visage. — *Frissonnement fréquent par tout le corps, et en se ré-

chauffant, fort prurit à la peau. — Frissonnement ou froid, généralement le soir, et quelquefois avec ongles bleus. — Sueur immédiatement après le frisson. — **Fièvre*, le soir, avec chaleur de la face, et pieds froids après le frisson. — Chaleur fugace, fréquente. — Fièvre avec pouls plein et sensation brûlante à la peau. — **Chaleur nocturne*. — **Sueur nocturne*.

MORAL. — **Anxiété et disposition à s'effrayer*. — **Tristesse et abattement moral*, quelquefois avec sensation de faiblesse au cœur (au creux de l'estomac?). — **Grande irrésolution*. — **Inquiétude sur l'avenir*. — **Humeur hypochondriaque*. — **Caractère irascible, violent, avec injures*. — **Pleurs fréquents*, et pour la moindre chose. — **Absence de mémoire*. — **Inaptitude à réfléchir*. — **Faiblesse de la pensée*.

TÊTE. — **Tête entreprise*. — **Vertige fréquent*. — **Vertige*, comme un fort ballonnement. — **Vertige en se baissant*, ou en se levant du lit ou de son siège. — **Mauv de tête après s'être fâché*, ou le matin, à jeun, comme aussi le soir après une promenade. — Accès de mal de tête semi-latéral, qui force à se coucher. — **Pesanteur et plénitude dans la tête*, le matin et en se baissant. — **Douleurs pressives ou lancinantes pressives, dans la tête*, et surtout dans l'occiput. — **Mal de tête aggravé par tout travail intellectuel*, jusqu'à l'hébétéude complète. — Tension dans la tête, comme si la dure-mère était tendue. — Douleurs de tête, crampoïdes, tractives, pinçantes. — **Mauv de tête pulsative*, surtout dans l'occiput. — Sensation comme si tout était vivant dans la tête. — Cuir chevelu douloureux au toucher, comme s'il était meurtri ou ulcéré. — **Traction à la tête*, au front et aux tempes, jusque dans les dents. — **Éruption à la tête et à la nuque*. — Gonflement œdémateux et croûtes au cuir chevelu. — **Chute des cheveux*.

YEUX. — Prurit dans les yeux. — Pression, cuisson, élancements et douleur brûlante dans les yeux. — **Inflammation des yeux*. — **Fistule lacrymale*. — Larmolement. — Tressaillement et frémissement des yeux et des paupières. — Convulsion des yeux. — Myopie ou *presbyopie*. — Diplopie. — **Scintillement et voile devant la vue*, ou étincelles et points noirs.

OREILLES. — Otealgie avec douleur crampoïde et tressillante. — **Sécheresse et sensation de sécheresse pénible dans l'intérieur de l'oreille*. — Écoulement de sang et de pus par les oreilles. — Éruption aux oreilles. — Rougeur, excoriation et suintement derrière les oreilles. — **Surdité*. — **Tintement, roulement, grondement et bourdonnement dans les oreilles*.

NEZ. — Épistaxis. — Vésicules purulentes au nez. — Narines ulcérées. — **Gonflement du nez*, avec écoulement de pus et douleur au-dessus de la racine du nez. — **Obturation du nez*. — **Séche-*

resse et sensation de sécheresse pénible dans le nez. — °Coryza avec enrouement.

FACE. — °*Chaleur de la face*, quelquefois après le repas, et avec soif. — °*Teint jaundtre, pdle.* — Éruption boutonneuse à la face. — Boutons croûteux, avec douleur lancinante, aux lèvres et aux commissures des lèvres. — °Gonflement des glandes sous-maxillaires. — Luxation facile de l'articulation de la mâchoire, le matin, au lit, avec douleurs vives.

DENTS. — Odontalgie au contact du grand air, plus violente la nuit, avec gonflement de la joue. — Torpeur des dents, avec douleur en les serrant. — Vésicule purulente aux gencives, comme une fistule. — Gonflement des gencives, avec douleur lancinante au toucher.

BOUCHE. — °*Haleine fétide*, quelquefois comme de l'ail. — Ulcères à la face interne des joues. — Accumulation de mucosités dans la bouche et la gorge. — °Langue chargée d'un enduit blanc. — Grande sécheresse de la bouche, avec forte soif.

GORGE. — °*Mal de gorge*, pendant la déglutition, avec douleur lancinante. — Gonflement et grande sécheresse de la gorge. — En avalant, les aliments (liquides?) remontent vers les fosses nasales. — Renâchement de mucosités, le matin.

APPÉTIT. — °*Goût putride, fade, muqueux*, ou bien amer ou acide. — Forte soif de bière. — °*Boulimie.* — °Faim, avec prompt satiété. — °Voracité. — Friandise. — °Absence d'appétit. — °*Répu gnance pour la viande et la graisse*, comme aussi pour les aliments chauds et cuits. — Incommodités pendant la digestion, après presque tous les aliments, quelque peu qu'on en ait mangé. — °*Après le repas, obscurcissement et vertige*, °nausées, °*lourdeur et pression dans l'estomac*, sommeil, ou coliques avec rapports, °ou renvois aigres, congestion à la tête, crampes de poitrine, etc.

ESTOMAC. — Renvois bruyants. — °*Renvois aigres et régurgitations.* — Pyrosis. — °*Nausées fréquentes, surtout le matin*, souvent avec accumulation d'eau dans la bouche, gêne de la respiration, renvois aigres, langue sèche et blanche, points dans la région hépatique, chaleur du visage, vertiges, etc. — °*Nausées par le mouvement de la voiture.* — °*Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites.* — °Envie de vomir. — °Vomissement verdâtre, amer. — °*Pression à l'estomac.* — Crampes d'estomac. — Sensation de vacuité et de faiblesse dans l'estomac. — Douleur dans l'épigastre, comme si quelque chose s'en arrachait. — °Gonflement de l'épigastre, avec douleur au toucher. — °Sensation de plénitude à l'épigastre.

VENTRE. — Mal de ventre peu après le repas. — °Sensation d'un grand vide dans le ventre. — Ballonnement et tension dans le

ventre, avec crampes. — *Pincements et *tranchées dans tout le ventre*, quelquefois avec besoin pressant d'aller à la selle. — *Coliques nocturnes, vers le matin, avec diarrhée. — *Borborygmes dans le ventre, °avec sensation comme si l'abdomen était entièrement vide. — °Hernie inguinale. — Vents fétides. — °Sensation de froid dans le ventre.

SELLES. — **Selles difficiles, dures, noueuses et insuffisantes.* — **Selles fréquentes, le jour*, °quelquefois avec évacuation de matières séreuses, jaunâtres. — **Diarrhée*, souvent précédée de tranchées. — **Selles muqueuses*, souvent avec du sang. — Douleur brûlante au rectum, après la selle. — Dartres pruriantes au périnée.

URINES. — Émission d'urine fréquente, avec écoulement peu abondant d'une urine rouge ou brune et fétide. — Suintement d'urine involontaire. — Émission d'urine, la nuit. — Pissement au lit.

PARTIES VIRILES. — °*Rétrécissement de l'urèthre.* — Douleur brûlante, **prurit, rougeur, excoriation et suintement*, ou boutons pruriants et dartres, *au scrotum et à côté, à la cuisse.* — Diminution de l'appétit vénérien. — Pollutions fréquentes. — °Écoulement de liqueur prostatique. — °Après le coït, faiblesse et irritabilité nerveuse.

RÈGLES. — **Prurit, excoriation et suintement, près de la vulve.* — Répugnance pour le coït, chez la femme. — *Règles trop hâtives*, avec écoulement d'un sang qui provoque la démangeaison. — Leucorrhée comme du blanc d'œuf. — °Leucorrhée, °avec rêves lascifs. — Prurit et furfures aux mamelons.

LARYNX. — *Enrouement* avec ou sans coryza. — Toux avec sécheresse dans la gorge. — *Toux suffocante, °la nuit. — **Toux sèche, la nuit*, ou le soir, °après s'être couché. — °Toux sèche, avec élancements sous le sternum.

POITRINE. — *Gêne de la respiration*, à l'air froid. — Râlement et ronflement dans la trachée-artère. — Sensation de pesanteur, d'anxiété et d'inquiétude dans la poitrine. — Oppression de poitrine, la nuit. — *Élancements dans les côtés de la poitrine. — °Dartres sur la poitrine. — *Battement de cœur.

TRONC. — **Maux de reins*, °qui ne permettent pas de se tenir debout. — **Douleur dans le dos*, qui ne permet pas de bouger. — Faiblesse et roideur dans le dos et aux reins. — °Dartres à la nuque. — °Gonflement des glandes et éruption à la nuque. — °Suppuration des glandes axillaires.

BRAS. — Douleurs tractives dans les bras et les doigts. — Grande faiblesse des bras. — Enroidissement des bras et des doigts. — Inflammation érysipélateuse au bras. — Taches jaunes au bras. — Furoncles à l'avant-bras. — Déchirements dans les mains. — Sen-

sation brûlante dans la paume des mains. — Sueur aux mains. — °Taches brunes au poignet. — **Crevasses saignantes aux mains et aux doigts*, surtout en hiver. — °Engelures et verrues aux doigts. — Roideur arthritique dans les articulations des doigts.

JAMBES. — Craquement dans les articulations des jambes. — Crampes dans les cuisses, les mollets et la plante des pieds. — Furoncles aux cuisses et aux jambes. — Tension dans le jarret. — *Lancinations dans le genou.* — Faiblesse du genou. — °Dartres au genou. — Éruption tubéreuse, pruriente, au mollet. — °Dartre à la malléole. — Sensation brûlante à la plante des pieds. — °Froid aux pieds. — °Gonflement des pieds. — Gonflement chaud à la plante des pieds. — Gonflement et rougeur du talon, avec douleur brûlante et élancements, aggravés en marchant. — °Engelures aux orteils. — °Cors aux pieds. — °Ulcères opiniâtres aux orteils, à bords élevés et à fond rouge, superficiel et suintant.

170.—PETROSELINUM.

PETROS. — Persil. — GAZETTE HOMŒOPATHIQUE DE LEIPZIG. — Médicament encore très-peu connu, et qui jusqu'ici n'a encore été employé que contre des *Gonorrhées*.

SYMPTOMES. — Sommeil tardif, avec affluence de rêves anxieux. — Chant dans les oreilles, qui pénètre dans tout l'organe. — Selles comme de l'argile, blanchâtres. — *Envie fréquente et presque inutile d'uriner*, toutes les demi-heures. — Fourmillement, élancements, *pression et traction dans l'urèthre*. — Pollutions. — Tressaillement dans les muscles du dos et du bras.

171.—PHELLANDRIUM AQUATICUM.

PHEL. — Fenouil d'eau. — HARTLAUB ET TRINES. — Médicament encore peu connu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs déchirantes dans les membres. — Sensation de tremblement dans tous les vaisseaux du corps. — La plupart des symptômes semblent se manifester pendant qu'on est assis, debout ou couché; ils s'améliorent par le mouvement et au grand air. — Grand abattement et lassitude. — Prurit, quelquefois brûlant ou cuisant, se dissipant promptement

en grattant. — Petites taches bleues, comme des pétéchiies. — Envie de dormir le jour, avec bâillements fréquents. — Sommeil tardif. — Réveil fréquent et de bon matin, ou sommeil prolongé, le matin. — Prédominance du frisson, quelquefois avec grelottement, généralement non accompagné ni suivi de chaleur, ni de soif. — Horripilation, généralement le soir, quelquefois comme si on était inondé d'eau chaude. — Pouls accéléré. — Caractère triste, inquiet, plongé dans la méditation, parfois gaieté folle. — Arrogance acariâtre.

TÊTE. — Obscurcissement dans la tête, comme par l'ivresse. — *Pesanteur de la tête*, comme si elle était trop volumineuse et trop pleine. — *Vertige au point de tomber, empiré au grand air*, soulagé en étant couché. — Maux de tête qui se dissipent au grand air et pendant le dîner. — Douleur compressive dans les côtés de la tête. — Douleur fouillante dans la tête. — Ébullition de sang, avec chaleur et battement dans la tête.

YEUX. — *Prurit aux yeux*. — Sensation brûlante dans les paupières, le matin et le soir. — Frémissement des paupières qui s'affaissent facilement par une sensation de pesanteur et de sommeil. — Sécheresse des yeux, avec élancements et douleur brûlante. — Larmolement, surtout au grand air. — Vue trouble, comme à travers un brouillard, surtout en fixant attentivement les yeux sur un objet.

OREILLES ET NEZ. — Déchirements et térébration dans les oreilles. — Narines rouges, brûlantes et gonflées. — Vésicules pruriantes et confluentes, dans la narine. — Absence d'odorat. — Coryza, avec obturation du nez, qui ne permet de respirer que par la bouche.

VISAGE. — Chaleur du visage. — Tension de la peau du visage. — Frémissement violent et presque déchirant dans la joue. — Odontalgie, avec douleur déchirante ou lancinante. — Gencives rouges, gonflées, douloureuses.

BOUCHE ET GORGE. — Sécheresse de la bouche et de la gorge, la nuit. — Accumulation plus abondante d'une salive écumeuse dans la bouche, qui oblige à cracher. — Douleur brûlante et vésicules brûlantes sur la langue. — Mal de gorge, avec douleur pressive et lancinante, hors le temps de la déglutition et en avalant à vide, non en ingérant des aliments.

ESTOMAC. — Goût pâteux ou comme de fromage. — Goût douceâtre après avoir bu de l'eau. — Amertume de la bière. — *Soif de lait et de bière, avec répugnance et horreur de l'eau*. — Appétence pour les acides, avec soif. — Dégout et nausées, avec envie de vomir, et besoin de chasser des renvois. — Renvois fétides comme des punaises, ou avec goût des aliments. — Mal à l'estomac,

comme s'il était vide. — Sensation, comme si l'estomac était plein d'eau. — Douleur brûlante à l'estomac.

VENTRE, RÈGLES. — Pincements dans le ventre. — *Sensation de froid dans le ventre*, avec mouvements dans les intestins. — Incarcération de flatuosités dans la région des côtes et des reins. — Selles dures, avec griffement et pression à l'anus. — Selle liquide, avec ténesme, suivie de douleur d'excoriation à l'anus. — Pendant et après la selle, expulsion abondante de vents. — Urine pâle et plus rare. — *Règles trop hâtives*. — Au début des règles, lassitude et brisement douloureux dans les cuisses.

POITRINE ET MEMBRES. — Enrouement et âpreté dans la gorge, et coryza fluent. — Toux suffocante, sèche, avec haleine courte. — Toux nocturne par accumulation de mucosités dans la gorge. — Expectoration fréquente de mucosités, le matin, sans toux. — Haleine courte, surtout en marchant. — Oppression de poitrine, en étant debout et en respirant profondément. — *Élancements dans la poitrine*. — Pression dans le côté de la poitrine, le matin, au lit, se dissipant en se couchant sur le côté affecté. — Douleur de brisement dans les reins, en étant assis. — Déchirement dans les épaules et les bras. — Résonnement dans les mollets. — Sensation de congestion de sang dans les genoux.

172.—PHOSPHORUS.


PHOS. — Phosphore. — **HAHNEMANN.** — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : jusqu'à 7 semaines dans des affections chroniques; 3 à 5 jours dans des affections aiguës.

ANTIDOTES : Camph. coff. n-vom. vinum.

COMPARER AVEC : Acon. agar. alum. amb. amm. ars. bell. bry. calc. carb-veg. caus. cham. chin. cin. coff. con. graph. hell. hyos. iod. ipec. kal. kreos. lyc. magn. merc. n-vom. op. petr. plumb. puls. rhus. sep. sil. spong. sulf. veratr. — C'est surtout après : *Calc. kal. kreos. lyc. et rhus.*, que le phosphore est efficace, lorsqu'il est indiqué; après le phosphore, on trouvera parfois convenables : *Petr. rhus.*

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections des personnes d'une constitution faible, phthisique, irritable et lymphatique, des personnes aux cheveux blonds, aux yeux bleus, taille svelte et d'un tempérament vif et sensible, ou d'une constitution affaiblie par de longues maladies, ou par des causes débilitantes qui ont exercé une influence lente, mais continue, sur l'économie vitale; Souffrances par suite d'un refroidissement, ou par suite d'une colère; *Affections rhumatismales et arthritiques*

chroniques ; Faiblesse physique et nerveuse, par suite de longues influences nuisibles à l'économie vitale ; Affections lymphatiques, scrofuleuses et rachitiques ; Affections des glandes, même par suite d'une contusion ; Douleurs ostéocopes, exostoses et autres maladies des os ; Affections hydropiques ; Taches hépatiques ; Abscès lymphatiques ; Fongus hématoïde ; Hémorrhagie et congestion sanguines ; Engelures ; Scarlatine, morbilles, et suites fâcheuses de la répercussion de ces maladies ? ; Chlorose ? ; Atrophie ? ; Furoncles ; Engelures ; Fièvres hectiques ; Fièvres typhoïdes ? ; Affections hypochondriaques et hystériques ; Somnambulisme ; Congestion à la tête ; Vertiges congestifs ; Céphalalgies rhumatismales, nerveuses et hystériques ; Migraine ; Chute des cheveux, par suite de fortes maladies aiguës ; Teigne ; Ophthalmie et photophobie scrofuleuses ; Ophthalmie arthritique ; Cataracte ; Glaucome ; Amblyopie amaurotique et surdité par suite de congestion à la tête ; Affections de l'ouïe, à la suite de maladies nerveuses et inflammatoires ; Polype au nez ; Inflammation scrofuleuse du nez ; Prosopalgie rhumatismale ou congestive ; Odontalgie rhumatismale ou congestive ; Dyspepsie, gastralgie, aigreurs et autres affections gastriques ; Gastrite ; Squirrhe de l'estomac ? ; Choléra ; Cholérine ; Coliques spasmodiques et flatulentes ; Entérite ? ; Relâchement chronique du ventre ; Diarrhées, surtout chez des personnes sensibles, d'une constitution faible, ainsi que chez les vieillards ou les phthisiques ; Diarrhées chroniques et colliquatives ; Diarrhées avec phénomènes typhoïdes ; Calculs urinaires ? ; Dysménorrhée ; Stérilité par suite d'un appétit vénérien trop exalté ; Vomissement des femmes enceintes ; Érysipèle, abcès et induration aux mamelles (après l'usage de bell. ou de merc.) ; Aphonie ; Catarrhe pulmonaire ; Grippe ; Laryngite chronique (après l'usage de : Acon. spong. hep.) ; Disposition au croup, ou souffrances chroniques à la suite de cette maladie ; Pneumonie chronique ; Souffrances asthmatiques, surtout à la suite d'une pneumonie, ou chez des personnes sensibles ; Souffrances phthisiques ; Maladies de cœur ; Maux de reins rhumatismaux ; Gonflement cedémateux des pieds, etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — **Déchirements et élancements* arthritiques et rhumatismaux, principalement dans les membres, quelquefois après un léger refroidissement, surtout la nuit, au lit. — Douleur brûlante dans les membres. — Tension, crampe, tressaillement et distorsion de quelques membres. — Convulsions. — Enroissement de quelques parties. — Accès de pâlisement et de torpeur dans quelques membres qui paraissent alors comme

morts. — *Tremblement des membres*, surtout pendant le travail. — °Facilité à se donner des tours de reins. — **Bouillonnement de sang et congestions*, quelquefois avec pulsation dans tout le corps. — **Saignement par différents organes*. — **Faiblesse et brisement des articulations*, surtout des genoux. — *Grande faiblesse et lassitude paralytique*, quelquefois subite, surtout le matin, au lit, ou pour peu qu'on ait marché. — Accès d'évanouissement. — Sensibilité excessive de tous les organes. — **Lassitude hystérique*. — **Abattement général et faiblesse nerveuse*. — **Pesanteur des membres et paresse*. — **Paralysies*, avec fourmillement dans les parties affectées. — **Amaigrissement et consomption*. — **Engorgement des glandes*. — **Impossibilité de rester à l'air, surtout quand il est froid*. — Grande disposition à prendre des refroidissements, qui, souvent, sont suivis de mal à la tête et aux dents, coryza avec fièvre, frissonnement, etc. — *Douleurs dans les membres aux changements de temps*. — La plupart des symptômes se manifestent le matin et le soir, au lit, comme aussi après le dîner, tandis que plusieurs autres apparaissent au commencement du repas, et se dissipent après.

PEAU. — Desquamation de la peau. — Plaques excoriées à la peau, avec crevasses et élancements. — **Taches rondes, darteuses*, par tout le corps. — Dartses sèches, furfuracées. — **Taches jaunes ou brunes à la peau*. — **Taches cuivrées ou bleuâtres*, comme des pétéchies. — **Furoncles*. — **Exostoses*, avec douleurs nocturnes. — **Abcès lymphatiques*, avec ulcères fistuleux, à bords calleux, sécrétant un pus fétide et incolore, et fièvre hectique. — °*Fongus hématoïde*. — **Saignement abondant par de petites blessures*. — **Engelures et cors aux pieds*, quelquefois douloureux. — Fourmillement à la peau. — Éruptions urticaires.

SOMMEIL. — **Forte envie de dormir, le jour*, comme par somnolence. — Sommeil stupéfiant. — **Sommeil tardif*, le soir, et insomnie nocturne, ou réveil fréquent avec difficulté de se redormir, à cause d'inquiétude, avec angoisse, jactation, chaleur, vertige et bouillonnement de sang. — Impossibilité de rester couché sur le dos ou sur le côté. — **Sommeil non réparateur; le matin, il semble qu'on n'a pas assez dormi*. — La nuit, vertiges avec nausées, sensibilité douloureuse des membres, maux d'estomac et de ventre, asthme suffocant et spasmodique, etc. — Réveil fréquent, avec sursauts et effroi. — Pendant le sommeil, tressaillement des membres, cris, paroles, pleurs, plaintes, lamentations et gémissements. — **Rêves anxieux, pénibles, effrayants et horribles*, ou vifs et inquiets. — Rêves d'animaux qui mordent, de brigands, d'incendie, des affaires du jour, d'hé-

morrhagies, de morts, de querelles, de vermine, etc. — *Cauchemar*. — **Somnambulisme*.

FIÈVRE. — **Horripilations et frissons*, surtout le soir, au lit, quelquefois avec bâillements suivis ou non de chaleur. — Froideur des membres. — Frissons, suivis de chaleur, avec soif et sueur, surtout la nuit et l'après-midi. — **Chaleur fugace* ou anxieuse. — **Chaleur nocturne*. — **Fièvre hectique*, avec chaleur sèche vers le soir, surtout à la paume des mains, sueurs et diarrhées colliquatives, rougeur circonscrite des joues, etc. — **Pouls accéléré et dur*. — Sueur nocturne et visqueuse. — **Sueur matutinale*.

MORAL. — Tristesse mélancolique et mélancolie, quelquefois avec pleurs violents, ou interrompus par des attaques de rire involontaire. — **Angoisse et inquiétude* surtout en étant seul, ou par un temps d'orage, principalement le soir, avec *disposition à la peur* et épouvante. — **Angoisse* sur l'avenir, ou sur l'issue de la maladie. — Disposition à s'effrayer. — **Tristesse hypochondriaque*. — Dégout de la vie. — **Grande frascibilité, colère; emportements et violence*. — Pleurs et rires involontaires et spasmodiques. — Misanthropie. — **Répugnance pour le travail*. — Impudence, comme par aliénation. — Grande indifférence pour toutes choses, et même pour les siens. — Grand oubli, surtout le matin. — Grande affluence d'idées difficiles à ordonner. — **État de clairvoyance*.

TÊTE. — **Obnubilation et étourdissement*, surtout le matin. — **Accès fréquents de vertige* de diverses natures et à différentes heures du jour, surtout le matin, dans le milieu de la journée et le soir, au lit. — Vertige en étant assis; il semble que le siège s'élève, avec humeur hypochondriaque. — **Vertige avec nausées et douleurs pressives dans la tête*. — Vertige opiniâtre. — **Vertige avec perte des idées*. — Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements, et douleurs battantes, tressaillantes. — Maux de tête nocturnes, précédés de nausées, le soir. — Mal de tête après une contrariété. — **Mal de tête, le matin*. — Faiblesse de la tête, qui est fatiguée par la musique, le rire, une marche lourde, etc., etc. — Douleur de meurtrissure dans le cerveau. — **Mal de tête étourdissant*, quelquefois avec forte ébullition de sang, et pâleur du visage. — **Sensation de pesanteur et de plénitude, et pression dans la tête*. — Déchirement dans la tête, et surtout dans les tempes, ou *semi-latéral*. — Lancinations à diverses parties de la tête, surtout le soir. — **Congestion à la tête*, avec battement, bourdonnement, chaleur et sensation brûlante, surtout au front. — Sensation de froid dans la tête. — Les maux de tête sont soulagés au grand air. — **Élancements extérieurs au côté de la tête*. — Sensation pénible, comme si la peau du front était trop

tendue. — Facilité à se refroidir la tête, avec sensation, en plein air, comme si le cerveau se congelait. — **Prurit au cuir chevelu.* — **Chute des cheveux*, surtout *au-dessus des oreilles*. — **Croûtes sèches*, et *écailles abondantes au cuir chevelu.* — *Exostoses à la tête.*

YEUX. — Douleurs dans les yeux, comme dans les os des orbites. — **Pression dans les yeux*, comme si un grain de sable s'y était introduit. — **Élancements*, cuisson, chaleur et *sensation brûlante dans les yeux*, surtout dans les angles extérieurs. — **Congestion de sang aux yeux.* — Rougeur de la sclérotique et de la conjonctive. — Couleur jaunâtre de la sclérotique. — **Inflammation des yeux*, de diverses natures. — **Larmoiement*, surtout *en plein air et au vent.* — **Agglutination nocturne des yeux.* — Orgelet. — Frémissement des paupières et de leurs angles. — **Difficulté d'ouvrir les paupières.* — Gonflement des paupières. — Amblyopie. — Faiblesse de la vue, le matin, au réveil. — **Myopie.* — **Cécité diurne*, quelquefois instantanée; **tout semble être recouvert d'un voile gris.* — Obscurcissement de la vue, à la lumière. — **Reflet noir ou étincelles et taches noires devant la vue.* — Sensibilité des yeux à la clarté du jour et à celle de la lumière. — Auréole verdâtre autour de la lumière.

OREILLES. — *Otalgie.* — *Déchirements aigus et élancements dans les oreilles et la tête.* — **Battement et pulsation dans les oreilles.* — **Congestion de sang aux oreilles.* — Sensation de sécheresse dans les oreilles. — Écoulement jaune par les oreilles, alternant avec surdité. — **Sensibilité excessive de l'ouïe.* — Fort retentissement des sons et surtout des paroles, dans les oreilles, avec résonnement dans la tête. — **Surdité*, surtout *pour la parole humaine.* — Murmure devant les oreilles. — **Bourdonnement d'oreilles.*

NEZ. — *Nez rouge, gonflé et douloureux au toucher.* — **Croûtes sèches et dures dans le nez.* — **Polype au nez.* — Excoriation des angles du nez. — Narines ulcérées. — Éphélides abondantes sur le nez. — **Echalaïson fétide par le nez.* — **Mouchement de sang.* — **Épistaxis*, quelquefois pendant la selle, ou le soir. — **Sensibilité excessive de l'odorat*, surtout pendant les maux de tête. — Absence d'odorat. — **Sécheresse pénible du nez.* — **Coryza sec et fluent*, avec mal de gorge et embarras de la tête. — **Écoulement continu par le nez de mucosités jaunes, verdâtres.* — Éternument fréquent. — **Obturation du nez*, surtout le matin.

VISAGE. — **Visage pâle, hâve, sale, terreux, avec yeux caves, bordés d'un cercle bleu.* — Pâleur alternant avec rougeur du visage et chaleur fugace. — **Rougeur et chaleur brûlante des joues.* — **Rougeur circonscrite des joues.* — **Bouffissure de la face*, surtout *autour des yeux.* — Tressaillement des muscles de la face. —

**Tension de la peau du visage, quelquefois d'un seul côté. — Desquamation de la peau du visage. — °Sensibilité douloureuse d'un seul côté du visage, en ouvrant la bouche. — *Elancements douloureux, tractifs et déchirants dans les os du visage, surtout le soir ou la nuit, au lit, ou après le plus léger refroidissement. — *Les douleurs à la face se renouvellent en parlant, ou au moindre contact. — °Éruptions de boutons et de croûtes à la face. — *Lèvres bleuâtres. — *Lèvres sèches, °couvertes de croûtes brunâtres. — Lèvres gercées. — Dartres et boutons autour de la bouche. — Ulcération de la commissure des lèvres. — Crampe de la mâchoire. — Engorgement des glandes sous-maxillaires.*

DENTS. — **Odontalgie tractive ou déchirante, ou bien rongante, térébrante, pulsative, tressillante et lancinante, surtout au grand air, ou le soir et le matin, quelquefois aussi la nuit seulement, surtout à la chaleur du lit, ou bien au contact des aliments chauds. — *Maux de dents, après le plus léger refroidissement, avec salivation. — Dents douloureuses le matin, pendant la mastication, comme par ulcération. — Carie des dents. — Fort vacillement des dents. — Saignement des dents. — Grincement des dents. — Sensibilité douloureuse, inflammation, décollement, °ulcération, °gonflement et saignement facile des gencives.*

BOUCHE. — **Excoriation de la bouche. — *Accumulation de salive, °salée ou douceâtre, ou sécheresse excessive de la bouche. — *Mucosités visqueuses dans la bouche. — *Crachement de sang. — Vésicules purulentes au palais. — Peau ridée au palais, comme si elle allait se détacher. — *Langue sèche, °chargée d'un enduit brun noirâtre. — *Langue blanche.*

GORGE. — **Sécheresse de la gorge, jour et nuit. — Pression dans la gorge. — *Cuisson, °grattement et douleur brûlante dans la gorge. — *Rendement de mucosités, le matin. — Douleur d'excoriation dans la gorge. — Gonflement des amygdales.*

APPÉTIT. — *°Goût pâteux ou comme du fromage. — Amertume dans la bouche et la gorge, avec âpreté. — °Goût aigre dans la bouche, surtout après le repas. — °Perte du goût. — Absence d'appétit par une sensation de plénitude dans le gosier, et forte soif. — °Désir excessif de choses rafraîchissantes. — °Faim après le repas. — *Boulimie, même la nuit. — °Après le déjeuner, sensation de fadeur et de mollesse au ventre. — Après le repas, envie de dormir et paresse, chaleur et anxiété, sensation brûlante dans les mains, aigreurs plus prononcées, pression et plénitude dans l'estomac, la poitrine et le ventre, accompagnées de gêne de la respiration, vomissement des aliments, ballonnement du ventre, °ou mal à la tête, rapports, hoquet, faiblesse, coliques et beaucoup d'autres souffrances.*

ESTOMAC. — Renvois avec douleur dans l'estomac, comme si quelque chose allait s'en arracher. — °La fumée du tabac produit des nausées et des battements de cœur. — **Renvois* abondants, généralement à vide, surtout après le repas, et après avoir bu, quelquefois aussi avortés, ou spasmodiques, ou bien aigres, ou avec goût des aliments. — **Régurgitation aigre des aliments.* — **Pyrosis.* — Hoquet. — **Nausées de diverses natures*, surtout le matin, ou le soir, ou bien après le repas. — Nausées, avec forte faim ou soif, se dissipant en mangeant, ou en buvant de l'eau. — °Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, surtout après avoir mangé des acides. — **Vomissements, avec fortes douleurs à l'estomac*, et grande faiblesse. — Vomissement verdâtre ou noirâtre. — Vomissement de matières acides. — **Vomissement des aliments*, surtout le soir. — **Vomissement de bile*, la nuit, ou de mucosités, quelquefois avec froid et torpeur des mains et des pieds. — Vomissement de sang. — Vomissement avec diarrhée. — *Douleur d'estomac*, surtout au toucher. — Douleurs violentes à l'estomac, soulagées en buvant froid. — °*Sensation de rétrécissement du cardia*; les aliments, à peine ingérés, remontent dans la gorge. — **Plénitude d'estomac.* — **Élancements et pression dans l'estomac*, surtout après le repas, avec vomissement des aliments. — **Scrobicule douloureux au toucher*, le matin aussi. — Sensation de froid, ou chaleur et **sensation brûlante à l'estomac et au scrobicule.* — Inflammation d'estomac. — **Douleur crampoïde, sensation de griffement, et contraction dans l'estomac*, quelquefois avec étouffement. — Malaise général, mais qui est ressenti plus particulièrement à l'estomac. — Les maux d'estomac se manifestent surtout après le repas, ainsi que le soir et la nuit.

VENTRE. — Élancements dans la région hépatique. — **Ballonnement du ventre*, surtout après le repas. — Ventre dur, tendu. — Douleur contractive dans le ventre. — **Coliques spasmodiques.* — **Pincements, tranchées et déchirements dans le ventre*, surtout le matin, au lit, la nuit et le soir, et souvent avec envie pressante d'aller à la selle et diarrhée. — Maux de ventre lancinants, quelquefois avec pâleur du visage, frissons et maux de tête. — *Sensation de froid, avec chaleurs et sensation brûlante dans le ventre.* — Inflammation des intestins. — **Sensation de faiblesse et de vide dans le ventre*, comme une sorte d'atonie. — °*Malaise dans le ventre*, après le déjeuner. — °*Pression comme si tout affluait vers les côtés du ventre.* — **Hernie inguinale.* — **Taches jaunes au ventre.* — Gonflement et suppuration des glandes inguinales. — **Incarcération de flatuosités.* — **Coliques flatulentes*, profondément dans le bas-ventre; empirées en étant couché, avec grondement et borborygmes.

SELLES. — *Constipation. — Selles dures, lentes, interrompues, difficiles à évacuer et par trop sèches. — *Envie pressante et pénible d'aller à la selle. — **Laxité prolongée du ventre.* — *Selles de la consistance de la bouillie. — *Diarrhées séreuses. — **Diarrhées avec chute des forces.* — **Diarrhées muqueuses.* — **Diarrhées sanguinolentes.* — *Selles non digérées. — *Selles verdâtres*, grises ou noires. — *Selles involontaires. — *Écoulement de mucosités par l'anus qui reste constamment ouvert. — *Ténia, ou ascarides du rectum, pendant les selles. — **Écoulement de sang pendant la selle.* — Après la selle, pression, douleur brûlante, et ténésme à l'anus et au rectum, avec grand affaissement. — *Prurit et élançement à l'anus et au rectum. — Crampes et rétrécissement du rectum. — *Sortie et saignement facile des *boutons hémorrhoidaux du rectum et de l'anus*, avec douleur d'excoriation en étant assis ou couché.

URINES. — *Sécrétion plus abondante d'une urine aqueuse.* — Émission fréquente d'une urine peu abondante. — Urine avec sédiment blanc, séreux, sablonneux et rouge, ou bien jaune. — *Urines troubles, avec sédiment briqueté. — Urines pâles, aqueuses ou blanchâtres. — Pellicule irisée sur les urines. — Pissement de sang. — *En urinant, cuisson et sensation brûlante. — *Tension et tressaillement, ou *douleur brûlante dans l'urèthre*, hors le temps de l'émission des urines.

PARTIES VIRILES. — **Forte exaltation de l'appétit vénérien*, avec désir constant du coït. — *Érections trop violentes, le soir ou le matin. — **Pollutions par trop fréquentes.* — *Éjaculation sans énergie et trop prompte pendant le coït. — *Douleurs dans les testicules* et gonflement du cordon spermatique.

RÈGLES. — Déchirement dans les parties génitales et *élançements, depuis le vagin jusque dans la matrice.* — **Règles trop hâtives et trop abondantes*, ou trop peu abondantes et séreuses. — *Écoulement de sang, par la matrice, pendant la grossesse. — Règles de trop longue durée, avec maux de dents et coliques. — Avant les règles, saignement abondant des ulcères, *flueurs blanches*, envie d'uriner et pleurs. — *A l'apparition des règles, tranchées incisives, douleurs dans le dos et vomissements. — *Après les règles, faiblesse, cercles bleus autour des yeux et anxiété. — Règles de trop courte durée. — **Retard des règles.* — *Pendant les règles, *maux de tête* lancinants, fermentation dans le ventre, expectoration de sang, douleurs dans le dos, brisement des membres, *grande lassitude et fièvre*, ou battement de cœur, *frissons*, gonflement des gencives et de la joue, et beaucoup d'autres souffrances. — *Leucorrhée* cuisante, corrosive. — *Nodosités dures et douloureuses dans les seins. — *Inflammation érysipélateuse des

seins, avec gonflement, douleurs brûlantes et élancements. —

°*Abcès dans les seins*, même avec ulcères fistuleux.

LARYNX. — °*Enrouement et grattement dans la gorge*, °quelquefois prolongés. — °*Aphonie*, de manière à ne pouvoir chuchoter que très-bas, en parlant. — °*Catarrhe avec toux*, °fièvre, et crainte de la mort. — °*Sensibilité très-douloureuse du larynx*, qui ne permet pas de parler. — °*Grande sensibilité du larynx*, avec douleur brûlante. — Sécheresse dans la trachée-artère et la poitrine. — °*Expectoration de mucosités par le larynx*. — °*Toux, provoquée par un chatouillement et une démangeaison dans la poitrine*, ou avec enrouement et sensation comme si la poitrine était à vif. — Toux creuse la nuit, qui ne permet pas de dormir. — °*Toux avec élancements dans la gorge*, la poitrine et le scrobicule, quelquefois la nuit seulement. — °*Toux sèche*, quotidienne, et qui dure plusieurs heures, avec douleurs dans l'estomac et le ventre. — *Toux sèche, ébranlante*, comme si la tête allait éclater, provoquée par l'air froid, en buvant, ou en lisant à haute voix. — Toux, avec vomissements. — °*Toux provoquée par le rire*. — °*Toux sèche*, comme par des tubercules ou une inflammation chronique des poumons. — °*Toux avec expectoration purulente et salée*, surtout le matin et le soir. — °*Expectoration verdâtre par la toux*. — Toux avec expectoration de mucosités visqueuses ou de sang, avec cuisson dans la poitrine.

POITRINE. — °*Respiration bruyante et haletante*. — °*Respiration difficile*, surtout le soir, avec angoisse dans la poitrine, aggravée en étant assis. — °*Gêne de la respiration et oppression de poitrine de diverses natures*, surtout le matin, ou le soir, comme aussi pendant le mouvement. — Asthme spasmodique. — Accès de suffocation, la nuit. — °*Pression à la poitrine*. — °*Pesanteur, plénitude et tension dans la poitrine*. — °*Crampes de poitrine*, contractives. — Déchirement dans la poitrine. — °*Lancinations dans la poitrine et surtout dans le côté gauche*, quelquefois de longue durée, ou bien au toucher. — °*Douleur d'excoriation brûlante*, dans la poitrine. — Sensation de fatigue dans la poitrine. — *Angoisse dans la poitrine*. — *Congestion à la poitrine*, avec sensation de chaleur qui remonte à la gorge. — °*Battement de cœur de diverses natures*, surtout après le repas, le matin et le soir, °comme aussi en étant assis, et par suite de toute espèce d'émotions morales. — °*Battement de cœur*, avec gêne de la respiration. — °*Douleur sous le sein gauche*, en étant couché dessus. — °*Taches jaunes à la poitrine*.

TRONC. — °*Douleur de brisement aux reins et dans le dos*, surtout après avoir été longtemps assis, empêchant de marcher, de se lever et de faire le moindre mouvement. — Douleur brûlante

aux reins. — Déchirement et *élancements dans les omoplates*. — *Roideur de la nuque. — Pression sur les épaules. — *Gonflement du cou. — *Engorgement des glandes axillaires, et de celles de la nuque et du cou. — Prurit et élancements sous les aisselles. — Sueur fétide sous les aisselles.

BRAS. — *Déchirement rhumatismal (et élancements) dans les épaules, les bras et les mains, surtout la nuit. — *Douleur brûlante dans les mains* et les bras. — Engourdissement des bras et des mains. — Lassitude et **tremblement dans les bras et les mains*, surtout en tenant un objet. — °Dartres furfuracées au bras. — Congestion de sang aux mains, avec gonflement et rougeur des veines, surtout en laissant les bras pendants. — Douleur de luxation dans les articulations des mains et des doigts, avec tension. — *Gonflement des mains, même la nuit. — °Chaleur des mains. — Froid aux mains, la nuit. — Contraction et tressaillement des doigts. — Doigts morts. — Paralyse des doigts. — *Torpeur du bout des doigts. — Peau gercée aux articulations des doigts. — *Engelures* aux doigts.

JAMBES. — Douleur d'ulcération dans les fesses, en étant assis. — *Douleur de luxation dans les articulations coxo-fémorales*, et celles des genoux et des pieds, avec chaleur extérieure. — Fatigue douloureuse et pesanteur des jambes. — Sensation brûlante dans les jambes et les pieds. — Tension et crampes dans les jambes, surtout dans les genoux. — Secousses dans les jambes, le jour et la nuit, avant de s'endormir. — **Traction et déchirement dans les genoux*, jusque dans les pieds. — *Faiblesse paralytique dans les jambes °et roideur arthritique des genoux. — Dartres au genou. — Taches comme des pétéchies aux jambes. — °Exostose au tibia. — °Tressaillement dans les mollets. — Déchirement et élancements dans les pieds surtout la nuit. — **Gonflement des pieds*, ou seulement des malléoles, surtout le soir, ou après une promenade, quelquefois avec douleur lancinante. — Luxation facile de l'articulation du pied. — *Froid aux pieds, surtout la nuit. — *Douleur d'ulcération à la plante des pieds, en marchant. — °Secousses dans les pieds, le jour et la nuit, avant de s'endormir. — °Torpeur du bout des orteils. — Inflammation et rougeur de la partie charnue du gros orteil, avec lancements. — *Engelures et cors aux orteils*.


173. — PHOSPHORI ACIDUM.

PHOS-AC. — Acide phosphorique. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 2, 20, 30. — *Durée d'action* : 3 à 4 jours dans des maladies aiguës ; 6 à 7 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Camph. coff. — *On l'emploie comme antidote de* : Lach.

COMPARER AVEC : Asa. bell. caus. chin. coff. con. ign. lach. lyc. mere. op. rhus. sep. staph. sulf. thui. veratr. — C'est surtout après : Lach. et rhus., que l'acide phosphorique sera efficace, lorsqu'il se trouvera indiqué. — Après l'acide phosph., conviennent quelquefois : Chin. lach. rhus. veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Arthrite invétérée ; Arthrocace ; *Faiblesse phthisique et nerveuse par suite de fortes maladies aiguës, par perte d'humeur et autres causes débilitantes, surtout lorsqu'elles ont rapidement miné une constitution forte jusqu'alors ; Souffrances par suite d'onanisme ; Faiblesse des jeunes gens qui grandissent rapidement ; Suites fâcheuses d'un chagrin avec soucis et inquiétude ou d'un amour malheureux, etc. ; Dartres ; Ulcères invétérés ; Varices ; Scarlatine et suites fâcheuses de la répercussion de cette maladie ; Fièvres typhoïdes ; Fièvres nerveuses, lentes, par suite de chagrin ; Maladies des os ; Chute et grisonnement des cheveux par suite de chagrin ; Cholérine ; Diarrhées, surtout après un chagrin, ou après la répercussion de la scarlatine ; Diarrhées épidémiques ; Diabète sucré ? ; Pollutions par suite d'onanisme ; Impuissance par suite d'excès dans le coït ; Dysurie des femmes enceintes, etc., etc.*

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions, et déchirements tressaillants dans les membres. — Douleurs crampoïdes, pressives. — *Sensation comme si on raclait avec un couteau sur le périoste.* — Douleurs ostéocopes, brûlantes, déchirantes, la nuit. — *Gonflement des os. — *Sensation brûlante dans toute la partie inférieure du corps, quoique les membres soient froids au toucher. — Gonflement des glandes. — *Brisement dans les membres et les articulations, comme par une paralysie ou par la croissance, surtout le matin et le soir. — Engourdissement et faiblesse des membres. — Pesanteur dans les membres et les articulations, avec grande paresse. — Grande fatigue après la marche. — *Grande faiblesse générale, physique ou nerveuse, avec forte disposition à la trans-

piration, le jour, ou avec sensation brûlante dans le corps. — *Amaigrissement*, avec teint maladif et yeux cernés. — Fort bouillonnement du sang, avec grande agitation. — *Les douleurs sont aggravées dans le repos*, et soulagées par le mouvement, et celles qui se manifestent la nuit sont soulagées par la pression.

PEAU. — Insensibilité de la peau. — *Fourmillement sous la peau*. — Taches rouges et brûlantes aux membres. — **Éruption comme la scarlatine*. — Inflammations érysipélateuses. — *Éruptions de petits boutons et de miliaires réunies en groupes*, et rouges. — Éruptions boutonneuses avec douleur brûlante ou d'excoriation. — Vésicules galeuses. — Dartres humides et sèches. — *Cors aux pieds*, avec élancements et douleur brûlante. — Engélures. — **Condylomes*. — **Furuncles*. — Ulcères lisses, indolents, avec sécrétion d'un pus sale et fond dentelé. — °*Ulcères pruriteux*.

SOMMEIL. — Forte envie de dormir, le jour, le soir de bonne heure, et le matin, avec difficulté de s'éveiller. — *Sompolence*. — Sommeil tardif et insomnie nocturne, à cause d'agitation et de chaleur sèche. — En s'endormant, apparition de chiffres devant les yeux. — *Sommeil profond*. — Tressaillement et mouvements automatiques des mains, gémissements, paroles et chant, ou air tantôt riant, tantôt pleurant, pendant le sommeil, avec yeux moitié ouverts et convulsés. — *Rêves anacieux* de morts, avec peur au réveil. — Rêves lascifs.

FIÈVRE. — *Horripilation et frissons*, quelquefois avec *grelottement*, ou avec *froid aux mains et aux doigts*, généralement le soir, et sans soif. — Sensation de froid, avec frissons et froid dans le ventre. — Chaleur fébrile le soir, sans soif, avec angoisse et grande activité de la circulation du sang. — Frissons alternant avec chaleur. — °*Fièvre maligne avec grande faiblesse, apathie, stupidité, aversion pour la parole, diarrhée*, etc. — **Sueurs nocturnes*. — Sueurs matutinales.

MORAL. — Envie de pleurer, comme par nostalgie. — **Tristesse et inquiétude sur l'avenir*. — **Recherches inquiètes sur sa maladie*. — Agitation et précipitation. — **Morosité taciturne et répugnance pour la conversation*. — **Grande indifférence*. — Impossibilité de supporter le bruit ou la conversation. — **Esprit obtus et paresseux*, sans imagination. — **Manque d'idées et inaptitude aux travaux de tête*. — Illusions des sens.

TÊTE. — **Tête entreprise*, comme après l'ivresse, ou comme après des pollutions immodérées. — Vertige étourdissant, en étant debout ou en marchant, surtout le soir. — *Maux de tête, le matin*. — Maux de tête continuels qui obligent à se coucher, aggravés jusqu'à devenir insupportables par la plus légère commotion, ou par le bruit. — *Pesanteur de la tête*, comme si elle était pleine

d'eau. — *Pression crampoïde et dure dans la tête*, aggravée en pressant dessus, et en tournant la tête, comme aussi par la méditation, et en montant un escalier, mais surtout après minuit, dans la partie de la tête sur laquelle on repose. — Compression dans le cerveau. — Maux de tête déchirants. — *Lancinations* dans les tempes, ou *au-dessus des yeux*. — Tressaillements ou secousses, coups et martellement dans la tête. — Douleurs tractives dans les os de l'occiput. — Cheveux gris, flasques, comme de l'étaupe. — Chute des cheveux.

YEUX. — Yeux ternes, vitreux, abattus. — *Pression dans les yeux*, avec sensation comme si le globe de l'œil était trop volumineux. — *Froid du bord interne des paupières. — *Douleur brûlante dans les paupières et dans leurs angles*, surtout le soir à la lumière. — **Inflammation des yeux*, avec veines injectées dans les angles internes. — Inflammation des paupières. — Orgelet. — Tache jaune à la sclérotique. — *Larmolement. — Pupilles dilatées. — Regard fixe. — Vue trouble, comme à travers un brouillard. — *Myopie*. — Bande noire devant les yeux.

OREILLES. — *Elancements dans les oreilles*, quelquefois avec traction dans les joues, les mâchoires et les dents, *aggravés seulement par le son de la musique*. — Tractions crampoïdes dans les oreilles. — **Impossibilité de supporter la musique*, le bruit et la conversation. — Forte répercussion de tous les sons dans l'oreille. — *Surdité*, pour les sons éloignés. — Cris dans l'oreille, en se mouchant.

NEZ. — Gonflement du dos du nez, avec taches rouges. — *Croûtes sur le nez. — Besoin de mettre les doigts dans le nez. — *Exhalaison fétide par le nez. — Écoulement de pus par le nez. — Épistaxis. — Coryza violent, avec rougeur du bord des narines. — Coryza fluent, avec toux et douleur brûlante dans la poitrine et dans la gorge.

VISAGE. — Visage pâle, hâve, avec yeux caves, bordés d'un cercle bleu, et nez effilé. — Tractions dans les joues et les mâchoires. — Traits irréguliers. — Chaleur à la face, avec *tension de la peau du visage*, comme si elle était enduite de blanc d'œuf desséché. — *Gros boutons à la face. — *Douleur brûlante dans les joues. — *Dartres humides et croûteuses aux joues, aux lèvres et aux commissures des lèvres. — Lèvres couvertes de crevasses suppurantes, avec douleur d'excoriation. — Boutons et croûtes sur la partie rouge des lèvres. — ° Boutons au menton. — Gonflement des glandes sous-maxillaires. — Douleur dans la mâchoire inférieure, comme si elle était débottée.

DENTS. — Odontalgie, avec douleur déchirante, aggravée à la chaleur du lit, et par les choses froides ou chaudes. — Douleurs vio-

lentes dans les dents incisives, la nuit. — *°Dents jaunes.* — **Gencives saignantes*, gonflées et décollées. — Nodosité douloureuse aux gencives.

BOUCHE. — Sécheresse de la bouche, sans soif. — **Mucosités visqueuses, tenaces, dans la bouche et sur la langue.* — Élançements et sensation brûlante sur la langue. — La nuit, on se mord la langue, sans le vouloir. — Gonflement de la langue, avec douleur en parlant. — Nasillement. — Cuisson dans l'intérieur de la bouche, pendant la mastication d'aliments solides. — **Excoriation et ulcération du voile du palais*, avec douleur brûlante.

GORGE. — Douleur d'excoriation dans la gorge, avec cuisson et élançements, surtout pendant la déglutition (des aliments). — Douleur contractive dans la fossette du cou. — Renâchement de mucosités visqueuses.

APPÉTIT. — Goût putride, acide, herbacé. — *Arrière-goût prolongé des aliments et surtout du pain.* — Répugnance pour le pain qui semble amer. — **Forte soif* de lait froid, ou de bière, ainsi qu'en général **de choses rafraîchissantes* et succulentes; le pain paraît trop sec. — **Soif inextinguible*, provoquée par une sensation de sécheresse dans tout le corps. — Les acides provoquent des renvois amers et autres incommodités. — **Après le repas, pression*, où sensation d'un *balancement dans l'estomac*, avec embarras de la tête, malaise, plénitude et envie de dormir, ou abattement, comme si on allait s'évanouir.

ESTOMAC. — *Renvois acides*, incomplets ou brûlants. — **Nausées continues*, dans la gorge. — **Nausées* qui forcent à se coucher. — Vomissement des aliments. — Vomissement acide. — *Pression dans l'estomac, comme par un fardeau*, en étant à jeun, et *après des aliments quelconques*, comme aussi en touchant le creux de l'estomac. — Sensation de froid ou sensation de brûlement à l'estomac.

VENTRE. — Pression crampoïde, avec angoisse, dans les hypochondres, et surtout dans le foie. — Sensation de pesanteur du foie. — Élançements dans les régions du foie et de la rate. — Ventre ballonné et tendu. — Contractions dans le ventre, des deux côtés de la région ombilicale. — *Maux de ventre crampoïdes*, surtout dans la région ombilicale. — Élançements et tranchées dans le ventre. — **Sensation brûlante dans le bas-ventre.* — Gonflement dans le ventre, comme s'il y avait de l'eau, surtout au toucher et en se pliant en avant ou en arrière. — **Grondement fréquent et borborygmes dans le ventre.* — **Production et expulsion de flatuosités abondantes*, surtout après avoir mangé des acides. — Gonflement des glandes inguinales.

SELLES. — Selles dures, par petits morceaux, difficiles à évacuer. — *°Selles fréquentes.* — **Selles diarrhéiques non affaiblissantes.* —

*Selles diarrhéiques, muqueuses, gris blanchâtre. — °Selles diarrhéiques séreuses ou non digérées. — Selles involontaires de la consistance de la bouillie, avec sensation comme si on allait expulser un vent. — Pendant la selle, sortie des boutons hémorrhoidaux du rectum. — Après la selle, ténésme. — Déchirement, cuisson et prurit à l'anus et au rectum.

URINES. — Envie pressante d'uriner, avec émission d'urine moins abondante, pâleur du visage, chaleur et soif. — *Émission fréquente, et *abondante d'une urine aqueuse*, qui dépose immédiatement un nuage épais et blanc. — °Urine *comme du lait*, avec des morceaux sanguinolents et gélatineux. — °Urines fétides. — Flux d'urine, avec douleurs crampoïdes dans les reins. — Besoin pressant et irrésistible d'uriner. — °Urines comme dans le diabète sucré. — Angoisse et inquiétude avant d'uriner. — *Émission d'urine la nuit. — *Douleur brûlante dans l'urèthre, pendant et après l'émission des urines. — Constriction crampoïde dans la vessie. — *Douleurs incisives dans l'urèthre, en urinant.

PARTIES VIRALES. — *Douleurs lancinantes dans le gland*. — Fourmillement et vésicules suintantes autour du frein. — *Condylomes. — Éruption à la verge et au scrotum. — Gonflement inflammatoire du scrotum. — °Douleur des testicules, au toucher. — Douleur rongearde dans les testicules. — Gonflement des testicules, et cordon spermatique gros, dur et tendu. — Absence d'appétit vénérien. — Érections fréquentes sans désir du coït. — *Pollutions fréquentes et très-débilitantes. — Écoulement de sperme, par les efforts que l'on fait pour aller à la selle.

RÈGLES. — °Pendant les règles, douleurs hépatiques. — Leucorrhée jaunâtre, pruriente, après les règles. — °Ballonnement de l'utérus, comme par des gaz.

LARYNX. — *Fort enrouement* et âpreté dans la gorge. — Douleur contractive dans la fossette du cou, qui rétrécit la gorge. — *Toux provoquée par un chatouillement et un grattement dans le larynx, ou au-dessus de l'épigastre, sèche le soir, et avec expectoration blanc jaunâtre, le matin. — *Toux avec vomissement des aliments, et mal de tête. — Expectoration pendant la toux, avec odeur et goût herbacés. — Toux, avec expectoration purulente et douleurs de poitrine.

POITRINE. — °Haleine courte et impossibilité de parler d'une manière soutenue, par faiblesse de la poitrine. — Oppression crampoïde et contractive de la poitrine, comme si elle était serrée. — Faiblesse dans la poitrine, après avoir parlé. — Pression dans la poitrine, souvent crampoïde ou incisive. — Lancinations dans les côtés de la poitrine.

TRONC. — Éruption douloureuse au toucher, au dos, aux omopla-

tes, au cou et à la poitrine. — *Fourmillement dans le dos et aux reins.* — Tension et traction crampoïde dans les muscles du cou, surtout en remuant la tête. — *Miliaire au cou.* — °Furoncles sous l'aisselle.

BRAS. — *Pression crampoïde aux bras, aux mains et aux doigts.* — Tractions et *déchirements tressaillants* dans les bras et les doigts. — Éruptions boutonneuses aux bras. — Douleurs tractives, incisives, dans les articulations des coudes, des mains et des doigts. — Faiblesse et tremblement des bras. — Ganglion sur le dos de la main. — Peau des mains et des doigts, sèche, ridée, aride. — Doigts morts, quelquefois d'un seul côté et d'une manière bien circonscrite. — Lancinations dans les doigts et leurs articulations.

JAMBES. — °Gonflement et °*furoncles aux fesses.* — Douleurs de brisement dans les hanches et les cuisses, surtout en marchant et en se levant de son siège. — Crampe dans l'articulation coxo-fémorale, avec déchirement dans toute la jambe, insupportable en étant assis, et pendant le repos. — Douleurs pressives, crampoïdes, dans les cuisses, les jambes, les pieds et les orteils. — Déchirement dans toute la jambe, avec pesanteur dans les articulations. — Faiblesse des jambes, au point de tomber en faisant un faux pas. — Déchirement brûlant dans le tibia, la nuit. — Boutons aux genoux et aux jambes, qui deviennent confluents et se transforment en ulcères saignant facilement. — °Ulcères pruriteux aux jambes. — Sensation brûlante dans les pieds et la plante des pieds, avec excoriation entre les orteils. — °Gonflement des pieds. — °Sueur aux pieds. — Cors aux pieds. — Engelures aux orteils. — Gonflement de l'articulation du gros orteil, avec battement brûlant, et douleurs incisives et sourdes, au toucher.

174. — PINUS.

PIN. — Le suc dynamisé des jets printaniers du pin. — Médicament encore entièrement inconnu, mais qui a été employé avec succès contre la *Faiblesse musculaire d'un enfant scrofuleux qui tardait trop à marcher.*

175. — PLATINA.

PLAT. — Platine. — HAHNEMANN. — Doses usitées : 6, 30. — Durée d'action : 40 à 50 jours dans quelques affections chroniques.

ANTIDOTE : Puls. — On l'emploie comme antidote de : Plumb.

COMPARER AVEC : Ang. asa. bell. canth. croc. fer. hyos. lyc. magn. mang. natr.

nitr.-ac. *plumb. puls. rhus. sabad. stram. stront. valer.* verb. — C'est surtout après *bell.*, que le platina est efficace, lorsqu'il se trouve indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — *Affections diverses du sexe féminin*, et principalement des femmes irritables, qui ont les règles abondantes et l'appétit vénérien très-prononcé; Souffrances par l'abus du plomb; Suites fâcheuses d'une colère ou d'une mortification; Névralgies et névroses; Catalepsie, éclampsie et autres affections spasmodiques; Spasmes hystériques; Manie; Mélancolie; Hystérie; Céphalalgies nerveuses et hystériques; *Névralgie faciale*; Odontalgies nerveuses et congestives; Péritonite puerpérale?; Colique saturnine; Constipation par suite de voyages en voiture; *Dysménorrhée*; *Métrorrhagie*, même après l'accouchement, ou à la suite d'un avortement; Constipation, nymphomanie; Éclampsie, et autres affections des femmes en couche, etc., etc.

 *Voy. la note, page 47.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs compressives, crampoïdes, constrictives ou pressives*, comme par la présence d'une cheville, ou bien comme de *coups obtus*. — *Douleurs crampoïdes, tressaillantes et tractives, dans les membres et les articulations*. — Tension dans les membres, comme s'ils étaient entourés de ligatures trop serrées. — Douleurs comme après une contusion, un coup, ou une meurtrissure, surtout *en pressant* sur la partie affectée. — Douleurs faibles à leur début, qui augmentent peu à peu, souvent à intervalles réguliers, et diminuent de la même manière. — **Sensation de torpeur et d'engourdissement paralytique à diverses parties*, souvent avec tremblement et battement de cœur. — °Accès de raideur spasmodique des membres, sans perte de connaissance, mais avec serrement des mâchoires, perte de la parole, yeux convulsés et mouvements involontaires des commissures des lèvres et des paupières. — Les accès de spasmes se manifestent surtout au point du jour. — **Affections à la suite d'une frayeur, d'une mortification, ou d'une colère*. — *Affections morales et physiques alternant les unes avec les autres*; quand les unes se manifestent, les autres se dissipent, et *vice versa*. — *Faiblesse excessive*. — Inquiétudes fourmillantes, sensation de faiblesse et tremblement dans les membres, surtout *dans le repos* et en plein air. — La plupart des symptômes sont *aggravés dans le repos*, et soulagés par le mouvement. — Les affections

qui sont soulagées en plein air sont généralement aggravées vers le soir et dans l'appartement.

PEAU. — *Rongement* fourmillant, avec *douleur d'excoriation*, et prurit ou *douleur brûlante, picotante* et lancinante, avec besoin de gratter à diverses parties de la peau. — *Ulcères* (aux doigts et aux orteils).

SOMMEIL. — *Bâillements convulsifs et spasmodiques*, surtout après midi. — Forte envie de dormir, le soir. — Sommeil prolongé, le matin. — Rêves anxieux, de guerres et de sang répandu. — *Rêves lascifs*. — Réveil, la nuit, surtout après minuit, avec pensées anxieuses, tristes et pénibles. — Étourdissement, la nuit, en se réveillant. — La nuit, on est couché sur le dos, les bras passés au-dessus de la tête, les jambes retirées, et on éprouve le besoin de les découvrir.

FIÈVRE. — Frissonnement continu et horripilation par tout le corps, surtout en plein air.

MORAL. — **Tristesse*, surtout le soir, avec grand besoin de pleurer, souvent (tous les deux jours), alternant avec gaieté folle et bouffonnerie. — **Pleurs involontaires*. — **Cris* au secours, de toutes ses forces. — **Angoisse de cœur excessive, avec peur excessive de la mort, qu'on croit très-prochaine*, accompagnée de tremblement, battement de cœur et gêne de la respiration. — **Peur*, avec tremblement des mains et des pieds, et désordre des idées, comme si toutes les personnes qui s'approchent étaient des démons. — **Humeur hystérique*, avec grand accablement moral, faiblesse nerveuse et surexcitation du système vasculaire. — Disposition à s'effrayer. — Grande irritabilité, avec mauvaise humeur longtemps encore après qu'on s'est mis en colère. — Indifférence apathique et distraction. — **Orgueil et trop bonne opinion de soi-même*, avec dédain pour tous les autres, même pour ceux qu'on vénère et qu'on aime le plus, surtout dans l'appartement, moins au grand air et au soleil. — Distraction et oubli. — **Perte de connaissance*. — **Divagations*. — Erreurs des sens; il semble que l'on soit très-grand, et qu'au contraire toutes les autres choses ou personnes soient très-petites et très-basses.

TÊTE. — Embarras tensif, comme s'il y avait un étau devant la tête. — Accès passager de vertige, le soir, avec perte de connaissance. — *Maux de tête qui augmentent peu à peu*, ou par accès, jusqu'à devenir très-violents, et s'affaiblissent dans la même progression. — Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements. — *Sensation de torpeur dans la tête*, et à l'extérieur, au vertex. — Douleur dans les côtés de la tête, comme par la présence d'une cheville. — **Douleurs pressives, crampéïdes*, dans le

front et les tempes, surtout à la racine du nez, comme une *compression*, fortement aggravées par le mouvement et en se baissant, *quelquefois avec chaleur et rougeur de la face*, inquiétude et pleurs. — *Fourmillement dans les tempes*, comme par des insectes. — *Bourdonnement et bruit dans la tête*, comme celui que ferait un moulin. — Sensation de contraction du cuir chevelu, au vertex.

YEUX. — Douleurs dans les yeux après s'être fatigué la vue à regarder un objet. — Tension dans les orbites, avec douleur rongeante d'excoriation aux bords. — **Douleur crampoïde aux bords des orbites*. — Tension compressive dans le globe des yeux. — *Pression dans les yeux avec sommeil*. — Fourmillement dans les angles des yeux. — *Sensation de chaleur ou de froid, et cuisson dans les yeux*. — *Tremblement ou frémissement spasmodique des paupières*. — **Yeux convulsés*. — *Les objets paraissent plus petits qu'ils ne le sont en effet*. — Vue trouble, comme à travers un voile, souvent avec tiraillements indolores autour de l'œil. — Tremblement et scintillement devant la vue.

OREILLES. — *Otalgie avec douleur crampoïde*. — Secousses dans les oreilles. — *Sensation de torpeur et de froid dans les oreilles*, jusque dans les joues et les lèvres. — Fourmillement rongeant dans les oreilles. — **Tonnerre sourd et roulement dans les oreilles*.

NEZ. — Douleur crampoïde, avec sensation de torpeur au nez. — Besoin inutile d'éternuer et fourmillement dans le nez. — **Coryza seo*, souvent d'un seul côté.

VISAGE. — *Visage pâle, hâve*. — *Chaleur brûlante et rougeur ardente de la face*, avec soif violente et sécheresse de la bouche, surtout le soir. — **Distorsion des muscles de la face*. — Sensation de froid, avec fourmillement et **sensation de torpeur* de tout un côté de la face. — *Crampe et pression tensive dans les pommettes*. — **Fouillement pulsatif dans les mâchoires*, surtout le soir, et pendant le repos, avec pleurs involontaires. — Rongement, avec douleur d'excoriation, qui oblige à gratter, aux lèvres et au menton. — Vésicules cuisantes et lancinantes aux lèvres. — Lèvres sèches, gercées. — Réseau veineux rouge bleuâtre, au menton. — Sensation de torpeur ou de froid autour de la bouche et au menton. — **Crampe de la mâchoire*.

DENTS. — **Odontalgie, avec douleur pulsative et fouillante*. — Traction crampoïde, et par accès, dans les dents. — *Crevasses aux gencives*.

BOUCHE ET GORGE. — Douleur brûlante sous la langue. — Sensation sur la langue, *comme si elle était brûlée*. — Sensation, comme si la gorge était à vif, pendant et hors le temps de la déglutition

(à vide). — Traction *crampoïde* dans la gorge, *comme un étranglement*. — Sensation d'allongement de la luette. — Grattement et accumulation de mucosités dans la gorge. — *Rendement de mucosités*.

APPÉTIT. — Goût muqueux, pâteux. — *Goût douceâtre*, sur le bout de la langue. — *Absence de soif*. — Perte de l'appétit, dès la première bouchée. — *Perte complète de l'appétit. — *Répu gnance pour les aliments par l'effet de la tristesse*. — Dégout de la viande. — Boulimie; on mange avec une vitesse vorace, avec disposition à mépriser toutes choses. — *Après le repas, renvois, pression à l'estomac et coliques.

ESTOMAC. — Besoin inutile d'expulser des renvois. — Renvois à vide; bruyants. — Sérosités d'une amertume douceâtre et dés-agréable, qui remontent dans la gorge, et font qu'on s'engoue facilement. — *Nausées* continuelles, avec lassitude, tremblement et anxiété. — **Pression à l'estomac*, surtout après le repas. — *Douleur contractive au scrobicule, comme si l'on était trop serré*. — Pression ou secousses, ou bien battement, élancements et pincements au scrobicule. — Sensation brûlante dans le scrobicule, quelquefois aussi depuis la gorge jusque dans le ventre.

VENTRE. — *Maux de ventre, avec pression sourde et saccadée*. — Ballonnement du ventre, avec expulsion difficile et interrompue des flatuosités. — **Constriction dans le ventre*. — *Pincements dans la région ombilicale*. — Élancements dans les côtés du ventre et la région ombilicale. — Rongement dans le ventre. — *Tractions dans les aines, partant du sacrum*.

SELLES. — **Constipation*, quelquefois très-opiniâtre. — Besoin fréquent, avec selles peu abondantes, par morceaux, et expulsées seulement avec de grands efforts. — Selles de la consistance de la bouillie. — Ténia et ascarides du rectum, pendant et hors le temps des selles. — *Après la selle, horripilation générale*, ou sensation de faiblesse dans le ventre. — Fréquemment, *fourmillement pruriant et ténésme à l'anus*, surtout le soir. — Lancinations violentes et obtuses dans le rectum.

URINES ET PARTIES GÉNITALES. — Urine rouge, avec nuage blanc, ou bien se troublant et déposant un sédiment rouge. — Écoulement des urines, lent, mais fréquent. — Douleur brûlante et rongement au scrotum. — *Exaltation peu naturelle de l'appétit vénérien*, avec érections fréquentes, surtout la nuit. — *Écoulement de liqueur prostatique. — Coût de trop courte durée et avec peu de jouissance.

RÈGLES. — *Sensation comme si tout se portait vers les parties génitales*, avec pression dans le bas-ventre. — **Exaltation peu naturelle de l'appétit vénérien*, chez la femme, avec sensibilité dou-

loureuse et *fourmillement voluptueux dans les parties génitales internes et externes.* — °Induration de l'utérus. — Congestion sanguine à l'utérus. — °*Avortement.* — °*Métrorrhagies*, d'un sang épais, foncé, avec tractions dans les aines. — °*Règles trop hâtives et trop abondantes*, °quelquefois avec mal à la tête, inquiétude et pleurs. — °*Règles de trop longue durée.* — Avant les règles, tranchées et douleurs comme celles de l'enfantement, dans le bas-ventre. — *Crampes au début des règles.* — °Pendant les règles, pression comme si tout se portait vers les parties génitales, qui sont très-sensibles. — Leucorrhée comme du blanc d'œuf, coulant surtout après avoir uriné et en se levant de son siège.

POITRINE. — °*Aphonie.* — °Toux courte et sèche. — *Haleine courte, avec oppression constrictive de la poitrine.* — Oppression anxieuse de la poitrine, avec sensation de chaleur qui remonte de l'épigastre. — °Respiration courte, difficile et anxieuse. — Douleur de poitrine, comme s'il y avait un fardeau qui pressât dessus, avec besoin de respirer profondément qui est empêché par une sensation de faiblesse. — °Tension, pression et élancements dans les côtés de la poitrine, qui ne permettent de se coucher ni d'un côté ni de l'autre. — Pression et coups obtus dans la poitrine. — Pression crampoïde dans un côté de la poitrine. — Douleur crampoïde dans la poitrine, commençant faiblement, augmentant jusqu'à une certaine intensité, et diminuant dans la même progression. — Lancinations sourdes, dans les côtés de la poitrine, en inspirant. — *Battement de cœur anxieux.*

TRONC. — *Douleur de brisement aux reins et dans le dos, surtout en pressant dessus, ou bien en se penchant en arrière.* — Douleur crampoïde aux reins. — Sensation de torpeur dans le coccyx. — Roideur de la nuque. — Faiblesse et sensation de torpeur tensive dans la nuque.

BRAS. — *Pesanteur et lassitude des bras, avec tiraillement paralytique.* — Pression et douleur crampoïde dans les avant-bras, les mains et les doigts, surtout en tenant solidement un objet. — Rongement pruriant, picotement et sensation brûlante dans les bras, les mains et les doigts. — Sensation de roideur dans les avant-bras. — Battement douloureux dans les doigts. — Distorsion des doigts. — Torpeur des doigts. — *Ulcères aux doigts.*

JAMBES. — Douleur crampoïde et tension dans les cuisses, les pieds et les orteils. — *Faiblesse des cuisses et des genoux, comme si ces parties étaient brisées.* — Secousses et coups dans les jambes. — °Lassitude des jambes. — Agitation et tremblement dans les jambes, avec sensation d'engourdissement et °d'enroissement. — Lassitude et torpeur dans les pieds, en étant assis. — °Froid

aux pieds. — Rongement, excoriation et cuisson aux malléoles, fortement aggravés par le moindre contact. — Battement douloureux dans les orteils. — Gonflement de la partie charnue de l'orteil, avec déchirement et pulsations nocturnes. — *Ulcères aux orteils.*

176. — PLUMBUM.

PLUM. — Plomb. — HARTLAUB et TRINKS. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 30 à 40 jours dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Alum. bell. hyos. op. plat. stram. et *electricitas*.

COMPARER AVEC : Alum. bell. chin. con. fer. hyos. natr-m. n-vom. op. phos. plat. puls. rut. sabad. sep. stram. zinc.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre quelques espèces de *Constipations*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions et déchirement dans les membres, plus violents la nuit*, se transportant parfois à un autre endroit par l'effet du grattement. — Sensation brûlante à diverses parties du corps. — Violentes douleurs ostéocopes, fourmillantes et par accès. — Crampes et douleurs constrictives dans les organes internes. — Transissement, roideur, courbure et raccourcissement de quelques membres. — Paralysies. — Tremblement convulsif et tressaillement des membres, convulsions et crampes, quelquefois suivies de paralysies. — Attaques d'épilepsie. — Évanouissements, surtout dans une assemblée nombreuse. — Pesanteur et paresse dans les membres. — Grande faiblesse avec tremblement des membres. — Après un léger exercice, abattement avec besoin de se coucher, et pulsation dans tout le corps. — Muscles flasques et relâchés. — Amaigrissement général, et surtout des parties paralysées, suivi du gonflement de ces parties. — Gonflements hydropiques, quelquefois de tout le corps. — Sensibilité au grand air. — Les symptômes se développent lentement et disparaissent quelquefois pendant un certain espace de temps, pour reparaître ensuite.

PEAU. — Couleur plombée, bleudtre ou jaune de la peau. — Taches d'un brun foncé, sur tout le corps. — Inflammation facile et suppuration de légères blessures. — Douleur brûlante dans les ulcères. — Excoriations. — Décubitus. — Sphacèle.

SOMMEIL. — Forte envie de dormir le jour; on s'endort facilement,

même en parlant. — *Sommeil et somnolence*, quelquefois avec engourdissement. — Sommeil tardif. — *Insomnie nocturne*, avec crampes abdominales. — Tressaillements pendant le sommeil. — Affluence de rêves, quelquefois lascifs, avec érections. — Paroles pendant le sommeil.

FIÈVRE. — Prédominance des frissons et du froid, surtout dans les membres et en plein air. — Sueurs froides ou visqueuses. — Chaleur fugace, anxieuse.

MORAL. — *Mélancolie taciturne* et abattement. — Grande angoisse et inquiétude, avec soupirs. — Ennui et éloignement pour la conversation et le travail. — Découragement. — Dégout de la vie. — Faiblesse de la mémoire. — Imbécillité. — Démence. — Manie. — Divagations. — Fureur. — *Délires furieux*, parfois avec aspect d'un fou.

TÊTE. — Tête entreprise, lourde, comme par apathie et mélancolie. — *Étourdissement*, au point de tomber sans connaissance. — Ivresse. — Vertiges, surtout en se baissant, ou en regardant en l'air. — *Mal de tête*, comme par une boule qui, de la gorge, monterait dans le cerveau. — *Pesanteur de la tête*, surtout à l'occiput et au front. — Déchirement dans le front et les tempes. — Maux de tête lancinants. — Congestion à la tête, avec pulsation et chaleur. — Grande sécheresse des cheveux. — *Chute des cheveux*, même des sourcils et des moustaches.

YEUX. — *Douleur pressive et très-sensible*, comme si le globe de l'œil était trop volumineux. — *Pesanteur des yeux*, pendant le mouvement. — *Paralysie des paupières*. — Contraction dans les yeux et les paupières. — Déchirement dans les paupières, avec sommeil. — Congestion sanguine aux yeux. — Inflammation des yeux et de l'iris. — Agglutination nocturne des yeux. — Gonflement des yeux. — *Couleur jaunâtre de la sclérotique*. — Occlusion spasmodique des paupières. — Yeux convulsés. — Pupilles contractées. — *Vue trouble*, comme à travers un brouillard, qui force à se frotter les yeux. — *Myopie*. — Cécité, comme par amaurose.

OREILLES. — *Déchirement dans les oreilles*. — Térébration et élanagements dans les oreilles. — Sensibilité au bruit. — Diminution quelquefois subite de l'ouïe. — Surdité.

NEZ. — Nez froid. — Inflammation érysipélateuse du nez. — Vésicules purulentes dans les angles du nez, qui sont rouges. — Odeur fétide du nez. — Perte de l'odorat. — Obturation du nez. — Accumulation de mucosités tenaces dans les narines, et qui ne peuvent être expulsées que par les fosses nasales. — Coryza fluent, avec écoulement de mucosités séreuses.

VISAGE. — *Face pâle, jaune, hippocratique*. — Air d'un aliéné. —

Bouffissure de la face. — Gonflement d'un seul côté de la face. — Peau luisante, huileuse, à l'œil et au toucher. — *Déchirements dans les os des mâchoires*, se dissipant par la friction, ou apparaissant à un autre endroit. — Térébration dans la mâchoire inférieure. — Exfoliation des lèvres. — *Crampes* de la mâchoire. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

DENTS. — Douleurs déchirantes, tressaillantes, dans les dents, aggravées par les choses froides. — Dents enduites de mucosités jaunâtres. — Dents qui se noircissent. — *Dents fétides*, cariées, qui s'ébrèchent. — Vacillement et chute des dents. — Grincement des dents. — Gencives pâles, gonflées. — Nodosités douloureuses et dures aux gencives.

BOUCHE. — *Sécheresse de la bouche*. — Accumulation abondante de *salive douceâtre*, dans la bouche, avec sécheresse du gosier. — Salivation. — Écume dans la bouche. — Mucosités visqueuses dans la bouche, le matin, au réveil. — *Crachement de sang*. — Aphthes et ulcères fétides dans la bouche. — Inflammation, gonflement et pesanteur de la langue. — Langue brune, sèche, avec rhagades. — *Langue verte, ou chargée d'un enduit jaune*. — *Parole empêchée*.

GORGE. — Mal de gorge, comme par un gonflement, ou par la présence d'un corps étranger dans le gosier. — Sensation d'une boule qui remonterait dans la gorge. — Sensation d'étranglement dans la gorge. — *Paralysie du gosier avec impossibilité d'avaler*. — Traction dans la gorge, en mangeant, comme si l'œsophage allait s'arracher. — Sensation comme si un insecte rampait dans l'œsophage. — Inflammation et induration des amygdales.

APPÉTIT. — *Goût douceâtre* ou amer. — Goût sulfureux, acide, dans le fond de la gorge. — *Forte soif* d'eau froide. — *Absence d'appétit*. — Faim violente, même peu de temps après le repas. — Grand désir de pain et de friture.

ESTOMAC. — Renvois avec goût des aliments. — *Renvois à vide*, quelquefois très-violents et douloureux. — *Renvois douceâtres*. — Hoquet. — *Régurgitation d'eau douceâtre* ou aigre. — *Dégoût et nausées fréquentes*, avec envie de vomir, quelquefois avec vomiturition. — *Vomissements continuels et violents des aliments ou de matières verdâtres et noirâtres*, ou jaunâtres, avec douleurs violentes dans l'estomac et le ventre. — Vomissements de bile ou de sang. — *Vomissement de matières fécales*, avec coliques et constipation. — *Douleurs des plus violentes à l'estomac*. — Sensation de pesanteur et pression dans l'estomac, quelquefois après le repas. — Pression sourde et anxieuse dans le scrobicule. — *Crampes d'estomac, constrictives*. — Élançements

depuis le creux de l'estomac jusque dans le dos. — Tranchées et douleur brûlante dans l'estomac. — Inflammation de l'estomac.

VENTRE. — Douleur au foie, avec pression lancinante. — Affections de la rate. — *Douleurs abdominales des plus violentes*, avec rétraction de l'ombilic. — Ballonnement et dureté du ventre. — *Coliques violentes, avec douleur constrictive, surtout dans la région ombilicale, avec forte contraction de l'abdomen*, formant quelquefois des grosseurs et des enfoncements, *aggravées par le moindre contact*, et quelquefois portées, la nuit, au degré le plus violent. — Pincements et tranchées dans le ventre. — Élançements autour de l'ombilic. — Sensation dans la partie supérieure et les côtés du ventre, comme si quelque chose s'en arrachait et tombait. — Pulsation dans le ventre. — Sensation brûlante, ou froid dans le ventre. — (Inflammation des intestins.) — *Nodosités dures dans le ventre*, comme par des indurations internes. — Douleur de brisement dans les muscles abdominaux, aggravée par le mouvement et le toucher. — Production et incarceration continues de flatuosités, avec *grondement et borborygmes dans le ventre*. — Expulsion abondante de *flatuosités très-fétides et chaudes, brûlantes*. — Dans le rectum, besoin très-pressant d'expulser des vents, sans aucun résultat.

SELLES. — **Constipation des plus opiniâtres*. — Envie continuelle et inutile d'aller à la selle. — *Selles difficiles à évacuer, dures, quelquefois en boulettes, comme des crottes de mouton*, et tenaces. — Selles dyssentériques. — *Diarrhées de longue durée*, généralement d'excréments jaunes, ou bien douloureuses, et souvent très-fétides. — Diarrhées sanguinolentes. — Rétraction douloureuse et *constriction de l'anus*. — Chute du rectum.

URINES. — *Rétention d'urine*. — Émission d'urine difficile et goutte à goutte. — Ténésme de la vessie. — Émission d'urine plus fréquente et plus abondante. — Urine aqueuse, ou rougeâtre, enflammée, trouble et quelquefois épaisse. — Écoulement de sang par l'urèthre.

PARTIES GÉNITALES. — Gonflement et inflammation des parties génitales (de la verge et du scrotum). — Étranglement et *constriction dans les testicules*, avec tressaillement dans le cordon spermatique. — Rétraction des testicules. — Excoriation du scrotum. — *Exaltation excessive de l'appétit vénérien, avec érections et pollutions fréquentes*. — Écoulement de sperme insuffisant, pendant le coït. — (Impuissance ?) — Leucorrhée. — Avortement.

LARYNX. — *Enrouement et apreté dans la gorge*. — Aphonie. — *Constriction de la gorge*. — Expectoration abondante de mucosités du larynx, visqueuses, transparentes, ou vert jaunâtre et en

globules. — Toux sèche, convulsive. — *Expectoration de pus par la toux.* — *Toux, avec expectoration de sang.*

POITRINE. — *Respiration difficile*, anxieuse, oppressée et haletante. — Haleine courte. — *Asthme spasmodique.* — Oppression de poitrine, reparaissant périodiquement. — Accès de suffocation. — Pression à la poitrine, surtout en respirant profondément et en riant. — *Élancements dans la poitrine et les côtés*, quelquefois avec étouffement de la respiration. — Bouillonnement dans la poitrine, avec *angoisse dans la région du cœur*, et palpitations sensibles.

TRONC. — Déchirements et élancements aux reins, dans le dos et entre les omoplates. — Déviation de la colonne vertébrale. — Tension dans la nuque et jusque dans l'oreille, en remuant la tête.

BRAS. — Mouvements convulsifs des bras et des mains, avec douleurs dans leurs articulations. — Traction et *déchirement dans les bras* et les doigts. — Faiblesse et paralysie douloureuse des bras et des mains. — Ganglion sur le dos des mains. — Difficulté de remuer les doigts. — Plaques rouges et gonflées aux doigts.

JAMBES. — Traction dans l'articulation coxo-fémorale, en étant couché. — *Sensation douloureuse de paralysie dans les articulations coxo-fémorales, celles des genoux et des pieds*, surtout en montant un escalier. — *Paralysies des cuisses et des pieds.* — Engourdissement des jambes et des pieds. — Déchirement et élancements dans les cuisses et les genoux. — Sensation de torpeur dans les pieds, avec difficulté de s'appuyer dessus. — Crampes dans la plante des pieds. — Gonflement des pieds. — Sueur fétide des pieds. — Distorsion des orteils.

177. — POTHOS FOETIDA.

POTHOS. — Pothos. — JOURNAL DES ÉTATS-UNIS. — *Durée d'action ?*
ANTIDOTE ?

SYMPTOMES. — Tous les symptômes se dissipent à l'air; *le soir, de bonne heure, envie de dormir.* — Irritabilité, esprit de contradiction, violence. — Distraction et absence, telles qu'il entre sans frapper à la porte et n'écoute pas du tout les personnes qui lui parlent. — *Douleurs de tête*, à des parties circonscrites, avec embarras de la tête; pression dans les tempes, plus forte tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre, avec forte pulsation des artères; tiraillements dans le front, comme s'il était attiré par un aimant.

— *Nez*, gonflé au-dessus de l'os, rouge en forme de selle, douloureux au toucher, surtout en haut, près du nez, avec cela la partie cartilagineuse est froide, privée de sang ; en même temps taches rouges sur la joue, et petits boutons à gauche ; éternement violent qui détermine une douleur dans la gorge, le palais, le gosier, jusque dans l'estomac, avec long ressentiment de la douleur au cardia. — Gonflement des glandes du cou et sous-maxillaires. — A la *langue*, sensation de torpeur ; impossibilité de l'amener entre les dents ; érection des papilles ; plus rouge et avec douleur d'excoriation à la pointe et sur les bords. — Brûlement depuis le palais jusque dans le bas de la poitrine. — Mauvais goût du tabac, avec envie de fumer. — *Dans le creux de l'estomac*, douleur comme si quelque chose s'en détachait, en marchant fort. — *Dans le ventre*, ballonnement et tension ; maux de ventre tantôt par-ci, tantôt par-là ; sensation en marchant, comme si les intestins ballottaient, sans douleur. — *Selle*, plus précoce, plus fréquente, plus molle. — *Besoin d'uriner* ; urine très-foncée. — *Chatouillement voluptueux* et douloureux à toute la couronne du gland. — Douleur dans la *poitrine* et au-dessous des aisselles, qui semble être en rapport avec un brûlement dans le gosier ; douleur pressive dans le sternum ; sensation soudaine d'angoisse, avec gêne de la respiration et transpiration, suivie d'une selle qui soulage les symptômes. — Besoin de respirer profondément, avec poitrine creuse, et plus tard, constriction dans le palais et la poitrine ; les symptômes de la respiration sont soulagés au grand air. — Douleur ostéocope à la droite. — Aggravation des symptômes arthritiques.

178. — PRUNUS SPINOSA.

PRUN. — Epine noire. — WAHLE. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : plusieurs semaines dans quelques cas de maladies chroniques.

CLINIQUE. — On a jusqu'ici fait usage de ce médicament contre : — Anasarque générale ; *Ascite*, Diarrhée, etc., etc.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Élançements dans les muscles. — Tremblement dans tout le corps. — Inquiétudes dans le corps, avec haleine courte et oppression de poitrine. — Sommeil après le repas. — Sommeil nocturne tardif, et insomnie. — Réveil de

trop bonne heure. — *Lassitude* le matin, comme après un sommeil non réparateur. — Sommeil plein de rêves et de rêvasseries. — Rêves de furoncles et de choses qui sont sales. — Frissonnement, surtout le soir. — Chaleur sèche de tout le corps, surtout aux parties génitales. — Sueur seulement au visage, pendant le sommeil. — Tristesse, indifférence, mauvaise humeur et morosité.

TÊTE — DENTS. — Pesanteur de la tête et vertiges. — *Pression dans la tête*, principalement au front, à l'occiput et aux tempes. — Violentes douleurs nerveuses dans la tête qui font perdre les idées et les sens. — *La pression dans la tête se manifeste le plus souvent du dehors au dedans.* — Mal de tête comme par la chaleur du soleil. — Douleurs dans les yeux, comme si les globes étaient arrachés. — Étreintes dans les oreilles. — Éternement fréquent. — *Douleurs violentes, névralgiques, ou douleurs de luxation aux dents*, ou bien sensation comme si les dents étaient soulevées et arrachées. — Douleurs picotantes aux dents.

BOUCHE — SELLES. — Élançements et douleur brûlante à la langue. — Langue chargée de mucosités blanchâtres. — Goût muqueux, pâteux, ou amer dans la bouche. — *Satiété prompte en mangeant.* — Nausées continuelles avec dégoût de tous les aliments, et diarrhée. — *Plénitude, ballonnement et oppression dans le creux de l'estomac, avec haleine courte.* — Douleurs pressives dans la région hépatique. — *Violentes coliques spasmodiques*, qui ne permettent de se coucher ni sur le dos ni sur les côtés, ni de marcher, excepté très-lentement; les douleurs diminuent en penchant le thorax en avant. — Coliques pressives à l'épigastre ou dans le côté droit du ventre, même la nuit. — Élançements dans le ventre qui coupent la respiration. — **Gonflement hydropique du ventre,* avec perte d'appétit, urines rares, selles dures et noueuses. — *Incarcération de flatuosités*, avec coliques spasmodiques et crampes de la vessie. — Élançements dans la région inguinale, et pression comme si une hernie allait s'établir. — Selles difficiles, dures et noueuses. — **Diarrhée*, avec coliques et évacuation abondante de matières fécales. — Douleurs crampoïdes dans le rectum. — Après la selle, écoulement de sang par l'anus.

URINES — RÈGLES. — *Crampes de la vessie*, même la nuit. — Urines rares et brunes. — Jet d'urine filiforme. — Urines chaudes, corrosives. — Urine jaune clair, avec dépôt blanchâtre et parfois couleur-bleu de ciel. — Strangurie. — Rétention d'urine spasmodique. — Ténisme de la vessie. — Violentes douleurs brûlantes dans l'urèthre, en s'efforçant d'uriner. — Douleur d'exco-riation dans l'urèthre, surtout au toucher. — Flaccidité de la verge et rétraction du prépuce. — Prurit au scrotum, ainsi que

dans la région des ovaires. — Écoulement d'un sang aqueux et pâle par la matrice. — *Règles trop hâtives* et trop abondantes, avec maux de reins. — Flueurs blanches corrosives et qui teignent le linge en jaune.

LARYNX ET POITRINE. — Grattement et âpreté dans la gorge, avec envie de tousser. — En parlant, douleur dans la poitrine, avec voix faible. — *Toux excitée par un chatouillement au larynx.* — Toux sibilante. — *Respiration oppressive, courte, difficile, anxieuse, haletante.* — Sensation de pesanteur et d'oppression dans la poitrine. — La respiration s'arrête constamment au creux de l'estomac. — Douleurs sous le sternum, et oppression, avec plénitude au scrobicule et ballonnement du ventre.

TRONC ET MEMBRES. — Douleur d'ulcération aux reins. — Roideur au dos et aux reins, comme à la suite d'un tour de reins. — Endolorissement des glandes axillaires. — Tension, douleurs de luxation et sensation paralytique dans diverses parties des bras et des mains. — Prurit aux doigts, comme par des engelures. — Douleurs dans les hanches, la nuit, avant minuit. — Douleurs de luxation aux genoux et aux pieds. — Sensation brûlante dans les jambes.

179. — PULSATILLA.

PULS. — Anémone des prés. — **HAHNEMANN.** — *Doses usitées :* 12, 30. — *Durée d'action :* 4 à 5 jours dans des cas aigus, et plusieurs semaines dans des affections chroniques.


ANTIDOTES : Cham. coff. ign. n-vom. — *La pulsatile est l'antidote de :* Agar. ambr. arg. bell. cham. chin. col. fer. ign. lyc. merc. plat. ran. sabad. stann. sulf. sulf-ac. tart.

COMPARER AVEC : Agar. ambr. amm. ant. arn. [ars. asa. aur. bell. bry. cham. chin. cocc. coleh. con. cupr. fer. ign. kal. lach. led. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. n-mos. petr. plat. rhus. sabad. sep. stann. sulf. sulf-ac. tart. thui. zinc. — C'est surtout après : *Asa. ant. aur. chin. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sulf. tart. et thui.*, que la pulsatile est efficace, lorsqu'elle se trouve indiquée. — Après la pulsatile conviennent quelquefois : *Asa. bry. nitr-ac. sep. thui.*

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections principalement du sexe féminin, ou des personnes d'un caractère doux, portées à la plaisanterie et à des rires ou à des pleurs faciles, avec une physionomie douce, un tempérament flegmatique, inclinant vers la mélancolie, constitution lymphatique, avec teint pâle, yeux bleus et cheveux blonds, éphélides, disposition à des rhumes de cerveau ou à d'autres écoulements muqueux, etc.;

Suites fâcheuses de l'abus des eaux sulfureuses, du mercure, du quinquina, de la camomille, ou de la graisse de porc, ou même du vin; *Souffrances à la suite d'une frayeur* ou d'une mortification, ou d'un refroidissement dans l'eau (bains de pieds, pluie, etc., etc.); Affections rhumatismales et arthritiques, avec gonflement; *Arthrite vague*; Rhumatisme articulaire; Affections spasmodiques; Accès d'épilepsie et d'évanouissement, à la suite de la suppression des règles; Congestions passives, avec enflure des veines; Varices; Anévrismes; *Écoulement muqueux*; Affections scrofuleuses et rachitiques?; Atrophie des enfants; Ictère; *Chlorose*; Inflammations érysipélateuses; Zona?; Éruptions urticaires?; *Morbilles*, et suites fâcheuses de la répercussion de cette maladie; Varicelles conoïdes?; *Éruptions causées par la graisse de porc*; Engelures; Rhagades?; *Suppurations*; Ulcères enflammés, ou putrides; Suites de contusions, de chutes, de coups; Fièvre comateuse; Fièvres inflammatoires, avec affections gastriques, muqueuses, ou bilieuses; Fièvre typhoïde; *Fièvres intermittentes*, même après l'abus du quinquina ou du sulfate de quinine; Fièvre hectique; Manie, mélancolie, hystéries et autres affections morales, par suite de la suppression des règles; Congestion cérébrale; Apoplexie?; *Céphalalgies*, même par suite de l'abus du mercure, ou d'une indigestion; *Migraine*; *Ophthalmies et blépharophthalmies*, avec sécrétion muqueuse abondante; Ophthalmie par suite de la suppression d'une gonorrhée; Orgelet?; Cataracte?; Obscurcissement de la cornée?; Fistule lacrymale?; Amblyopie amaurotique (avec héméralopie?); *Otalgie inflammatoire*; *Otorrhée purulente*; *Durété de l'ouïe*, même par suite d'un froid, ou après la répercussion des morbilles; Ozène?; *Hémorrhagie nasale*, Coryza aigu ou chronique; *Dispositions à s'enrhumer facilement*; *Odontalgie rhumatismale*; *Angines catarrhales*; Affections gastrico-muqueuses, ou bilieuses, avec vomissement ou diarrhée; *Indigestions par l'abus de la graisse de porc ou des pâtisseries grasses*; Refroidissement de l'estomac par des glaces, des fruits, des acides, etc.; *Dyspepsie*, avec vomissement des aliments, même pour avoir fait abus de vin; Hématémèse; *Gastralgie*; Gastrite?; Affections hépatiques chroniques; Ictère; Coliques spasmodiques ou venteuses; Entérite?; Péritonite?; *Diarrhées muqueuses*, bilieuses; Dysenterie; Suites fâcheuses de la suppression du flux hémorrhoidal; Ischurie, dysurie et strangurie; Incontinence d'urine chez les enfants (pissement au lit); *Catarrhe de la vessie*; Gonorrhée et suites fâcheuses de la suppression de cette maladie; Hydrocèle, et gonflement inflammatoire des testicules, même par suite d'une compression ou d'une contusion; Prostatite; Priapisme; Pollutions fréquentes par suite d'onanisme; *Dysménie*, *aménorrhée* et *dysménorrhée*, et beaucoup de souffrances par suite de la suppression des règles ou de

l'irrégularité du flux menstruel, principalement dans l'âge de la puberté ou du retour; Métrite?; Métorrhagies, principalement dans l'âge critique; fleurs blanches; Affections morales, odontalgies, souffrances gastriques, coliques, spasmes hystériques, dysurie et beaucoup d'autres souffrances de femmes enceintes ou en couche; Douleurs d'enfantement spasmodiques; tranchées trop prolongées et trop violentes; Manque de douleurs d'enfantement; Adhérence du placenta; Suppression des lochies?; Péritonite puerpérale; Agalactie; Souffrances par suite du sevrage; Excoriations des enfants qui ont fait abus de la camomille; Ophthalmie des nouveau-nés?; Affections catarrhales avec toux humide; Grippe; Coqueluche?; Hémoptysie; Affections asthmiques; Pneumonie?; Souffrances phthisiques?; Affections organiques du cœur; Cardite?; Déviation rachitique de la colonne vertébrale; Gonflement inflammatoire ou œdémateux des jambes et des pieds; Psorite?; Sciatique?; Coxalgie.

 *Voy. la note, page 47.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — **Douleurs tractives et tressaillantes, dans les muscles, aggravées, la nuit, ou le soir au lit, ainsi qu'à la chaleur de la chambre, soulagées au grand air, et accompagnées souvent de torpeur avec faiblesse paralytique, ou de gonflement dur des parties affectées. — *Élancements et sensation de froid dans les parties affectées, au changement de temps. — *Tension dans quelques membres, comme si les tendons étaient trop courts. — *Douleurs erratiques, qui passent rapidement d'un endroit à l'autre, souvent avec gonflement et rougeur dans les articulations. — Soubresaut des tendons. — *Accès de douleurs, avec frissons, gêne de la respiration, pâleur du visage, et tremblement des jambes. — *Plus les douleurs sont violentes, plus les frissons sont forts. — *Douleurs de meurtrissure ou d'ulcération sous-cutanée, en touchant les parties affectées. — *Douleurs et souffrances semi-latérales. — Aggravation et renouvellement des souffrances dans la position assise, après des exercices prolongés; ou en se levant, après être resté longtemps assis, ainsi que dans le repos, et principalement en étant couché sur le côté, ou sur le dos. — Les souffrances qui ont apparu en étant couché sur le dos s'améliorent en se couchant sur le côté, ou en se redressant, et vice versa. — Le mouvement, la marche, la pression, la chaleur extérieure et le grand air, améliorent également beaucoup de souffrances, tandis que quelquefois d'autres s'aggravent sous ces mêmes conditions. — C'est ordinairement le soir, ou la nuit, avant minuit, quelquefois aussi le matin et après le repas, que l'on est le plus souffrant. — *Aggravation des souffrances, tous les deux jours, le soir. — Agi-*

tation et malaise dans tout le corps, avec impossibilité de dormir ou de se reposer, et besoin continu d'étendre les membres. — Pulsations fréquentes et pénibles par tout le corps, plus fortes pendant le mouvement. — * *Grande disposition des membres à s'endormir.* — Tremblement fréquent des membres, avec anxiété. — Paresse et lourdeur des membres, avec faiblesse paralytique, sensibilité douloureuse des articulations et marche vacillante. — Fatigue matutinale, qui augmente dans la position couchée. — * *Accès d'évanouissement, avec pâleur mortelle du visage.* — * *Convulsions épileptiques, avec mouvements violents des membres, et suivies de faiblesse, de rapports et d'envie de vomir (après la suppression des règles).* — Grande sensibilité et répugnance pour le grand air. — Grand besoin de rester couché ou assis. — * *Douleur de meurtrissure dans les os des extrémités.* — *Amaigrissement.*

PRAU. — *Prurit le plus souvent brûlant ou picotant (comme par des piqûres de fourmis), principalement le soir et la nuit, à la chaleur du lit, aggravé en se grattant.* — * *Taches rouges comme des morbilles, ou des urticaires.* — Rougeur fréquente, même des parties froides. — * *Éruptions semblables aux varicelles conoïdes, avec prurit violent, au lit.* — * *Engelures, avec gonflement rouge bleuâtre, chaleur et douleur brûlante ou pulsative.* — * *Érysipèle flegmoneux, avec dureté, chaleur brûlante et douleur lancinante en touchant ou en remuant la partie malade.* — Furoncles. — Rougeur luisante, dureté et prurit autour des ulcères, avec saignement facile et douleurs lancinantes, brûlantes et rongeantes. — * *Ulcères enflammés, ou putrides.* — Varices.

SOMMEIL. — * *Somnolence continuelle et sommeil comateux, avec agitation et rêvasseries inquiètes, le jour ou la nuit.* — *Grande envie de dormir, le jour, principalement le soir, ou après midi.* — Sommeil irrégulier, le soir de trop bonne heure, ou le matin trop tard, et quelquefois avec insomnie nocturne. — * *Sommeil tardif, quelquefois pas avant deux heures après minuit, et souvent avec réveil de bonne heure.* — * *Une grande affluence d'idées empêche de dormir le soir et la nuit.* — * *Sommeil agité, avec réveil fréquent et état d'engourdissement en s'éveillant.* — Impossibilité de dormir autrement qu'en étant assis, la tête penchée en avant ou de côté. — * *Pendant le sommeil, paroles, délires, mouvements convulsifs de la bouche, des yeux et des membres, pleurs, cris et gémissements, cauchemar, sursauts avec effroi, secousses dans le corps et tressaillement des membres.* — * *La nuit, grande agitation et jactation, inquiétude et angoisse de cœur, bouillonnement de sang, chaleur sèche, prurit, divagations et idées fixes.* — *En dormant, coucher sur le dos, les genoux levés et les bras posés sur*

la tête ou croisés sur le ventre. — * *Rêves fréquents, effroyables, anxieux, confus, vifs, dégoûtants, voluptueux, de querelles et d'affaires du jour, de spectres et de morts.* — *Bâillement fréquent.*

FIÈVRE. — * *Froid, frissons et horripilations, principalement le soir, ou après midi, et quelquefois avec pâleur du visage, vertiges et étourdissement, douleur et pesanteur à la tête, anxiété et oppression de poitrine, vomissement muqueux, besoin de se coucher, et chaleur passagère.* — Froid et frissons partiels, principalement au dos, aux bras, aux jambes, aux mains et aux pieds, souvent avec chaleur de la tête ou du visage et rougeur des joues. — *Froid semi-latéral, avec torpeur du côté affecté.* — * *Chaleur sèche, principalement la nuit, le soir au lit, ou le matin, et souvent avec accès d'angoisse, mal à la tête, face rouge et bouffie, ou sueur au visage, frissons en se découvrant, brûlement aux mains avec gonflement des veines, lamentations, soupirs et gémissements, sommeil profond ou agité, respiration anxieuse et précipitée, accès d'évanouissement avec obscurcissement des yeux, envie de vomir et selles diarrhéiques.* — * *Chaleur partielle, principalement au visage avec rougeur des joues, aux mains, aux pieds, etc., et souvent seulement d'un côté, avec froid ou frissons aux mêmes parties de l'autre côté.* — * *Accès fébriles, composés de chaleur qui est précédée de frissons avec adipsie et mêlée ou suivie de sueurs; type quotidien, tierce, ou quarte; exacerbation le soir, ou après midi; rémission le matin, et, dans l'apyrexie, mal à la tête, oppression douloureuse de la poitrine, toux humide, amertume de la bouche, constipation ou diarrhée.* — * *Symptômes fébriles, avec perte de connaissance, délires, pleurs et désespoir, ou avec symptômes gastrico-muqueux ou bilieux, ou avec sommeil comateux.* — *Répu gnance pour la chaleur extérieure.* — * *Pouls accéléré et petit, ou plein et lent, ou faible et presque supprimé.* — * *Sueurs principalement la nuit, ou vers le matin; sueurs abondantes et fétides; sueurs semi-latérales, ou partielles (à la tête et au visage), et sueurs avec crampes aux bras et aux mains, fatigue, sommeil comateux, rêvasseries et rougeur du visage.*

MORAL. — * *Mélancolie avec tristesse, pleurs, grande inquiétude sur ses affaires, ou sur sa santé, crainte de la mort, soucis et humeur chagrine.* — * *Rires et pleurs involontaires.* — * *Grande angoisse et inquiétude, le plus souvent dans la région précordiale, et quelquefois avec penchant au suicide, battement de cœur, chaleur et besoin de desserrer les vêtements, tremblement des mains et envie de vomir.* — * *Accès d'anxiété, avec crainte de mourir ou d'être frappé d'apoplexie, avec bourdonnement d'oreilles, frissons et mouvements convulsifs des doigts.* — *Appréhensions, anthro-*

popphobie, **peur nocturne ou vespertine de revenants*, avec envie de se cacher ou de s'enfuir, méfiance et soupçons. — **Folie taciturne*, avec air morne, froid et égaré, soupirs et souvent position assise, les mains jointes et ne se plaignant de rien. — °*Désespoir de la félicité éternelle*, avec prières continuelles. — *Découragement, indécision*, horreur des affaires et gêne de la respiration. — Caractère envieux, mécontent et avide, de manière à vouloir prendre tout pour soi. — Humeur capricieuse, avec désir tantôt de ceci, tantôt de cela, et refus de ces choses dès qu'on les a obtenues. — **Humeur hypochondriaque et morosité*, principalement le soir, souvent avec *répugnance pour la conversation, grande susceptibilité de caractère*, disposition à se fâcher, cris et pleurs. — **Mauvaise humeur*, quelquefois avec horreur du travail, et *dégoût ou mépris de toutes choses*. — Inadvertance, précipitation et distraction. — En parlant, difficulté à s'exprimer correctement et omission de plusieurs lettres en écrivant. — °*État d'étourdissement*; on ne sait ni où l'on est, ni ce que l'on fait. — Grande affluence d'idées très-mobiles. — **Divagations nocturnes*; °*délires violents et perte de connaissance*. — °*Visions effrayantes*. — Faiblesse de mémoire. — Idées fixes. — °*Stupidité*.

TÊTE. — **Fatigue de la tête par des travaux intellectuels*. — **Sensation de vide et d'embarras dans la tête*, comme après des veilles prolongées ou des débauches, et quelquefois avec indifférence. — — **Vertiges tournoyants, comme dans l'ivresse*, ou vertiges au point de tomber, et chancellement, principalement le soir ou le matin, en se redressant, en se levant après avoir été couché, *en étant assis, en se baissant*, en se promenant au grand air, ou après le repas, ainsi qu'en levant les yeux, et souvent avec *grande pesanteur*, et chaleur à la tête, pâleur du visage, envie de vomir, sommeil, obscurcissement des yeux, et °bourdonnement d'oreilles. — °La méditation et la conversation augmentent les vertiges. — °Accès d'étourdissement et perte de connaissance, avec rougeur bleuâtre et bouffissure du visage, perte du mouvement, battements de cœur violents, pouls presque éteint et respiration râ-lante. — *Douleur de meurtrissure dans le cerveau*, comme dans les fièvres typhoïdes ou par suite d'un enivrement par de l'eau-de-vie. — **Mal de tête, comme dans une indigestion* par des choses grasses. — **Douleur dans la tête, comme si le front devait éclater, ou comme si le cerveau était tendu, comprimé*, ou contracté. — **Élancements ou douleurs vives, tractives et tressaillantes*, ou fourmillement, *pulsation et térébration* dans la tête. — **Bruissement, bourdonnement et pétilllement* dans la tête; ou sensation douloureuse comme si un courant d'air traversait le cerveau. — *Les maux de tête ne sont souvent que *semi-latéraux*, se propageant

jusqu'à l'oreille et aux dents, ou ils occupent le front au-dessus des yeux jusque dans les orbites, ou bien ils se font sentir à l'occiput, avec contraction douloureuse dans la nuque. — *Apparition ou aggravation des maux de tête, *le soir après s'être couché*, ou la nuit, ou le matin au lit, ainsi qu'en se baissant, en remuant les yeux ou la tête, en se promenant au grand air, *et pendant un travail de tête; la compression les soulage quelquefois. — *Maux de tête avec nausées et vomissement, *ou avec congestion et chaleur à la tête, ou bien avec horripilation et accès d'évanouissement, *vertiges, obscurcissement des yeux et bourdonnement des oreilles, photophobie et larmoiement. — Douleur au cuir chevelu en rebroussant les cheveux. — Démangeaison et prurit à la tête. — Pustules purulentes et petites tumeurs, avec douleur d'ulcération au cuir chevelu.

YEUX. — Douleur aux yeux, comme si on les grattait avec un couteau. — Sensation brûlante, **douleur pressive* comme par du sable, ou *douleur vive ou lancinante dans les yeux*, ou bien térrébration et douleur incisive. — Prurit brûlant aux yeux, principalement le soir. — **Inflammation des yeux et des bords des paupières*, avec rougeur de la sclérotique et de la conjonctive, et sécrétion muqueuse abondante. — *Gonflement et rougeur des paupières. — *Trichiasse à la paupière. — *Crystallin obscurci, couleur grisâtre. — Orgelets avec inflammation de la sclérotique et douleurs tensives, tractives, en remuant les muscles de la face. — **Sécheresse des yeux et des paupières*, surtout lorsqu'on a sommeil. — **Larmoiement abondant*, principalement au vent, ainsi qu'au grand air, au froid et à la clarté vive du jour. — *Larmes âcres et corrosives. — Absès près de l'angle de l'œil, comme une fistule lacrymale. — Agglutination nocturne des paupières. — *Pupilles contractées* ou dilatées. — *Regard fixe et stupide. — *Obscurcissement des yeux et perte de la vue*, quelquefois avec pâleur du visage et envie de vomir. — Vue pâle (aspect blême de tous les objets). — *Perte de la vue au crépuscule, avec sensation comme si les yeux étaient couverts d'un bandeau. — **Vue trouble*, comme à travers un brouillard, ou *comme par quelque chose que l'on pourrait enlever par le frottement*, principalement au grand air, le soir, le matin, ou en se réveillant. — Diplopie. — *Cercles lumineux devant les yeux, et diffusion de la lumière des bougies. — Grande sensibilité des yeux à la lumière, qui cause des élancements.

OREILLES. — Douleur dans l'oreille, comme si quelque chose allait en sortir. — **Élancements* avec prurit ou *douleur vive, tressaillante*, et *étréintes dans les oreilles* et aux environs; les douleurs viennent quelquefois par accès, envahissent toute la tête, pa-

raissent insupportables et font perdre jusqu'à la raison. — **Gonflement inflammatoire, chaleur et rougeur érysipélateuse de l'oreille et du conduit auditif*, ainsi que les parties externes environnantes. — **Gonflement douloureux des os derrière les oreilles.* — **Cérumen dur, noir.* — **Écoulement de pus, de sang, ou d'une humeur jaunâtre, épaisse, par l'oreille.* — *Gazouillement comme par des oiseaux, murmures pulsatifs, tintement, *bruissement et bourdonnement dans les oreilles.* — **Dureté de l'ouïe*, comme par obturation des oreilles. — *Croûtes brûlantes, démangeantes, au tragus (avec gonflement des glandes du cou).* — *Elancements dans les parotides.*

NEZ. — *Pression et douleur d'abcès à la racine du nez.* — **Ulcération des narines et des ailes du nez.* — **Écoulement d'un pus fétide et verdâtre ou jaunâtre, par le nez.* — *Mouchement de sang et *hémorrhagie nasale, quelquefois avec obturation du nez.* — **Obturation du nez, et coryza sec, principalement le soir, et à la chaleur de la chambre.* — *Coryza avec perte du goût et de l'odorat, ou *avec écoulement de mucosités épaisses et fétides.* — **Chatouillement au nez, et éternement fréquent, principalement le soir et le matin.* — *Frissonnement continu pendant le coryza.* — *Odeur continuelle devant le nez comme d'un vieux rhume, ou comme d'un mélange de café et de tabac.* — *Gonflement du nez.*

VISAGE. — **Visage pâle, et quelquefois avec air souffrant.* — **Pâleur du visage, alternant avec chaleur et rougeur des joues.* — *Sueur à la face et au cuir chevelu; horripilation ou sueur semi-latérale à la face.* — **Visage bouffi et rouge bleuâtre.* — *Mouvements convulsifs et palpitations musculaires au visage.* — *Tension et sensation de gonflement du visage, ou sensibilité douloureuse de la peau, comme si elle était excoriée.* — *Érysipèle à la face, avec douleur lancinante et desquamation de la peau.* — *Nodosités rouges dans la région des pommettes.* — *Gonflement, tension et gerçures aux lèvres, avec exfoliation de la peau.* — *Douleur vive et contractive aux mâchoires.* — *Gonflement des glandes sous-maxillaires et de celles du cou.*

DENTS. — **Douleurs vives, lancinantes dans les dents, ou douleurs tractives tressaillantes, comme si le nerf était tendu et relâché tout d'un coup, ou douleurs pulsatives, fouillantes et rongeantes, souvent avec picotement dans les gencives.* — **Les maux de dents qui affectent les dents saines comme celles qui sont cariées, ne sont souvent que semi-latéraux, et se propagent fréquemment jusqu'au visage, à la tête, à l'oreille, et à l'œil du côté affecté, étant accompagnés quelquefois de pâleur du visage, frissonnement, et dyspnée.* — **Aggravation ou apparition des maux de dents, principalement le soir ou après midi, ou la nuit, ainsi qu'à la*

chaleur du lit ou de la chambre; renouvellement en mangeant, ainsi qu'en prenant quelque chose de chaud, et par le contact du cure-dent; *soulagement par l'eau froide, ou à l'air frais*. — Quelquefois, les maux de dents s'aggravent aussi par l'eau froide, ainsi que par l'air frais, ou le vent; mais ces cas sont plus rares. — Sensation brûlante ou de gonflement, douleur d'excoriation et pulsation aux gencives. — Vacillement des dents.

BOUCHE. — *Sécheresse de la bouche, le matin. — Mauvaise odeur, et même *fétidité putride de la bouche*, principalement le matin, ou la nuit et le soir au lit. — *Écoulement d'une salive *douceâtre et aqueuse par la bouche*, quelquefois avec envie de vomir. — Sensation comme si la langue était plus large. — Insensibilité de la langue, comme si elle était brûlée. — *Langue chargée d'un enduit épais, de couleur grisâtre, blanchâtre, ou jaunâtre. — Accumulation de mucosités tenaces dans la bouche et sur la langue; ces parties sont comme revêtues d'une peau blanche. — *Gerçures et vésicules douloureuses à la langue. — Sensation comme si le palais était gonflé ou couvert de mucosités tenaces.

GORGE. — *Douleur d'excoriation dans la gorge, comme si tout y était à vif, avec grattement, sensation brûlante et cuisson. — *Rougeur de la gorge, des tonsilles et de la luette, avec sensation comme si ces parties étaient gonflées, principalement en avalant. — Déglutition difficile, comme par paralysie ou par rétrécissement de la gorge. — *Élancements dans la gorge, avec pression et tension en avalant à vide. — *Inflammation de la gorge avec enflure variqueuse des veines. — *Sécheresse dans la gorge, ou accumulation d'un mucus tenace qui revêt les parties affectées. — *Les maux de gorge s'aggravent ordinairement le soir ou après midi.

APPÉTIT. — *Goût de la bouche fade, muqueux, putride, empyreumatique, terreux, ou comme du pus. — *Goût douceâtre, acide ou amer, de la bouche et des aliments, principalement de la viande, du pain, du beurre, de la bière et du lait, substances qui souvent aussi paraissent insipides ou causent du dégoût. — Amertume ou aigreur de la bouche immédiatement après avoir mangé, ainsi que le matin et le soir. — Goût amer du vin, et goût putride de la viande. — Les aliments paraissent ou trop salés ou insipides. — *Manque d'appétit et dégoût des aliments. — Faim et désir de manger, sans que l'on sache quoi. — Faim canine, avec douleur rongeannte à l'estomac. — *Adipsie complète, ou soif excessive avec humidité de la langue, et désir de la bière, ou de boissons spiritueuses, piquantes et acides. — *Sensation d'un dérangement d'estomac,

semblable à celui que causerait la viande de porc ou des pâtisseries grasses. — Dégout et répugnance pour la fumée du tabac. — *Après avoir mangé, nausées et rapports, régurgitation et vomissement, ballonnement et pression dans le creux de l'estomac, coliques et flatuosités, mal à la tête, gêne de la respiration, mauvaise humeur et mélancolie, ou rires et pleurs involontaires, et beaucoup d'autres souffrances. — °C'est surtout le pain qui pèse sur l'estomac.

ESTOMAC. — *Rapports fréquents, quelquefois avortés, ou avec goût des aliments, ou acides, ou amers, et principalement après le repas. — Régurgitation des aliments. — Écoulement d'eau de l'estomac, comme des pituites. — *Hoquet fréquent, principalement en fumant du tabac, après avoir bu, ou la nuit; °et quelquefois avec accès d'étouffement. — *Nausées et envie de vomir insupportables, quelquefois jusqu'à la gorge et dans la bouche, avec sensation pénible comme si un ver remontait dans l'œsophage. — Accès de contraction et d'étranglement dans l'œsophage. — *Vomissements, quelquefois violents, de matières verdâtres, muqueuses, ou bilieuses et amères, ou acides. — *Vomissement des aliments. — Vomissement de sang. — *Les nausées et les vomissements ont principalement lieu le soir ou la nuit, ou après avoir bu ou mangé, ainsi que pendant le repas, et souvent ils se manifestent avec frissonnement, pâleur du visage, coliques, douleurs aux oreilles ou au dos, sensation brûlante dans la gorge et borborygmes. — *Sensibilité douloureuse de la région stomacale à la moindre pression. — *Douleurs pressives, crampoides, contractives et compressives, dans l'estomac et la région précordiale, principalement après le repas, ou le soir, ou le matin, et souvent avec vomissement ou nausées, et gêne de la respiration. — Fourmillement, ou pulsations dans le creux de l'estomac, ou élancements en faisant un faux pas. — °Douleur à l'épigastre qui s'aggrave fortement en étant assis (pendant la grossesse).

VENTRE. — Tension tractive dans les hypochondres, ou élancements pulsatifs, comme dans un abcès. — Ballonnement dur du ventre, principalement à l'épigastre, avec tension et sensation de plénitude. — *Douleurs crampoides et compressives, quelquefois au fond de l'hypogastre, avec pression sur le rectum, ou tranchées, principalement autour du nombril, ou douleurs vives et lancinantes dans le ventre. — *Les coliques sont souvent accompagnées de vomissement ou de diarrhées; elles se manifestent le plus souvent le soir, ou après avoir bu ou mangé, et quelquefois le serrement du ventre ou le repos les soulagent, tandis que le mouvement les aggrave. — Gonflement annulaire autour du nombril, douloureux en marchant. — Rétraction et endolorissement

du ventre, avec *grande sensibilité des téguments du ventre*, qui paraissent gonflés, avec *douleur de meurtrissure* en y touchant, en bâillant, en chantant, en toussant, et à tout mouvement des muscles abdominaux. — *Coliques flatulentes*, principalement le soir, après le repas, ou après minuit, ou le matin, avec douleurs pressives, produites par des flatuosités incarcérées, *rumeur, borborygmes* et *grondement* dans le ventre, et sortie de flatuosités fétides. — Pustules purulentes dans les aines.

SELLES. — *Constipation et selles difficiles, quelquefois avec pression douloureuse sur le rectum et douleurs au dos. — *Envie fréquente d'aller à la selle*, même la nuit. — Selles involontaires et inaperçues, pendant le sommeil. — **Selles diarrhéiques*, même la nuit, et quelquefois avec *coliques* et *tranchées*, frissons et horripilations, et douleurs à l'anus. — **Évacuations fréquentes de mucosités blanchâtres*, *jaunâtres, *sanguinolentes*, ou de *matières verdâtres*, hachées, *biliéuses*, ou *aqueuses*, et quelquefois même corrosives. — Avant et après les selles, brûlement, cuisson, et douleur d'excoriation à l'anus et dans le rectum. — *Écoulement de sang par l'anus*, même hors le temps des selles. — **Hémorrhoïdes aveugles* et saignantes, avec prurit, cuisson et douleur d'excoriation. — Sortie des hémorrhoïdes.

URINES. — °Rétention d'urine, avec rougeur et chaleur à la région vésicale, anxiété et douleurs pénibles dans le ventre. — **Ténisme de la vessie*, et *envie fréquente d'uriner*, avec pression douloureuse sur la vessie, et douleur tractive dans le ventre. — *Émission involontaire de quelques gouttes d'urine*, en toussant, en marchant, étant assis, et en expulsant des flatuosités. — **Pissement au lit*. — **Flux abondant d'urines aqueuses*, avec faiblesse dans les reins, et diarrhées, ou *urines rares, rouges ou brunes*, quelquefois avec écume violette. — Urines, avec dépôt rouge, ou couleur de brique ou de violette, ou muqueux, ou gélatineux. — **Urines sanguinolentes*, °avec dépôt purulent, et douleurs dans les reins. — **Écoulement par l'urèthre, comme dans la gonorrhée*. — Rétrécissement de l'urèthre, avec jet d'urine très-mince. — Brûlement pendant et après l'émission d'urine. — Tiraillement et pression dans l'urèthre, le col de la vessie et la vessie. — Pression et constriction dans la vessie, avec endolorissement de la région vésicale. — °Gonflement de la région du col de la vessie, avec endolorissement au toucher, jet d'urine intermittent, et douleur crampoïde jusque dans le bassin et les cuisses, après avoir uriné.

PARTIES VIRILES. — *Prurit et démangeaison au prépuce et au scrotum, principalement le matin et le soir. — **Gonflement inflammatoire des testicules et du cordon spermatique* (quelquefois seu-

lement d'un côté), avec *douleurs pressives et tractives jusque dans le ventre* et les reins, rougeur et chaleur du scrotum, nausées et envie de vomir. — *Gonflement hydropique du scrotum, de couleur bleu blanchâtre. — *Exaltation extraordinaire de l'appétit vénérien, presque comme *priapisme*, avec *érections fréquentes et continues*, désir violent du coït, et *pollutions fréquentes*. — Écoulement de liqueur prostatique.

RÈGLES. — **Douleurs crampoides dans la matrice, ou tension tractive dans l'utérus*, et douleurs comme celles de l'enfantement. — **Métrorrhagie*. — **Sang des règles noir*, avec caillots et mucosités, ou sang pâle et séreux. — *Règles irrégulières, trop tardives ou trop hâtives*, de trop courte ou de trop longue durée, ou *entièrement supprimées*, avec *coliques, spasmes hystériques abdominaux*, douleurs hépatiques, gastralgie, maux de reins, *nausées et vomissements*, *frissons et pâleur du visage*, migraine, vertiges, affections morales, ténésmes de l'anus et de la vessie, points de côté et beaucoup d'autres souffrances, avant, pendant ou après l'époque. — **Flueurs blanches, épaisses comme de la crème*, ou corrosives et brûlantes, principalement à l'époque des règles (avant, pendant ou après), et quelquefois avec tranchées. — Gonflement des mamelles, avec tension et pression, comme si elles se remplissaient de lait.

LARYNX. — *Catarrhe, avec *enrouement*, âpreté, sécheresse, grattement et douleur d'excoriation dans le larynx et la poitrine. — **Accès de constriction du larynx*, principalement la nuit, en étant couché horizontalement. — **Toux ébranlante*, principalement le soir, la nuit; ou le matin, provoquée par une sensation de sécheresse ou un grattement et un chatouillement dans la gorge, aggravée en étant couché, et souvent accompagnée d'envie de vomir avec vomiturition et vomissement, ou d'étouffement comme par la vapeur du soufre, avec saignement du nez et respiration râlante. — **Toux avec élancements dans la poitrine ou les côtés*, et battements de cœur. — **Toux humide*, avec expectoration de mucosités blanches, tenaces, ou de matières épaisses, jaunâtres, d'un goût amer ou putride. — **Expectoration d'un sang noir et de caillots par la toux*. — En toussant, élancements à l'épaule droite ou au dos.

POITRINE. — *Respiration accélérée, courte et superficielle (pendant la fièvre), ou râlante et anxieuse. — **Gêne de la respiration, haleine courte*, étouffement comme par la vapeur du soufre, et accès de dyspnée et de suffocation, avec anxiété, *constriction crampoïde de la poitrine ou du larynx*, hoquet violent, toux, mal à la tête, et vertiges; principalement le soir, après le repas, ou la nuit, étant couché horizontalement. — *Le mouvement, la

marche accélérée, le grand air et le froid, aggravent les souffrances asthmatiques. — **Tension crampoïde et constrictive dans la poitrine*, principalement en respirant, et quelquefois avec chaleur intérieure et bouillonnement de sang. — Douleur d'ulcération, ou douleur vive et incisive, dans la poitrine. — **Élancements dans la poitrine* et dans les côtés, principalement la nuit et en étant couché, et quelquefois avec gêne de la respiration profonde, impossibilité d'être couché sur le côté malade, toux courte et accès d'étouffement. — Congestion de sang à la poitrine et au cœur, surtout la nuit. — **Accès fréquents et violents de battements de cœur*, principalement après le dîner, ou après des émotions morales, ou provoqués par la conversation, et souvent avec angoisse, obscurcissement de la vue et gêne de la respiration, surtout en étant couché sur le côté gauche. — Anxiété, pesanteur, pression et sensation brûlante au cœur.

TRONC. — **Maux de reins et douleurs dans le dos*, comme après être resté longtemps courbé, ou avec roideur comme par un bandeau. — **Maux de reins, comme ceux de l'enfantement*. — **Élancements dans le dos*, aux reins et entre les omoplates. — **Déviation de la colonne vertébrale*. — **Douleurs rhumatismales, tensives et tractives, à la nuque et au cou*, quelquefois seulement d'un côté, et souvent avec gonflement des parties et douleurs d'ulcération sous-cutanée au toucher. — Craquement dans les vertèbres du cou et les omoplates, en remuant ces parties. — Boutons pruriants au cou. — Gonflement des glandes du cou.

BRAS. — **Douleurs vives, tressaillantes et tractives dans l'articulation scapulaire, ainsi qu'aux bras, aux mains et aux doigts*. — Douleur paralytique à l'articulation scapulaire en levant et en remuant le bras. — **Sensation brûlante au bras, le soir ou la nuit*, avec sensation de sécheresse aux doigts. — **Pesanteur pressive dans les bras, avec sensation de torpeur*, principalement dans les mains. — Sensation de **gonflement*, et douleur de luxation aux articulations des coudes, des mains et des doigts, avec tension et roideur. — Engourdissement facile des doigts, principalement le matin et la nuit. — Vésicules entre les doigts; avec douleurs picotantes. — Douleur de panaris à l'index.

JAMBES. — *Douleur de meurtrissure ou d'ulcération dans le psoas*. — Douleur de luxation à l'articulation coxo-fémorale, avec tressaillements douloureux, comme dans une plaie, jusqu'au genou, principalement dans le repos. — **Tiraillement et tension dans les cuisses et les jambes, principalement aux mollets*, comme si les tendons étaient trop courts. — Douleur de meurtrissure, avec sensation de faiblesse paralytique dans les os et les muscles des cuisses et des jambes. — *Douleur d'ulcération sous-cutanée, dans*

les jambes et la plante des pieds. — Craquement dans les genoux. — **Gonflement des genoux*, quelquefois principalement au-dessus de la rotule, et souvent avec chaleur, inflammation, **et douleurs vives, tractives et lancinantes.* — Faiblesse et fléchissement des genoux, avec marche vacillante. — **Tiraillement et grande fatigue dans les jambes*, et principalement dans les genoux, avec tremblement. — Enflure des veines, et **varices aux jambes.* — Bourdonnement dans les jambes, en restant debout. — *Douleur de meurtrissure dans le tibia.* — Tension et traction dans les mollets. — **Gonflement chaud des jambes*, ou seulement du dos ou de la plante des pieds, quelquefois avec douleurs lancinantes au toucher, et pendant le mouvement. — Sensation de torpeur douloureuse dans la plante des pieds et dans le gras des orteils. — **Gonflement œdémateux des pieds*, principalement le soir. — *Élancements térébrants et douleurs incisives dans les talons.* — *Élancements dans la plante des pieds et le bout des orteils.*

180.—RANUNCULUS ACRIS.

RAN-ACR. — Renoncule âcre. — STAFF. — *Durée d'action ?*

ANTIDOTE ?

SYMPTOMES. — *Chez l'homme* : Céphalalgie ; chaleur insupportable et syncope ; excoriation des articulations, ulcères opiniâtres. — *Chez des chiens* : Efforts de vomissement ; mort précédée d'affaïssement et d'insensibilité ; après la mort, membrane muqueuse de l'estomac, rouge en partie, yeux pleins d'un sang liquide et de places livides. — *Chez un autre chien* : accablement ; mort au bout de 12 heures ; après la mort, l'endroit où on l'avait appliqué (à la cuisse) est enflammé, gonflé, infiltré, l'inflammation s'étendait jusqu'aux téguments du ventre ; cœur plein de sang coagulé, poumons rouges et gorgés de sang.

181.—RANUNCULUS BULBOSUS.

RAN. — Renoncule bulbeuse. — ARCHIVES DE STAFF. — *Doses usitées* : 6, 9. — *Durée d'action* : plusieurs semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Bry. camph. puls. rhus. — *Les boissons alcooliques en aggravent les effets* ; il en est de même de staph., de sulf., et du rinaigre.

COMPARER AVEC : Bry. carb.-v. n-vom. puls. ran-sc. rhus. sassap. sabad. sep. staph.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs de brisement, élancements*

ou douleurs déchirantes, *rhumatismales et arthritiques* dans les membres et les muscles. — Tressaillement des muscles. — Secousses dans tout le corps. — Attaques d'épilepsie. — (Indurations. — Affections ictériques.) — *Douleurs provoquées par le contact, le mouvement, l'extension ou le changement de position*, surtout au tronc et dans les membres. — *Beaucoup de symptômes paraissent aussi au changement de température*, par exemple lorsqu'on passe du froid à la chaleur, et *vice versa*, comme aussi *le matin et le soir*, et après le repas. — Lassitude et brisement dans tous les membres. — Tremblement des membres après un accès de colère, même des plus légers. — Faiblesse subite comme si on allait perdre connaissance.

PEAU. — Prurit fréquent et fort à diverses parties de la peau. — Lancinations à la peau qui se changent en prurit. — *Eruptions vésiculeuses*, comme des ampoules de brûlure. — *Vésicules bleu foncé*, petites, profondes, transparentes, par groupes rapprochés, avec *prurit brûlant* et croûtes calleuses et dartreuses. — Ulcères rongeurs et lisses, avec bords aigus et prurit brûlant et lancinant. — *Excroissances calleuses et autres.* — *Dartres sur tout le corps.*

SOMMEIL. — Envie de dormir le jour. — *Sommeil tardif et insomnie nocturne*, fréquemment par oppression de poitrine, chaleur et bouillonnement de sang, mais le plus souvent sans cause appréciable. — *Réveil fréquent la nuit, et veille prolongée.* — Réveil de bon matin. — Impossibilité de rester couché sur le côté. — *Rêves anxieux*, de péril (par l'eau), ou vifs et lascifs.

FIÈVRE. — Accès de fièvre, consistant principalement *en froid, après le repas ou le soir*, avec douleurs abdominales et autres incommodités. — Chaleur dans la tête, avec froid aux mains. — Frissons le soir, avec chaleur de la face.

MORAL. — Pusillanimité et inquiétude, surtout le soir. — Peur de revenants, le soir. — *Irritabilité colérique et humeur querelleuse*, surtout dans la matinée. — Oppression avec pleurs abondants. — Perte des idées. — Difficulté de la méditation. — *Esprit obtus.*

TÊTE. — Faiblesse, étourdissement et embarras de la tête. — *Vertige tournoyant, au point de faire tomber*, en passant de la chambre au grand air. — Mal de tête avec anxiété et faiblesse, pendant le repas. — Mal de tête semi-latéral, au-dessus de l'œil, avec abattement et envie de pleurer. — Compression et pression expansive dans le sinciput et le vertex. — *Sensation de bouffissure de toute la tête.* — Déchirement et pression dans les tempes. — Coups dans l'occiput. — *Congestion sanguine à la tête.* — La plupart des maux de tête apparaissent *en passant d'un endroit*

chaud au froid, et vice versa. — Fourmillement douloureux ou élancements brûlants au cuir chevelu.

YEUX ET OREILLES. — Prurit aux yeux. — *Pression dans le globe des yeux.* — *Douleur d'excoriation dans les angles des yeux,* cuisante et brûlante. — Inflammation des yeux et larmoiement. — *Élancements dans les oreilles, surtout le soir.* — Sensation crampoïde dans les oreilles et aux oreilles.

NEZ. — Fourmillement pénible et douloureux dans le nez. — *Nez rouge, gonflé et enflammé,* avec douleur tensive et croûtes abondantes dans l'intérieur. — Obturation du nez, surtout dans l'appartement, avec douleur d'excoriation. — Écoulement abondant de mucosités visqueuses par le nez.

VISAGE ET DENTS. — Chaleur de la face, avec rougeur vive des joues. — Fourmillement à la face, principalement au menton et au nez. — Douleurs crampoïdes et tournoyantes dans la face et les mâchoires. — Crampes dans les lèvres. — Maux de dents, le matin, au réveil. — Douleurs incisives et comme d'arrachement, dans les dents molaires.

BOUCHE ET GORGE. — Accumulation abondante d'eau dans la bouche. — Salivation. — *Salive blanche,* avec goût métallique. — *Accumulation de mucosités abondantes dans la gorge.* — Sensation spasmodique de quelque chose qui remonterait dans l'œsophage et dans la gorge. — *Douleurs inflammatoires, brûlantes; dans la gorge et le palais.*

APPÉTIT ET ESTOMAC. — Goût fade, douceâtre ou d'une amertume aigre. — Goût amer, empyreumatique, pendant que l'on mange et après avoir mangé des aliments secs. — Soif augmentée, après midi. — Renvois fréquents. — *Hoquet crampoïde.* — *Nausées fréquentes,* après midi, ou le soir, quelquefois avec maux de tête. Douleurs d'estomac. — *Pression au scrobicule.* — Douleur d'excoriation et sensation brûlante au creux de l'estomac, comme aussi à l'orifice de l'estomac, surtout au toucher. — (Inflammation de l'estomac.)

VENTRE. — *Douleur de brisement dans les hypochondres,* quelquefois au toucher. — Douleur d'excoriation dans l'hypochondre gauche, principalement en remuant le tronc. — *Lancinations dans la région hépatique.* — Pulsations dans l'hypochondre gauche. — Douleurs sourdes dans le ventre, avec sensibilité des intestins pendant la marche. — *Douleurs abdominales pinçantes,* avec mouvements de rotation, et sensation, à la pression extérieure, comme si tout était meurtri et ulcéré dans le ventre. — *Douleur d'excoriation brûlante dans le ventre,* comme dans une inflammation lente. — Expulsion fréquente de vents très-fétides.

SELLES — RÈGLES. — Selles tardives et dures. — *Selles fréquentes et abondantes.* — Dysurie. — Ulcères de la vessie. — *Leucorrhée* âcre et rongeante.

POITRINE. — *Respiration courte et gênée, avec oppression de poitrine* comme après une mortification ou un chagrin, avec *besoin de respirer profondément* et de pleurer abondamment. — Pression à la poitrine. — *Douleur rhumatismale à la poitrine, ou comme d'ulcération sous-cutanée.* — Pression brûlante à la poitrine. — *Lancinations dans la poitrine et le côté droit de la poitrine,* souvent profondément jusque vers le foie. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur des parties inférieures de la poitrine et de l'épigastre. — *Sensibilité douloureuse de toutes les parties externes de la poitrine,* des muscles intercostaux, de la plèvre, etc., se manifestant ou s'aggravant surtout par *le mouvement, le contact et en étendant le corps.* — Douleur dans la poitrine comme par adhérence de la plèvre.

TRONC ET MEMBRES. — Douleur de brisement rhumatismal dans tout le tronc et entre les omoplates. — Douleurs crampoïdes, déchirantes, lancinantes et tressaillantes dans les bras. — Froid aux mains. — Prurit aux mains et aux doigts. — *Dartres à la paume des mains.* — Fourmillement dans les doigts. — *Dartres, ampoules et ulcères aux doigts.* — *Douleurs tractives le long des cuisses.* — Douleurs crampoïdes, térébrantes et prurit dans le milieu des cuisses. — Craquement de l'articulation du genou. — Douleur de roideur dans les articulations des pieds. — Crampes au cou-de-pied. — Lancinations pulsatives dans les talons. — Douleur d'excoriation et de lancinations dans les orteils.

182. — RANUNCULUS FLAMMULA.

RAN-FLAM. — Fétide douce. — STAFF. — *Durée d'action.*
ANTIDOTE ?

SYMPTOMES. — (*Chez des chevaux qui en avaient mangé*); gonflement du corps; inflammation et gangrène des viscères abdominaux.

183. — RANUNCULUS REPENS.

RAN-RE. — Renoncule rampante. — *Durée d'action?*
ANTIDOTE ?

SYMPTOMES. — (Par l'exhalaison) : Cuisson dans les yeux ; larmoiement abondant. — *Le soir au lit* : Sensation au front et aux cheveux comme s'il y courait un insecte, plus faible en se mettant sur son séant ; battement dans la région du sacrum, comme une forte pulsation. — Rêves étant encore éveillé, comme s'il était dans une grande ville et voyait des gens parés, des masques, des Turcs, etc. ; frais et dispos le matin, bien qu'il n'ait dormi que quelques heures.

184. — RANUNCULUS SCLERATUS.

RAN-SC. — Renoncule scélérate. — ARCHIVES DE STAFF. — *Doses usitées* : 6 ? 30. ? —
Durée d'action : 6 à 7 semaines dans des affections chroniques.
ANTIDOTE : Camph.
COMPARER AVEC : Puls. ran. sil. veratr.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — (*Affections arthritiques.*) — *Douleurs térébrantes, rongeantes, lancinantes, fourmillantes*, et qui se manifestent ou s'aggravent vers le soir. — *Douleurs pressives et tractives.* — *Affections périodiques.* — *Tressaillements convulsifs.* — *Évanouissements.* — *Éruptions vésiculaires*, avec sécrétion séreuse, âcre, jaunâtre. — *Ulcères opiniâtres.* — *Insomnie* avec agitation et *jactation après minuit*, quelquefois avec angoisse et chaleur. — *Envie de dormir*, le soir, avec humeur maussade et peu de disposition au travail. — *Bâillements fréquents*, après midi. — *Sommeil incomplet* après minuit, avec *rêves anxieux, effroyables.* — Réveil de bonne heure, avec veille prolongée. — *Fièvre après minuit*, chaleur générale et soif ardente, avec pouls plein, souple, accéléré ; suivie de sueur générale, surtout au front. Frissons pendant le repas. — Pouls plus fréquent, avec sensation comme si l'artère radiale était plus mince. — Horripilation le soir, avec soif et pression au front vers le dehors. — Sensation de froid, le matin après le lever, partant de la nuque et descendant le long du dos. — Chaleur le soir, surtout à la figure, et suivie de sueur avec abattement. — *Paresse et inaptitude au travail*,

le matin, et le soir. — Tristesse, mélancolie, le soir. — *Forte distraction* et disposition à oublier les choses.

TÊTE. — Vertige avec perte des idées. — Mal à la tête, comme si elle était serrée dans un étau. — *Pression rongean*te, tractive, crampoïde, sourde, occupant souvent une place très-restreinte du vertex. — Pression compressive et expansive, dans les tempes. — Pesanteur et *sensation de plénitude dans la tête qui semble être gonflée* et plus volumineuse. — Contraction des téguments de la tête. — Cuisson et prurit au cuir chevelu.

YEUX ET OREILLES. — Douleur dans les yeux en remuant promptement le globe de l'œil. — *Pression dans le globe des yeux*, fréquemment. — *Cuisson dans les angles des yeux*, de temps en temps. — Yeux convulsés. — Larmolement. — Blanc des yeux d'un jaune clair, avec veines injectées et agglutination des paupières. — *Otalgie*, avec pression dans la tête et traction dans les dents. — Tractions, élancements et térébration à l'extérieur du conduit auditif.

FACE ET DENTS. — Cuisson et fourmillement dans le nez. — Picolement au bout du nez. — Éternument fréquent. — Mucosités séreuses, abondantes, dans le nez. — Face comme recouverte de toiles d'araignée. — *Tractions dans la face*, avec sensation de froid. — Tressaillement dans la face. — *Souvent chaleur fugace à la face*. — Tache rouge à côté de l'aile droite du nez, sur laquelle se forme une petite vésicule avec douleur d'excoriation. — Sensation de tremblement autour des commissures des lèvres, et de la lèvre inférieure. — Maux de dents avec douleurs lancinantes et émoussement des dents. — *Tractions tressaillantes* et lancinantes dans les dents. — Gonflement rouge et douloureux, et saignement facile des gencives. — Fourmillement dans quelques racines, comme si elles étaient poussées au dehors.

BOUCHE ET GORGE. — Sécheresse de la bouche. — Salivation écumeuse. — *Langue chargée d'un enduit blanc*. — Inflammation de la langue avec sensation brûlante et rougeur. — Desquamation et rhagades à la langue. — Contraction avec étranglement dans la gorge, aggravée en mangeant du pain. — *Sensation brûlante et grattement dans la gorge*. — Gonflement des amygdales, avec *lancinations*. — Cuisson et élancements dans le gosier. — Mucosités épaisses dans la gorge, difficiles à détacher par le renâclement. — Besoin fréquent d'avaler à vide.

ESTOMAC. — Goût douceâtre, le matin, avec langue blanche, chargée. — *Sensation de faim*, sans appétit, parfois avec renvois. — Absence d'appétit. — Après le repas, émission de vents, ou selles liquides. — *Renvois avec goût des aliments*, après le repas. — *Renvois à vide*, fréquents, surtout après avoir mangé des beur-

rées. — Renvois aigres, rances, le soir. — *Nausées*, surtout après minuit, ou le matin, *avec envie de vomir*. — Douleurs d'estomac, des plus violentes, avec inquiétude. — *Sensation de plénitude, de pression* et de tension à l'épigastre, aggravée par la pression extérieure, avec exacerbation le matin. — Douleurs constrictives à l'estomac. — Lancinations à l'épigastre. — *Douleur d'excoriation et sensation brûlante à l'épigastre*. — (Inflammation de l'estomac.)

VENTRE. — Pression sourde dans la région hépatique, aggravée en respirant profondément. — *Lancinations dans la région hépatique*. — Élançements dans la région de la rate, aggravés en respirant profondément. — Élançements, secousses et pression, dans la région lombaire. — Douleurs abdominales, avec accès d'évanouissement. — *Pression sourde comme par une cheville*, ou sensation de tortillement *derrière l'ombilic*, la nuit ou le matin. — Douleurs abdominales crampoïdes. — Pincement et tranchées dans le ventre. — Tressaillements au ventre.

SELLES — PARTIES GÉNITALES. — Selles retardées. — *Envie pressante et fréquente d'aller à la selle, avec selle molle*. — *Besoin fréquent*, sans qu'il sorte autre chose que des vents. — Prurit à l'anus, comme par des hémorroïdes, avec sensation comme si l'anus était poussé au dehors. — Suintement à l'anus. — Diarrhée séreuse fétide. — *Besoin fréquent d'uriner*, avec émission peu abondante d'urines claires. — Brûlement dans l'urèthre après avoir uriné. — Émission de quelques gouttes après avoir uriné. — Tiraillements dans la verge. — Lancinations dans le gland. — Cuisson au scrotum. — Pollutions.

POITRINE. — Petite toux sèche, rare et sans efforts. — Respiration gênée et profonde. — Soupirs involontaires. — *Douleur de brisement dans la poitrine*, avec sensation de fatigue dans cette partie, surtout le soir. — Pression oppressante à la poitrine. — *Pincements et élançements dans la poitrine et la région du cœur*, quelquefois avec suspension de la respiration, surtout le soir ou la nuit. — Rongement derrière le sternum, qui suspend la respiration. — *Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la poitrine*, surtout du sternum. — Battements de cœur plus fréquents. — Pression comme par une cheville dans la région du cœur.

TRONC ET MEMBRES. — Douleur de brisement et de paralysie aux reins. — Picotement et fourmillement dans le dos et sur la poitrine. — Excoriation de la peau sous l'aisselle droite. — *Élançements térébrants à l'avant-bras*, et jusque dans les doigts. — Térébration dans les os des mains. — Rongement dans la paume des mains. — Rongement, térébration et tressaillement lancinant

dans les os des doigts. — Gonflement des doigts. — *Rongement et térébration* dans toutes les parties des jambes et des pieds, surtout dans les orteils. — *Élancements* tressaillants et fourmille-
ment dans les gros orteils. — Lancinations et douleurs brûlantes dans les cors aux pieds.

185. — RAPHANUS SATIVUS.

RAPHAN. — Rave. — Dr. NUSSEK. — *Durée d'action* : 1 à 15 jours.
ANTIDOTE ?

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Grande lassitude et accablement*, quelquefois avec brisement dans tous les membres; l'enfant se couche le jour, parce qu'il se sent malade; amaigrissement visible. — *Peau*, généralement moite; brûlement passager çà et là; odeur de raifort de tout le corps. — *Envie de dormir*; *somnolence* presque tout le jour, avec paroles grondeuses, en rêve; sommeil agité, avec réveil fréquent, céphalalgie, nausées et pincements dans la région ombilicale; sommeil avec rêvasseries; insomnie depuis 11 heures du soir jusqu'à 2 heures du matin, puis sommeil agité, avec embarras de la tête, froid aux genoux et aux pieds; sommeil seulement jusqu'à 3 heures et avec rêves inquiets; réveil à 3 heures du matin, avec horripilation violente au dos et aux bras; *pendant le sommeil*, *sueur abondante*, ou bien murmure léger, comme s'il s'entretenait avec ses amis. — *Horripilation*, surtout le long du dos, et à la partie postérieure des bras, surtout après avoir bu de l'eau froide; fréquente, avec chaleur intérieure à la tête et générale à la peau; **après l'horripilation*, *chaleur intérieure*, ou bien aussi alternation d'horripilation et de chaleur; *froid* le soir au lit, avec faiblesse dans les articulations, surtout celles du coude, et suivi de sueur très-abondante; froid intérieur, avec peau chaude et moite; on se plaint continuellement du froid, tandis que la peau est constamment brûlante au toucher; *sueur* de l'odeur du médicament (de même que l'haleine); sueur abondante pendant le sommeil, surtout vers le matin. — Pouls: petit et un peu dur; un peu fréquent et dur; ralenti. — **Moral*: forte angoisse, avec peur de la mort; on la croit si prochaine que l'on demande les secours de la religion.

TÊTE — DENTS. — *Tête* entreprise, le matin au réveil, avec douleur sourde dans le front; vertige avec trouble de la vue; douleur violente dans le front; *pression dans le front*, quelquefois surtout la nuit, ou avec embarras de la tête; pression au-dessus des

yeux, avec vue obscurcie, se dissipant après avoir vomi; pression au-dessus de la racine du nez; élancements au vertex; sueur à la tête, après le lever. — *Yeux* enfoncés; rougeur des yeux; œdème de la paupière inférieure; *pupilles* un peu dilatées; vue plus forte, plus longue, chez un myope. — Dans l'*oreille* gauche, déchirements et élancements qui semblent être dans l'os; élancements dans l'oreille droite; prurit à la conque de l'oreille gauche qui est douloureuse au toucher. — **Nez obstrué*. — Odeur de raifort; *éternument* fréquent, ou tout au moins, besoin fréquent d'éternuer. — *Visage*: rouge, sombre; *défiguré*, avec nez pointu et joues jaunes, ou bien avec yeux creux et teint livide, à tel point qu'on se fait peur à soi-même; pâle avec traits anxieux et qui dénotent une grande faiblesse et beaucoup de souffrances; teint jaune, surtout le matin, après le lever; déchirement dans la pommette droite; *glande* à la *mâchoire inférieure*, dure et gonflée. — *Odontalgie* lancinante, dans les molaires gauches.

BOUCHE — VOMISSEMENTS. — *Langue*: *blanche*; **chargée d'un épais enduit blanc*; pâle et rouge bleuâtre; avec sillon profond et points rouge pâle dans le milieu (au début de l'amélioration). — Dans la gorge, *chaleur et brûlement*, quelquefois surtout dans les amygdales et avec élancements; gonflement, rougeur et douleur des amygdales, comme si elles étaient à vif; *mucosités abondantes dans la gorge*, comme dans un catarrhe bronchique; expectoration abondante de mucosités blanches et très-visqueuses, se détachant du gosier et de l'œsophage, le matin, à la suite d'un sommeil lourd et avec douleur d'excoriation dans la gorge. — *Goût*: de raifort; **insipide*; **amer*; très-mauvais; de poivre. — **Anorexie*; répugnance pour les aliments; répugnance pour le tabac à priser (chez un priseur); dans l'anorexie, grand désir de lait bouilli. — **Forte soif, continuelle*. — *Renvois* fréquents d'air venant de l'estomac, avec goût putride. — *Nausée*, comme si on allait s'évanouir, par accès, en sorte que nonobstant une faiblesse extrême, elle est forcée de s'asseoir et ne peut rester couchée; relâchement d'estomac. — **Envie de vomir*: **fréquente*, quelquefois à tout moment; avec perte de la vue et de l'ouïe, quelquefois presque à chaque instant; avec obscurcissement de la vue et de l'ouïe; avec régurgitation d'eau et de mucosités, qui, quelquefois, sont striées de sang; en toussant, avec pression sur la poitrine et régurgitation de mucosités acides et sans couleur. — **Vomissements*: violents des aliments; *des aliments et de mucosités blanches*, quelquefois avec haut-le-cœur violents, forte pression sur la poitrine et froid; de mucosités et de bile; d'abord d'un liquide vert et très-amer, puis d'eau claire; chaque fois avant de vomir, horripilation sur le dos et les bras; **vomissement*

noir (morbus niger); °vomissement de matières stercorales (Miserere)?.

ESTOMAC — PARTIES GÉNITALES. — °*Mauv d'estomac* qui forcent à manger constamment; forte pression à l'estomac, de même que dans le creux; élancement et picotements dans l'estomac et le creux de l'estomac. — *Dans la région hépatique*, élancements, ou bien aussi pression avec douleur d'excoriation. — *Pincements dans le ventre*, surtout à la *région ombilicale*, quelquefois avec élancements et pression à droite de l'ombilic; tranchées violentes et élancements à la région ombilicale, surtout à droite, après le déjeuner; sensation de chaleur dans le ventre, surtout dans la région ombilicale; brûlement au-dessus du nombril; ballonnement et plénitude du ventre, suivis de pincements, comme avant la selle; *borborygmes dans le ventre*, surtout la nuit, ou bien chaque fois avant de vomir; émission de vents par le haut et le bas, avec odeur du médicament, surtout après avoir bu de l'eau; **aucune émission de vents pendant longtemps, ni par le haut ni par le bas* (caractéristique). — *Besoin d'aller à la selle*, très-fréquent, surtout à midi; **fréquentes selles, liquides et abondantes*, quelquefois partant violemment, brun jaunâtre, ou bien brunes et écumeuses (caractéristique); °*diarrhées chroniques, vertes, liquides*, mêlées de mucosités et de sang; °*selles diarrhéiques non digérées*. — *Urine* peu abondante; ou bien aussi **plus abondante que la boisson ingérée*; besoin, avec émission peu abondante; il faut attendre longtemps avant que l'urine arrive; urine pâle; jaune sale, avec sédiment comme du levain de bière; °urine trouble; en urinant, ardeur dans l'urèthre. — Dans le *testicule droit*, tiraillements et déchirements, plus tard aussi dans la plante du pied droit.

LARYNX, POITRINE, EXTRÉMITÉS. — *Toux*, avec mucosités abondantes dans la gorge, comme dans un catarrhe bronchique. — Haleine de l'odeur du médicament. — *Douleurs à la poitrine*: surtout en mangeant et en toussant, moins en buvant; pressives et lancinantes, depuis le creux de l'estomac jusqu'à la fossette du cou, et quelquefois aussi jusque dans le dos; chaleur extérieure au sein droit; palpitations de cœur rapides et violentes. — *Au dos*, brûlement pruriant; déchirement dans les lombes, en se baissant; picotements dans le creux de l'aisselle gauche. — *Tremblement des membres*. — *Au bras*, élancements dans l'articulation du coude gauche, comme dans l'os; faiblesse, déchirements et picotements, immédiatement au-dessus du poignet droit. — *A la jambe gauche*, sensation de paralysie, en étant couché; froid aux genoux et aux pieds, avec envie de dormir, tête entreprise, douleur sourde dans le front et envie de vomir;

crampe au mollet, la nuit, au lit; déchirements dans le côté du pied droit; élancements et fourmillement à la plante du pied droit; *rougeur et gonflement* du talon droit, avec pincements violents en appuyant le pied et en marchant, plus tard il s'y forme une ampoule pleine d'eau claire et un peu rougeâtre, qui disparaît après le lever.

186. — RATANHIA.

RAT. — Kramer à trois étamines. — HARTLAUB ET TRINKS. — Médicament encore très-peu connu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement dans les membres. —

Contractions des muscles fléchisseurs. — Douleurs d'excoriation, lancinantes. — Tressaillement à diverses parties. — *Hémorrhagies*. — Envie de dormir, surtout après le dîner. — Sommeil tardif. — Réveil fréquent et veille prolongée. — Réveils en sursaut, avec tremblement, inquiétude et peur. — Prédominance de froid et d'horripilations, surtout le soir. — Sueur nocturne. — Irritabilité, humeur acariâtre et querelleuse.

TÊTE. — *Douleurs dans la tête, comme si le crâne allait éclater*, surtout en étant assis courbé. — Tressaillement, cuisson et élancements dans la tête. — *Congestion à la tête*, avec chaleur et pesanteur.

YEUX. — Douleurs dans les yeux, comme s'ils étaient pris dans un étau et qu'on ne pût pas les remuer. — Contractions et *sensation brûlante* dans les yeux, surtout le soir. — Inflammation de la sclérotique. — Sensation comme s'il se plaçait une peau devant les yeux. — Agglutination nocturne des yeux, et larmolement matutinal. — *Tressaillement et frémissement des yeux et des paupières*. — Tache blanche devant l'œil qui empêche de voir. — Myopie.

OREILLES — NEZ. — Déchirement dans les oreilles. — Prurit et élancements dans l'oreille. — Tintement nocturne et sonnerie dans les oreilles. — Prurit au nez. — Narines enflammées, croûteuses, avec sensation brûlante. — *Épistaxis*. — Sécheresse du nez, avec éternument fréquent. — Coryza sec, avec obturation complète du nez.

FACE — DENTS. — Chaleur de la face. — Douleur déchirante dans la face et les os des mâchoires. — Vésicules brûlantes sur la partie rouge de la lèvre supérieure. — *Maux de dents, le soir*, surtout

après s'être couché, ou le matin, généralement avec *déchirement* ou *tressaillement*, ou bien avec creusement. — Douleur pulsative dans les dents. — *Saignement des dents*. — Sensation douloureuse de froid et d'allongement des dents. — Sang acide par les gencives, en les suçant.

BOUCHE ET GORGE. — Sécheresse de la bouche, la nuit. — Tension et *sensation brûlante sur la langue*. — Accumulation d'eau dans la bouche. — Mal de gorge, généralement en avalant à vide. — Contraction crampoïde dans la gorge qui arrête la voix.

ESTOMAC. — Goût fade, le matin, au lit. — Soif le soir. — Absence d'appétit avec dégoût des aliments et des boissons. — Renvois avec goût des aliments, ou à vide. — *Hoquet violent*, qui fait éprouver une douleur à l'estomac. — *Nausées et dégoût*, surtout la nuit, avec vomituration et vomissement des aliments. — Vomissement aqueux. — *Douleur d'ulcération à l'estomac*. — *Fort ballonnement de l'estomac*. — *Constriction d'estomac* douloureuse, se dissipant quelquefois par des renvois. — Sensation dans l'estomac et au-dessus du scrobicule comme si le ventre était coupé. — Chaleur et sensation brûlante dans l'estomac.

VENTRE. — Élançements et lancements dans les hypochondres. — Tiraillements et sensation de froid dans la région ombilicale. — Pincements dans le ventre et les côtés du ventre, quelquefois avec sensation brûlante. — Mouvements dans les côtés du ventre, comme par quelque chose de vivant. — Élançements, pincements et contractions dans les aines.

SELLES. — *Selles dures* et interrompues, avec envie pressante et sortie des boutons hémorrhôïdaux. — Envie inutile d'aller à la selle, avec douleurs pénibles aux reins. — *Selles molles, diarrhéiques*, précédées de tranchées, et avec douleurs brûlantes à l'anus, avant et après. — *Diarrhée sanguinolente*. — Après la selle, douleurs dans la tête comme si elle allait se briser.

URINES, RÈGLES. — *Envie pressante et fréquente d'uriner, avec émission peu abondante*. — Émission d'urine plus fréquente et plus abondante, même la nuit. — Urine pâle. — L'urine plus rare dépose bientôt un nuage et devient trouble. — Pression dans les aines, comme si tout se portait vers les parties génitales, suivies de leucorrhée. — *Règles trop hâtives, de trop longue durée et trop abondantes*, avec douleurs dans le ventre et les reins. — *Métrorrhagies*. — *Avortement*.

POITRINE. — Toux sèche, avec chatouillement dans le larynx et douleur d'ulcération dans la poitrine. — Pression à la poitrine, au moindre effort, avec haleine courte. — Constriction douloureuse des deux côtés de la poitrine. — *Élançements dans la poitrine*, surtout en montant un escalier, avec étouffement de la respira-

tion. — Congestion à la poitrine, avec chaleur et gêne de la respiration.

TRONC ET MEMBRES. — Douleur de brisement aux reins et dans le dos. — Tension tractive depuis la nuque jusqu'au bas de l'épine dorsale. — Roideur de la nuque. — Déchirement dans la nuque, avec pesanteur dans la tête. — Déchirement dans l'épaule, les bras et avant-bras, et les poignets. — Contractions crampeuses et douloureuses dans les coudes et les doigts. — Traction et déchirement dans les cuisses, les genoux, les jambes, les pieds et les orteils. — Tension et sensation brûlante dans les cuisses. — Tressaillement dans les cuisses, les mollets et les pieds.

187. — RHABBARBARUM (RHEUM).

RHAB. — Rhubarbe. — **HAHNEMANN.** — Doses usitées : 9, 50. — Durées d'action : 2, 3 jours dans des maladies aiguës.

ANTIDOTES : Camph. cham. n-vom.

COMPARER AVEC : *Ars.* bry. carb-v. *cham.* n-vom. puls. rhus. samb. tart.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre : *Diarrhées* des enfants ou des femmes en couche ; *Aigreurs, colique, insomnie et cris des enfants.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Endolorissement des articulations*, pendant le mouvement. — Douleurs pulsatives. — Palpitations dans les muscles, surtout autour des articulations. — *Engourdissement des membres* sur lesquels on est couché. — Lassitude et pesanteur dans tout le corps.

SOMMEIL. — Sommeil et bâillements. — **Sommeil de nuit agité, avec jactation, cris, gémissements et ronflement*, ou avec tressaillement convulsif des paupières, des muscles de la face et des doigts, surtout chez les enfants. — Mains passées au-dessus de la tête, en s'endormant et pendant le sommeil. — Divagations nocturnes, et ambulation dans le lit, bien qu'on ait les yeux fermés. — Après le sommeil, maux de tête, et étourdissement, ou mucosités fétides, odeur et goût putride dans la bouche. — *Rêves anxieux, tristes, vifs.*

FIÈVRE. — Horripilation, sans froid extérieur. — Frissons et chaleur alternatifs, avec anxiété et répugnance pour toute chose. — Chaleur aux mains et aux pieds, avec visage frais. — *Sueur facile.*

ment excitée par le moindre exercice, surtout au front et au cuir chevelu.

MORAL. — Indifférence. — Paresse et éloignement pour la conversation. — Humeur chagrine, avec pleurs. — Désir impétueux de tel ou tel objet. — Engourdissement des sens, comme dans un demi-sommeil. — Divagations.

TÊTE. — *Obnubilation stupéfiante de la tête*, comme après l'ivresse, avec yeux proéminents. — Vertige à faire tomber de côté, en étant debout. — Mal de tête, comme un étourdissement, avec anxiété. — Maux de tête pressifs, surtout dans le sinciput, les tempes et le vertex. — *Pesanteur de la tête*, avec chaleur et déchirements. — Tension sourde et crampoïde dans la tête. — *Battement dans la tête*, quelquefois remontant du ventre. — Mouvements du cerveau, en se baissant.

YEUX. — Yeux faibles et abattus, avec douleur pressive, surtout en fixant un objet avec persévérance. — Pression et tiraillements dans les paupières. — Cuisson dans les yeux, comme par l'effet de la poussière. — *Battement douloureux dans les yeux*. — Tressaillement convulsif des paupières. — Larmoiement, surtout en plein air. — Pupilles contractées.

OREILLES ET NEZ. — Otalgie, avec prurit dans l'oreille. — Pression et *battement dans les oreilles*. — Émoussement de l'ouïe, comme par laxité du tympan, avec grondement dans les oreilles. — Traction étourdissante à la racine du nez, et jusqu'au bout du nez, avec fourmillement dans cette partie. — Sensation de chaleur du nez.

FACE ET DENTS. — Tension de la peau du visage. — Froncement et contraction des muscles du front. — Sueur fraîche à la face, surtout à la bouche et au nez. — Tressaillement des commissures des lèvres. — Douleurs fouillantes dans les dents cariées. — Sensation douloureuse de froid dans les dents. — Sensation de torpeur, et insensibilité de la langue. — Contraction du gosier.

ESTOMAC. — Perte du goût. — *Goût fade, pâteux* ou aigre. — Amertume des aliments. — *Appétence pour diverses choses, qui répugnent cependant à la première bouchée*. — Dégout pour les aliments gras ou sans saveur. — Répugnance pour le café (non sucré). — Faim, sans appétit. — *Nausées*, comme venant du ventre, avec coliques. — *Plénitude d'estomac*, avec pression comme par surcharge. — Contractions dans l'estomac. — Élançements et *battements dans le creux de l'estomac*.

VENTRE. — *Ballonnement du ventre*, avec tension. — Pression dans la région ombilicale. — *Tranchées dans le ventre, qui forcent à se replier sur soi-même*, souvent peu après le repas, aggravées en étant debout. — Incarcération de flatuosités, avec pression et

tension à la poitrine: — Palpitation et tressaillement dans les muscles abdominaux.

SELLES. — *Envie pressante et fréquente d'aller à la selle, non suivie de résultat*, aggravée par le mouvement et la marche. — * *Selles diarrhéiques*, généralement d'odeur aigre, liquides, ou de la consistance de la bouillie, précédées et suivies de ténésme, avec pincement constrictif dans le ventre, et horripilation pendant l'évacuation. — *Diarrhées* grisâtres ou brunes, mêlées de mucosités. — °Diarrhée abondante, avec vomissements et grande faiblesse.

URINES. — *Sécrétion plus abondante d'urine.* — Urine rouge ou jaune verdâtre. — Faiblesse de la vessie; l'urine ne peut être évacuée sans effort. — Sensation brûlante dans la vessie. — Urines brûlantes.

POITRINE. — Dyspnée en respirant profondément, comme par un fardeau sur la poitrine. — Lancinations dans la poitrine. — Palpitation des muscles de la poitrine. — Douleurs et lancinations dans les mamelons. — Lait amer et jaune.

TRONC ET MEMBRES. — Roideur aux reins et dans les hanches, qui ne permet pas de se tenir droit. — Lancinations dans les bras. — Déchirement dans les bras, les avant-bras et les articulations des doigts. — Tressaillements dans les bras et les mains. — Palpitations musculaires dans les articulations du coude. — Veines gonflées et chaleur aux mains. — Sueur, quelquefois froide, dans la paume des mains. — Tressaillement des doigts. — Grande lassitude dans les cuisses. — Tressaillements dans les muscles des cuisses. — Engourdissement des jambes lorsqu'elles sont croisées. — Palpitations musculaires dans les jarrets, les jambes et les orteils. — Roideur du jarret, avec douleur pendant le mouvement. — Élançement dans les genoux et les jambes.

188. — RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

RHOD. — Rosage à fleurs blanches. — ARCHIVES DE STAFF. — Doses usitées : 12, 18, 30. — Durée d'action : 4 à 6 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Camph. clem. rhus.

COMPARER AVEC : Calc. canth. carb-an. carb-v. clem. lyc. n-vom. rhus. sep. sil. sulf.

CLINIQUE. — Jusqu'ici ce médicament n'a encore été employé que contre des Affections arthritiques, une espèce d'Hydrocèle et une Induration des testicules.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — **Traction rhumatismale et arthritique et déchirements, comme sur le périoste, dans les membres, provoqués par un temps âpre et aggravés dans le repos.* — Douleurs de luxation et tractions fouillantes dans les articulations, avec rougeur et gonflement. — **Nodosités arthritiques.* — *Inquiétudes, fourmillement, faiblesse, et sensation d'enraidissement paralytique dans quelques membres.* — Grand abattement et courbature après le plus léger exercice. — Gonflements hydropiques. — *Rémission fréquente des souffrances et apparition généralement le matin.* — **Les souffrances sont provoquées ou aggravées par un froid humide, ou à l'approche d'un orage, comme aussi dans le repos.*

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir le jour, avec sensation brûlante dans les yeux.* — Sommeil profond avant minuit, après s'être endormi de bonne heure, le soir. — *Insomnie après minuit.* — *Sommeil du matin troublé par une agitation dans le corps et des douleurs.*

FIÈVRE. — Frissons, alternant avec chaleur. — *Chaleur augmentée, surtout dans les mains.* — Fièvre le soir, avec chaleur à la tête, froid aux pieds, sensation brûlante dans les yeux et le nez, courbature et absence de soif, suivie de chaleur nocturne et d'insomnie. — Sueur avec prurit et fourmillement à la peau. — Sueur d'odeur aromatique.

MORAL. — Humeur sombre, morose. — *Indifférence excessive, avec crainte de tout travail, de toute occupation.* — Oubli excessif. — Perte subite des idées.

TÊTE. — *Tête entreprise le matin, après le lever, avec sommeil.* — Ivresse. — Vertige, avec angoisse. — Vertige tournoyant, au lit, comme si la tête allait se renverser en arrière. — *Maux de tête provoqués ou aggravés par le vin ou par un froid humide.* — Tension dans le front. — *Pression tractive dans le sinciput et les tempes, principalement dans les os.* — Lancinations dans le sinciput et les côtés de la tête. — Déchirement dans les os de la tête. — Battement dans la tête. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la tête, comme par ulcération sous-cutanée. — Douleur comme par contusion ou des coups, à l'occiput. — *Prurit rongeur au cuir chevelu, surtout le soir.*

YEUX. — Élançements pressifs dans les bords de l'orbite, avec contractions spasmodiques des paupières. — Pression dans les yeux venant d'un côté de la face. — *Sensation de sécheresse et brûlement dans les yeux, de temps à autre, surtout à la clarté vive du jour et en regardant fixement un objet.* — Agglutination des paupières. — Tressaillement frémissant des paupières. — Contraction d'une

pupille, tandis que l'autre est dilatée. — Trouble de la vue, en lisant et en écrivant.

OREILLES. — *Otalgie, avec déchirements tressaillants.* — Déchirement et térébration dans les oreilles et près des oreilles. — Sensation comme s'il y avait un ver dans l'oreille. — Bourdonnement sourd, continu, dans les oreilles, augmenté en avalant.

NEZ. — *Épistaxis.* — Odorat diminué. — *Obturation semi-latérale du nez*, à la racine, surtout le matin. — Coryza fluent, avec obturation d'une narine et perte de l'odorat et du goût. — Sécrétion plus abondante de mucosités nasales, au grand air.

VISAGE. — Horripilation parcourant le visage. — Lèvres sèches, brûlantes. — Vésicules aux lèvres, avec douleur d'excoriation en mangeant.

DENTS. — *Odontalgie, avec déchirement tractif*, dans les dents molaires, *par un froid humide ou un temps d'orage*, aggravée par le contact. — Odontalgie nocturne, avec otalgie. — Prurit aux gencives. — Gonflement et douleur d'excoriation entre les gencives inférieures et la joue.

BOUCHE ET GORGE. — Accumulation abondante de salive dans la bouche, avec sécheresse du gosier, et vésicules cuisantes sous la langue. — Grattement dans la gorge, comme par des mucosités. — Constriction et *sensation brûlante dans la gorge.*

ESTOMAC. — Émoussement du goût. — Les aliments n'ont point de saveur. — Soif augmentée. — *Satiété prompte*, avec bon appétit, suivie de malaise. — *Nausées*, avec envie de vomir, *pression à l'estomac*, et écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, soulagée par des renvois. — *Pression à l'estomac*, la nuit, ou après avoir bu de l'eau froide. — *Pression contractive au scrobicule, avec gêne de la respiration.* — Élançements pressifs dans le creux de l'estomac et les hypochondres.

VENTRE. — Douleurs crampoïdes dans les hypochondres. — Tension dans la région de la rate, après s'être baissé. — *Élançements dans la rate*, en marchant vite. — *Ballonnement du ventre*, surtout de la partie supérieure, avec sensation de plénitude qui gêne la respiration, le matin et le soir. — Incarcération douloureuse de flatuosités dans les hypochondres et les reins. — Grondement et borborygmes dans le ventre, avec renvois et expulsion de vents fétides.

SELLES. — *Envie pressante d'aller à la selle, avec retard de la selle.* — *Évacuation difficile de la selle*, même lorsqu'elle est molle. — *Selles de la consistance de la bouillie.* — Évacuations muqueuses. — *Diarrhée après avoir mangé des fruits*, ou par un froid humide. — Battement à l'anus. — Traction depuis le rectum jusque dans les parties génitales.

URINES. — Envie plus fréquente d'uriner, avec traction dans la région de la vessie et les aines. — *Urine plus abondante et fétide.*

PARTIES GÉNITALES. — *Sensation d'excitation entre les parties génitales et les cuisses.* — Battement et élancements sous le gland. — *Traction et douleur de meurtrissure dans les testicules*, et jusque dans le ventre et les cuisses. — *Testicules gonflés et rétractés.* — Prurit, sueur et racornissement du scrotum. — °Gonflement transparent du scrotum, comme par hydrocèle. — °*Induration des testicules.* — *Suppression des règles.* — Règles trop hâtives et trop abondantes.

LARYNX. — *Catarrhe et enrouement* de la trachée-artère. — *Toux sèche, ébranlante*, avec oppression de poitrine et âpreté de la gorge, surtout la nuit et le matin. — *Toux grattante*, avec expectoration peu abondante de mucosités.

POITRINE. — *Pression à la poitrine, avec gêne de la respiration.* — *Constriction oppressive de la poitrine.* — Ondulation chaude dans la poitrine et au cœur. — *Congestion sanguine à la poitrine.* Douleur de brisement à l'extérieur de la poitrine.

TRONC. — *Douleurs dans le dos*, aux reins, comme de luxation ou de brisement. — Traction rhumatismale et déchirement dans le dos et les épaules. — *Roiueur de la nuque.* — *Tension et traction rhumatismale, dans les muscles de la nuque et du cou.*

BRAS. — *Douleurs tractives dans les bras*, par un temps âpre. — Sensation comme si le sang ne circulait pas dans les bras. — *Faiblesse*, avec fourmillement et pesanteur dans les bras, jusque dans le bout des doigts, pendant le repos. — *Tiraillement et déchirement dans les avant-bras et les mains*, comme dans le périoste, aggravés pendant le repos. — Douleur de luxation dans les articulations de la main. — Chaleur des mains augmentée.

JAMBES. — Douleur de luxation dans l'articulation coxo-fémorale et celle des genoux. — *Sensation de froid et racornissement de la peau* à quelques parties des jambes. — Sueur aux jambes. — Gonflement des jambes et des pieds. — *Traction et déchirement dans les jambes et les pieds*, comme dans le périoste, surtout dans le repos. — *Froid excessif aux pieds.* — Cors aux pieds, avec douleur lancinante.

189.—RHUS TOXICODENDRON.


RHUS. — Arbre à poison. — **HAHNEMANN.** — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : 3 à 6 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Bry. camph. coff. sulf. — *On l'emploie comme antidote de* : Bry. rhod. tart.

COMPARER AVEC : Alum. amm. ant. arn. ars. asa. bell. bry. calc. caus. cham. chin. clem. cocc. coff. con. cupr. dulc. graph. hyos. iod. ign. kal. lach. laur. led. lyc. magn. merc. mur-ac. natr. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac. plat. puls. rhod. rut. samb. sabad. sep. sil. sulf. veratr. — C'est surtout après : Arn. bry. calc-ph. cham. lach. phos. phos-ac. sulf. phos-ac, que le rhus est efficace, lorsqu'il est indiqué. — Après le rhus, conviennent quelquefois : Amm. ars. bry. calc. con. phos. phos-ac. puls. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Affections, surtout des tendons, des ligaments et des membranes synoviales ; Manque de plasticité dans le sang, avec tendance à la cessation de l'activité organique jusqu'à la paralysie ; Affections rhumatismales avec gonflement ; Inflammations locales avec affections cérébrales ; Affections rachitiques et scrofuleuses ; Engorgement et induration des glandes ; Convulsions et autres souffrances par suite d'un bain froid ; Paralysies ; Gonflements œdémateux et inflammatoires ; Atrophie ; Exostoses, carie et autres affections des os ? ; Dartres humides, ou sèches, ou lichénoïdes ; Pemphigus ; Inflammations érysipélateuses ; surtout l'érysipèle vésiculeux ; Zona, Pétéchies, Ulcères ; Verrues ; Scarlatine et morbilles, et affections à la suite de ces maladies ; Prodromes de la petite vérole ; Suites fâcheuses d'un tour de reins, d'une luxation, d'une commotion et d'autres lésions mécaniques, surtout avec souffrances des articulations et des membranes synoviales, ou avec sugillation et extravasation de sang ; Fièvres intermittentes, rhumatismales, gastriques et typhoïdes ; Hypochondrie ; Mélancolie ; Céphalalgies nerveuses, hystériques et autres ; Migraine ; Teigne ; Ophthalmies scrofuleuses ; (et arthritiques ?) ; Photophobie scrofuleuse ; Amblyopie amaurotique ; Parotite, même à la suite de la scarlatine ; Hémorrhagie nasale ; Érysipèle à la face, surtout érysipèle vésiculeux ; Croûte de lait ; Odontalgie arthritique ? ; Angines ; Affections gastriques ; Dispepsie, même avec vomissement des aliments ; Rétrécissement de la gorge et de l'œsophage ; Coliques inflammatoires ; Entérite ; Ictère ; Diarrhées et dysenteries ; Incontinence d'urine ; Fièvre puerpérale ; Tumeur blanche et lochies malades chez les femmes en couche ; Incommodités par suite de sevrage, ou par la suppres-

sion du lait; *Grippe*; Pneumonie avec symptômes typhoïdes (après l'usage d'*acon.* et de *bryon.*); Hémoptysie; Maladies de cœur; Maux de reins rhumatismaux ou par suite d'un refroidissement; Coxalgie et luxation spontanée; *Inflammation érysipélateuse des pieds*; Gonflement œdémateux des pieds, même à la suite de dartres réputées, etc., etc.

 *Voy. la note, page 47.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions, tension et déchirements rhumatismaux et arthritiques*, dans les membres, portés au plus haut degré pendant le repos, ainsi que dans la mauvaise saison, la nuit, et à la chaleur du lit, souvent avec sensation de torpeur et engourdissement de la partie affectée, après l'avoir remuée. — Crampe et tension à diverses parties, comme par raccourcissement des tendons. — Contraction de quelques membres. — **Élancements tensifs* et roideur dans les articulations, aggravés en se levant de son siège et en plein air. — **Roideur* paralytique dans les membres, surtout en commençant à remuer la partie après le repos. — **Engourdissement* facile des parties sur lesquelles on repose. — **Torpeur* de quelques parties, avec fourmillement et insensibilité. — **Fourmillement* dans les parties affectées. — **Douleur de luxation facile des membres.* — **Paralysies*, quelquefois semi-latérales. — **Gonflements rouges et luisants*, avec douleur lancinante d'excoriation au toucher. — **Douleurs de brisement*, ou bien sensation comme si la chair était détachée des os, à quelques parties. — Tractions pressives sur le périoste, comme si on raclait les os. — Sensation comme si quelque chose était arraché dans les organes internes. — Gonflement et induration des glandes. — Ictère. — Tressaillement des muscles et des

- membres. — **Mouvements convulsifs* et autres souffrances, après avoir pris un bain froid. — Affections semi-latérales. — **Exacerbation et apparition* des douleurs et des symptômes, pendant le repos, ou la nuit, comme aussi en entrant dans l'appartement après avoir été au grand air; *amélioration par le mouvement et la marche.* — **Reproduction* ou aggravation de beaucoup de souffrances, dans la mauvaise saison. — Surexcitabilité générale du système nerveux, augmentée pour peu qu'on se fâche. — *Tiraillements dans tous les membres en étant couché.* — Tremblement des membres, après la plus légère fatigue. — Marche mal assurée. — **Grande lassitude et faiblesse*, avec besoin de se coucher. — Accès d'évanouissement. — **Impossibilité de supporter le grand air*, chaud ou froid; il impressionne douloureusement la peau.

PEAU.—Prurit sur tout le corps, principalement aux parties velues.

— *Inflammations érysipélateuses.* — *Eruptions urticaires.* —

**Eruptions généralement vésiculeuses, croûteuses, avec prurit brûlant*, apparaissant surtout au printemps et en automne. —

**Eruptions de petites pustules, sur un fond rouge, comme le zona.*

— °*Ulcères gangreneux, résultant de petites vésicules, avec fièvre violente.* — °*Pétéchies avec grande faiblesse allant jusqu'à la*

prostration de toutes les forces. — *Pustules noires.* — °*Eruptions dartreuses, quelquefois alternant avec souffrances asthmatiques*

et selles dysentériques. — °*Verrues, principalement aux mains et*

aux doigts. — *Rhagades aux mains.* — *Panaris.* — *Fourmillement*

ou élancements, ou bien cuisson brûlante dans les ulcères, surtout

la nuit. — *Engelures.* — *Cors aux pieds, avec sensation brûlante*

et douleur d'excoriation.

SOMMEIL. — *Bâillements fréquents, violents, crampoïdes.* — *Forte*

envie de dormir le jour, et même le matin, au lit. — **Somnolence*

pleine de rêveries pénibles et interrompues. — *Insomnie, sur-*

tout avant minuit, et généralement causée par une sensation de

chaleur, un bouillonnement de sang, et une inquiétude qui ne

permettent pas de rester couché. — **Sommeil agité, avec rêves*

anxieux et effrayants. — °*Coma somnolent, avec ronflement,*

murmures et carpologie. — *Sommeil empêché par des idées*

tristes. — *Réveil causé par amertume et sensation de sécheresse*

dans la bouche. — *Sommeil de nuit, empêché par une pression*

à l'estomac, pincements fouillants dans le ventre, et nausées

avec envie de vomir. — *Impossibilité de rester couché sur le*

côté, la nuit. — *Sursauts avec effroi et tressaillement du corps,*

pendant le sommeil. — *Sommeil incomplet et agité, avec jacta-*

tion et affluence d'idées pénibles. — *Rêves vifs des affaires du*

jour, avec paroles pendant le sommeil. — *Pleurs en dormant.* —

Rêves d'incendie. — *Sommeil avec bouche ouverte et respiration*

courte.

FIÈVRE. — *Frissons et froid, généralement le soir, et accompagnés*

d'accès de douleurs et autres symptômes accessoires. — *Frisson*

grelottant au grand air, avec forte soif. — *Frissons passagers,*

continuels, comme si on était inondé d'eau froide. — *Sensation*

de froid, pour peu que l'on bouge. — *Froid et pâleur du visage,*

alternant avec chaleur et rougeur. — *Frissons et chaleur entre-*

mêlés, soit généraux et simultanés (frissons intérieurs, avec cha-

leur extérieure, et vice versa), soit à des parties différentes. —

**Fièvre le soir, d'abord frisson, puis chaleur et soif (et sueur),*

accompagnée ou suivie de tranchées et de diarrhée. — °*Fièvres*

tierces ou quotidiennes. — **Fièvre tierce double, d'abord frisson*

avec soif, puis chaleur générale, avec frisson au moindre mou-

vement, enfin sueur. — **Pendant le frisson, douleur dans les membres, maux de tête, vertige, maux de dents pulsatifs, avec accumulation de salive dans la bouche, et envie de vomir. — Pendant la chaleur nocturne, tiraillements dans tous les membres. — Chaleur fugace, avec sueur partant de la région ombilicale et alternant brusquement avec frissons. — Pendant ou après la fièvre, tressaillements, tintement d'oreilles, surdité, coryza sec, insomnie, avec jactation inquiète, jaunisse et éruption urticaire, pression dans le creux de l'estomac, battement de cœur avec anxiété, coliques, diarrhée et autres affections gastriques et soif nocturne. — °Fièvres malignes, avec délire loquace, douleurs violentes dans tous les membres, faiblesse excessive, langue sèche ou noire, lèvres sèches, brunâtres ou noirâtres, chaleur et rougeur des joues, carpologie, pouls accéléré et petit, coma somnolent avec gonflement et gémissements. — Sueur pendant les douleurs. — Sueur en étant assis, souvent avec tremblement violent. — Sueur nocturne, quelquefois avec éruption miliaire et pruriente. — Sueurs matutinales, quelquefois d'odeur acide. — Sueur continuelle.*

MORAL. — **Tristesse anxieuse et angoisse mortelle, surtout le soir et la nuit, avec désir de la solitude et besoin de pleurer. — Agitation qui ne permet pas de rester assis. — *Angoisse avec crainte de la mort et soupirs. — Peur d'être empoisonné. — Manie du suicide. — Irritabilité et mauvaise humeur, avec répugnance pour un travail quelconque. — °Abattement moral, avec anthropophobie. — *Inquiétude sur ses enfants, sur ses affaires et sur l'avenir, avec manque de confiance en soi-même. — Faiblesse de la mémoire et oubli. — Absence d'idées et d'esprit. — Lenteur de la marche des idées et esprit obtus. — Erreurs de l'imagination et visions. — °Délires.*

TÊTE. — *Tête entreprise, comme dans l'ivresse. — Stupéur de la tête. — *Vertige et chancellement, comme si l'on allait tomber. — Surtout en se levant du lit. — Vertige le soir, en se couchant, avec crainte de mourir. — Maux de tête, immédiatement après le repas, ou après avoir bu de la bière, comme aussi en remuant les bras. — °Accès de maux de tête, avec besoin de se coucher; toute contrariété et tout exercice en plein air renouvelle les accès. — °Maux de tête périodiques. — *Douleur dans la tête, comme si le cerveau était meurtri, surtout le matin, aggravée en remuant et en levant les yeux. — Pesanteur et plénitude pressive de la tête, avec sensation en se baissant, comme si le cerveau allait éclater. — Sensation de compression ou d'expansion dans la tête. — Tractions et déchirements dans la tête et surtout dans les tempes, principalement le soir et la nuit. — °Maux de tête lancinants jour*

et nuit, jusque dans les oreilles, la racine du nez et les pommettes, avec dents agacées. — Battement et pulsations dans la tête, surtout à l'occiput. — Douleurs, surtout dans les bosses occipitales. — Congestion sanguine à la tête. — Sensation brûlante, surtout dans le front et l'occiput. — **Fourmillement douloureux dans la tête.* — Bourdonnement et bruissement dans la tête. — *Ballonnement et sensation de fluctuation dans la tête* à chaque pas, *comme si le cerveau vacillait.* — Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la tête, comme par ulcération sous-cutanée, surtout en rebroussant les cheveux, et au toucher. — Contraction du cuir chevelu, comme si on arrachait les cheveux. — Traction et déchirement au cuir chevelu. — *Gonflement de la tête.* — Fourmillement rongé au cuir chevelu. — **Dartres sèches au cuir chevelu.* — **Teigne* périodique réapparaissant tous les ans. — **Teigne* à croûtes épaisses, *qui détruisent les cheveux, avec pus verdâtre, et prurit violent la nuit.* — Petites tubérosités molles au cuir chevelu.

YEUX. — **Douleurs dans les yeux, en remuant le globe de l'œil.* — Pression et sensation brûlante dans les yeux. — **Yeux fixes, ternes et abattus.* — Cuisson dans les yeux et les paupières. — **Inflammation des yeux et des paupières, avec rougeur et agglutination nocturne.* — Larmolement abondant, avec gonflement œdémateux autour des yeux. — **Photophobie.* — Gonflement des paupières. — *Gonflement de l'œil tout entier et des parties environnantes.* — Orgelet aux paupières. — Roideur paralytique des paupières. — Tressaillement et frémissement des yeux et des paupières. — Voile devant les yeux et faiblesse de la vue; tous les objets paraissent pâles.

OREILLES. — Otalgie. — Battement douloureux dans l'oreille, la nuit. — Gonflement des oreilles. — Écoulement de pus sanguinolent par les oreilles, avec surdité. — **Gonflement et inflammation des parotides, avec fièvre.*

NEZ. — Rougeur du haut du nez, avec douleur d'excoriation au toucher. — Gonflement du nez. — **Sécheresse du nez.* — **Écoulement de pus verdâtre, fétide, par le nez.* — **Épistaxis, même la nuit et en se baissant ou en renâclant.* — Éternuements fréquents, violents, presque crampoïdes. — Écoulements abondants de mucosités nasales, sans coryza.

VISAGE. — **Face pâle, malade, hâve, avec yeux bordés d'un cercle bleu et nez effilé.* — **Visage défiguré, convulsé.* — **Face rouge avec chaleur brûlante.* — **Inflammation érysipélateuse et gonflement de la face, avec élancements pressifs et tensifs et fourmillement brûlant.* — **Érysipèle vésiculeux, avec sérosité jaune dans les vésicules.* — **Éruptions humides et croûtes épaisses au vi-*

sage, avec suintement de sérosités fétides et sanguinolentes. — *Éruption au visage, comme la couperose. — Éruption dartreuse, croûteuse, autour de la bouche et du nez, avec tressaillement pruriant et sensation brûlante. — Desquamation de la peau et du visage. — Contractions incisives et douleurs crampoïdes brûlantes dans les joues (avec chaleur et rudesse de ces dernières). — °Sueur froide au visage. — Éruptions de boutons brûlants autour des lèvres et du menton. — Douleur crampoïde dans l'articulation des mâchoires, avec craquement au moindre mouvement. — °*Crampes de la mâchoire*. — Gonflement dur et douloureux des glandes sous-maxillaires. — *Lèvres sèches, brunâtres.

DENTS. — **Odontalgie*, comme par excoriation ou avec *déchirements, élancements, tressaillements*, creusement et *fourmillement*, fréquemment *la nuit*, ou aggravée en plein air et *soulagée par la chaleur extérieure*, quelquefois aussi à la suite d'un refroidissement. — Vacillement des dents. — Exhalaison fétide par les dents cariées. — Douleur d'excoriation brûlante aux gencives, même la nuit.

BOUCHE. — *Sécheresse de la bouche, avec forte soif. — *Accumulation abondante de salive dans la bouche*. — *Il coule de la bouche, la nuit, une salive jaune*, et quelquefois même sanguinolente. — Accumulation abondante de mucosités visqueuses dans la bouche, avec crachement fréquent. — *Langue sèche, °rouge ou brunâtre. — Sensation comme si la langue était recouverte d'une peau.

GORGE. — Mal de gorge, comme par gonflement intérieur, avec douleur de meurtrissure, même en parlant, et avec *pression et élancements pendant la déglutition*. — Sensation dans la gorge, comme si quelque chose en était arraché. — **Difficulté d'avaler et douleur en ingérant des aliments solides, comme par rétrécissement de la gorge et de l'œsophage*. — L'eau-de-vie cause une sensation extraordinairement brûlante dans la gorge. — Accumulation abondante de mucosités dans la gorge, avec renâchement fréquent, le matin. — Douleur pulsative au fond du gosier.

APPÉTIT. — *Goût putride*, surtout le matin et après le repas. — Goût fade, pâteux ou âcre, d'une aigreur amère ou métallique. — Goût douceâtre dans la bouche. — *Goût amer des aliments*, surtout du pain, qui paraît âpre et sec. — **Absence totale d'appétit, avec répugnance pour tous les aliments, surtout le pain, la viande, le café et le vin*. — Sensation de plénitude et de satiété dans l'estomac, qui ôte tout appétit. — *Après le repas, forte envie de dormir, pression et plénitude dans l'estomac et le ventre*,

nausées avec envie de vomir, lassitude, vertige et horripilation. — Le pain pèse sur l'estomac. — Douleur et chaleur dans la tête après avoir bu de la bière. — **Soif*, le plus souvent *par une sensation de sécheresse dans la bouche*, même la nuit, ou le matin, avec désir principalement d'eau et de lait froid. — Grand désir de friandises.

ESTOMAC. — Renvois avec goût des aliments. — Renvois à vide après le repas ou après avoir bu. — *Violents renvois avec fourmillement dans l'estomac*, soulagés en étant couché, renouvelés chaque fois qu'on se redresse. — Pituïtes de l'estomac. — *Nausées et envie de vomir*, principalement après le repas et après avoir bu, comme aussi la nuit ou le matin, après le lever, soulagées en se couchant. — Vomissement immédiatement après avoir mangé. — **Douleurs dans l'estomac, comme s'il contenait des pierres*, surtout après le repas. — **Pression dans l'estomac et le scrobicule*, souvent avec gêne de la respiration. — **Battement et élancements dans la région épigastrique*. — **Serrement, sensation de gonflement et douleur d'ulcération au creux de l'estomac*. — Sensation de froid dans l'estomac. — Sensation dans le creux de l'estomac, comme si quelque chose en était arraché, surtout en se baissant ou en faisant un faux pas.

VENTRE. — **Ballonnement du ventre*, surtout après le repas. — *Pe-santeur pressive dans le ventre*, comme par un fardeau. — *Cram-pes abdominales* contractives, qui forcent à se tenir courbé. — *Contraction dure et visible du ventre à travers l'ombilic*. — *Tour-noiement fouillant dans le ventre*, comme par un ver. — *Déchi-rements incisifs, tressaillements et pincements dans le ventre*. — Sensation brûlante dans le ventre. — *Laxité dans le ventre*, avec ébranlement intérieur à chaque pas que l'on fait. — **Coliques violentes*, souvent la nuit, ou aggravées par des aliments ou des boissons quelconques, parfois avec selles sanguinolentes. — Sensation dans le ventre, comme si quelque chose en était arraché. — **Rougeur écarlate du bas-ventre*. — *Téguments du ventre douloureux*, comme s'ils étaient ulcérés, surtout le matin en s'étirant. — *Pression vers le dehors dans les aines*, comme si une hernie allait s'établir. — *Flatuosités abondantes*, avec grondement, fermentation et mouvements pinçants dans le ventre. — *Flatuosités très-fétides*.

SELLES. — **Constipation*, quelquefois alternant avec diarrhées. — *Selles dures et tardives*. — **Ténésme*, quelquefois avec nausées et déchirements ou pincements dans le ventre. — **Selles diarrhéiques sanguinolentes, séreuses ou muqueuses, écumeuses, gé-latineuses, rouges ou striées de blanc et de jaune*. — **Diarrhées opiniâtres ou dyssentériques*. — Selles complètement blanches.

— *°Diarrhées nocturnes*, avec coliques violentes, mal à la tête et douleurs dans tous les membres. — Selles involontaires, en dormant, la nuit. — Pendant la selle, haleine courte. — Fourmillement et prurit à l'anus et au rectum. — Après une selle molle, sortie des boutons hémorroïdaux de l'anus, avec douleur d'excoriation.

URINES. — *°Rétention d'urine*. — **Envie pressante et fréquente d'uriner*, jour et nuit, avec *écoulement plus abondant*. — *°Incontinence d'urine*, surtout pendant le repos. — *°Émission goutte à goutte* d'une urine rouge de sang, avec ténésme. — Émission d'urine diminuée, quoique l'on boive beaucoup. — Urine foncée, se troublant promptement. — Urine d'un blanc trouble. — Urine claire comme de l'eau, avec sédiment blanc de neige. — Enflure de l'urètre. — Jet d'urine double.

PARTIES VIRILES. — Forte éruption aux parties génitales. — Inflammation du gland. — Vésicules suintantes sur le gland. — *Gonflement du gland et du prépuce*. — Paraphimosis du prépuce. — Tache rouge à l'intérieur du prépuce. — Gonflement et épaississement du scrotum. — Éruption humide au scrotum. — Érections fréquentes la nuit, avec envie d'uriner. — Forte propension à l'éjaculation, le matin.

RÈGLES. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Règles de trop longue durée. — *°Écoulement de sang pendant la grossesse*. — Douleur d'excoriation et élancements dans le vagin. — Écoulement de sang et de caillots par la matrice, avec douleurs d'enfantement. — Diminution de la sécrétion du lait.

LARYNX. — Enrouement et âpreté de la gorge, avec sensation dans la poitrine, comme si elle était à vif. — Sensation de froid dans la gorge, en respirant. — Engouement facile. — Exhalaison brûlante par le larynx. — Sensation de constriction dans la fosse du cou, après une courte promenade. — *Toux provoquée par un chatouillement dans les voies aériennes*, généralement courte et sèche, avec angoisse et haleine courte, et principalement le soir, avant minuit. — Toux, avec vomissement des aliments, surtout le soir, et en étant couché sur le dos. — *Toux le matin, après le réveil*. — Toux courte, avec amertume de la bouche, le soir, après s'être couché, et le matin après le réveil. — Toux avec douleur d'estomac ou avec ébranlement dans la poitrine et la tête. — *°Toux avec expectoration d'un sang rouge vif*, et sensation de fadeur dans la poitrine.

POITRINE. — Respiration difficile, après une marche modérée. — *Oppression anxieuse de poitrine*, même la nuit. — Respiration gênée par une pression et un serrement au creux de l'estomac. — Haleine courte, le soir, avec tension sur la poitrine. — Besoin

fréquent de respirer profondément. — Faiblesse de poitrine, qui rend la parole difficile, après une promenade en plein air. — Sensation de constriction de la poitrine. — **Élancements et lancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine*, surtout en étant assis courbé, en parlant, en respirant profondément, rarement en marchant ou en faisant de forts mouvements. — *Fourmillement dans la poitrine*, avec tension dans les muscles de la poitrine, aggravée par le repos. — Congestion sanguine à la poitrine. — **Faiblesse et sensation de tremblement au cœur*. — Battement de cœur violent, en étant assis tranquille. — **Élancements dans la région du cœur*, avec sensation douloureuse de paralysie et torpeur du bras gauche. — Froid passer au dos.

TRONC. — **Douleur de brisement aux reins*, surtout au toucher et pendant le repos. — Roideur douloureuse aux reins. — **Exostose douloureuse au sacrum*. — **Déviation de la colonne vertébrale*. — **Douleurs aux reins, dans le dos et la nuque, comme si l'on s'était donné un tour de reins*. — Traction et élancements dans le dos, surtout en étant assis et en se baissant. — Déchirement rhumatismal entre les omoplates, aggravé par le froid, soulagé par la chaleur. — **Renversement du dos*. — *Roideur rhumatismale de la nuque et du cou*, avec tension douloureuse pendant le mouvement. — Gonflement douloureux des glandes axillaires.

BRAS. — **Déchirement et sensation brûlante dans l'épaule*, avec paralysie du bras, surtout pendant la mauvaise saison, dans le repos et à la chaleur du lit. — **Froid, paralysie et insensibilité du bras*. — **Exostose au bras*, avec sensation brûlante et ulcères suintant un pus sanieux. — **Gonflement érysipélateux et pustules*, avec prurit brûlant, aux bras, aux mains et aux doigts. — Taches rouges sur les bras. — Tressaillements, élancements et déchirement dans les bras. — Déchirement tressaillant dans les coudes, les poignets et les articulations des doigts. — Fouillement dans les os de l'avant-bras. — Faiblesse et roideur des avant-bras et des doigts pendant le mouvement, et tremblement de ces parties après le moindre effort. — Gonflement chaud des mains, le soir. — Éruption vésiculaire, en forme de grappe, au poignet. — *Cuison au dos des mains*. — **Verrues aux mains et aux doigts*. — Gonflement des doigts. — Tressaillement des pouces. — Contraction des doigts.

JAMBES. — **Élancements et déchirements dans l'articulation coxo-fémorale*, jusque dans le jarret, surtout en s'appuyant sur le pied, ou avec tiraillements sourds et sensation brûlante dans le repos, et sensibilité douloureuse des articulations en se levant de son siège, et en montant un escalier. — Tension et roideur dans les

muscles et les articulations des hanches, des cuisses, des jambes, des genoux et des pieds. — *Paralyse des extrémités inférieures, — *Crampes* dans les fesses, les cuisses et les mollets, surtout la nuit, au lit, ou en étant assis, après avoir marché. — Tension dans le genou, comme si les tendons étaient trop courts. — Traction et déchirement tressaillant dans les cuisses et les jambes. — Lancinations dans les cuisses, les jambes, les genoux, les pieds et les orteils. — *Lourdeur des jambes*, surtout dans les jarrets et les mollets. — *Paralyse des jambes et des pieds. — *Élancements et douleur de luxation* dans les malléoles, en appuyant le pied. — **Gonflement inflammatoire du cou-de-pied*, quelquefois avec pustules et boutons miliaires à la partie affectée. — **Gonflement érysipélateux des pieds*. — Gonflement des pieds, le soir. — Torpeur et pâlissement des pieds (pieds morts). — Distorsion des orteils. — Cors aux pieds, avec sensation brûlante et douleur d'excoriation.

190. — RHUS VERNIX.

RHUS-V. — Vernis de Chine. — ARCHIVES DE STAFF. — Médicament encore peu connu.

ANTIDOTE : Nitr-ac.

SYMPTOMES. — Éruptions phlycténoïdes à plusieurs endroits de la peau, surtout aux doigts. — *Prurit violent* au corps, comme par des piqûres de cousins; surtout après minuit et vers le matin. — Durillons rouges et fortement élevés à diverses parties de la peau. — Rêves de meurtre et de malheurs. — Pesanteur insupportable de la tête. — Yeux rouges. — Obscurité devant les yeux, en lisant. — Grande sensibilité des yeux à la lumière du jour, le matin, en s'éveillant. — Taches rouges à la face. — *Gonflement du visage et du front, surtout du côté gauche, avec durillons et taches rouges*, et sensation de pesanteur dans les parties affectées. — Sensation brûlante aux lèvres. — Douleur d'excoriation dans la gorge (du côté gauche), en avalant. — Sang des règles coagulé, comme des morceaux de chair. — *Élancements aigus* à travers le poumon. — Douleurs rhumatismales dans les articulations de l'épaule et du coude. — Tubérosités dures et phlyctènes aux mains. — Douleur de luxation à la hanche. — Crampes aux pieds.


191. — RUTA GRAVEOLENS.

RUTA. — Rue des jardins. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 12, 30. — *Durée d'action* : 8 à 15 jours.

ANTIDOTE : Camph.

COMPAREZ AVEC : Acon. amm. orn. ars. asa. bell. bry. con. hyos. ign. n-vom. op. plumb. puls. rhus. stram. veratr. — C'est quelquefois ign. qu'on peut administrer alternativement avec ruta.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances par suite de lésions mécaniques (contusion, chute, luxation, lésions des os ou du périoste); Carie?; Douleurs ostéocopes?; Paralysie par suite de lésions extérieures; Souffrances par suite d'un temps pluvieux et froid; Affections rhumatismales, principalement aux articulations des mains et des pieds; Amblyopie amaurotique, surtout par suite de travaux fins, de la lecture, etc.; Couperose; Affections vermineuses des enfants, surtout avec vomissement; Dyspepsie, surtout par suite de vomissements fréquents; Coliques vermineuses; Pneumonie chronique avec suppuration, par suite de lésions mécaniques de la poitrine; Paralysie des articulations des mains et des pieds, soit par suite d'affections rhumatismales, soit par suite de luxation, etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs de brisement ou comme à la suite d'une contusion, d'une chute ou d'une meurtrissure, dans les membres, les articulations et les os, surtout au toucher. — *Douleurs dans le périoste des membres, brûlantes ou rongeantes. — Déchirements et tractions pressives, crampoïdes, dans les membres. — Sensation de plénitude dans tout le corps, avec gêne de la respiration. — Lassitude, faiblesse et pesanteur dans tous les membres, surtout en étant assis, avec grandes inquiétudes dans les jambes. — Marche chancelante, mal assurée, par faiblesse des cuisses. — En étant assis, après de petites promenades, sensation d'un grand brisement dans tous les membres, avec sensibilité douloureuse du sacrum et des lombes.

PRAU. — Prurit rongeur à la peau. — Inflammations érysipélateuses. — Excoriation facile, chez les enfants ou bien en marchant et en montant à cheval. — Ulcères enflammés. — Anasarque. — Verrues.

SOMMEIL. — Bâillements fréquents et pandiculations. — *Forte envie de dormir*, le soir et après le repas, avec réveil en sursaut et cris perçants au plus léger attouchement. — Agitation la nuit, avec jactation et réveil fréquent.

FIÈVRE. — *Horripilation, froid et frisson*, même auprès du feu. — Froid aux mains et aux pieds, avec chaleur à la face, embarras dans la tête et soif. — Chaleur générale avec agitation et inquiétude mortelle, étouffement de la respiration et mal de tête pressif. Chaleur passagère, fréquente.

MORAL. — Anxiété, comme trouble de conscience. Disposition à la querelle et à la contradiction. — Inaptitude au travail. — *On est mécontent de soi et des autres*, et disposé à pleurer. — Mélancolie et abattement moral. — Lenteur de la marche des idées. — Fréquente absence d'esprit.

TÊTE. — Tête entreprise, comme si l'on n'avait pas assez dormi. — Vertige tournoyant, au point de tomber, le matin, en se levant, comme aussi en étant assis et en se promenant en plein air. — *Maux de tête*, comme par une pression étourdissante sur tout le cerveau, avec grande inquiétude. — Douleur battante ou déchirante dans le front avec embarras de la tête, le soir, avant de se coucher, et le matin, au réveil. — Chaleur dans la tête. — *Douleurs de traction tensive ou lancinante*, à l'extérieur de la tête, comme après un coup ou une contusion, surtout dans le périoste. — *Prurit rongéant au cuir chevelu*. — Nodosités et bosses au cuir chevelu, avec douleur d'excoriation au toucher, se formant après avoir éprouvé un déchirement à la partie qu'elles occupent. — Petits ulcères et croûtes suintantes au cuir chevelu.

YEUX. — ** Douleurs dans les yeux en regardant fixement un objet.* — Cuisson pruriant dans l'angle des yeux. — *Pression sur les yeux.* — Sensation brûlante dans les yeux, en lisant aux lumières. — Larmoiement au grand air. — Tache sur la cornée. — Auréole rouge autour de la lumière, le soir. — Frémissement et tressaillement des muscles des sourcils. — *Spasmes des paupières.* — Propension à la fixité du regard. — ** Vue trouble, comme à travers un brouillard* et obscurité complète dans le lointain. — Points voltigeant devant les yeux.

OREILLES ET NEZ. — Otalgie avec pression grattante. — Lancinations pruriantes dans l'oreille. — Douleur de meurtrissure dans le cartilage de l'oreille et sous l'apophyse mastoïde. — Pression aiguë et dure à la racine du nez. — Sueur sur le dos du nez. — Épistaxis avec pression à la racine du nez.

VISAGE ET DENTS. — *Douleurs de la face, comme par suite de contusions ou de coups*, dans le périoste. — Déchirement crampoïde dans l'os de la pommette. — Prurit et rongements à la face et sur

les joues. — Érysipèle au front, avec gonflement. — Éruption de boutons aux lèvres — °Couperose. — Odontalgie avec douleur fouillante. — Sensibilité douloureuse et saignement facile des gencives.

BOUCHE ET GORGE. — Bouche sèche, gluante. — Crampe de la langue, avec parole embarrassée. — Mal de gorge, comme par une tubérosité au fond du gosier, en avalant à vide. — Sensation d'exco-riation et pression au voile du palais, en avalant.

APPÉTIT. — Goût des aliments fade et sec, comme du bois. — Forte soif d'eau froide, après midi. — Dégout dès la première bouchée, avec sensation de plénitude et de satiété dans le ventre, d'ail- leurs avec bon appétit. — En mangeant, nausées subites, avec vomissement des aliments. — Après avoir mangé du pain, ou bien des crudités et des¹ aliments indigestes, douleurs à l'es- tomac.

ESTOMAC. — Renvois à vide, ou avec goût des aliments. — Hoquet en fumant. — Renvois putridés, après avoir mangé de la viande. — Renvois comme chez les femmes hystériques. — Nausées dans le creux de l'estomac. — Vomissement, même des aliments. — Douleurs d'estomac après avoir mangé des crudités ou des ali- ments indigestes. — Pincements dans l'estomac après avoir mangé du pain. — *Douleurs d'estomac, rongeantes*, brûlantes ou pressives. Élançements déchirants dans l'épigastre.

VENTRE. — *Pression rongeante dans la région hépatique.* — Pulsation et picotement dans l'hypochondre gauche. — Gonflement doulou- reux de la rate. — *Douleur de meurtrissure dans le ventre*, avec fouillement dans la région lombaire. — Pincements pressifs dans le bas-ventre. — Pincements incisifs dans les côtés du ventre. — Élançements qui remontent dans le ventre, en s'asseyant. — Sensation de froid, ou chaleur, et sensation brûlante dans le ventre. — Rongement dans le ventre. — °Coliques, comme par des vers. — Lancinations dans les muscles abdominaux qui forcent à rentrer le ventre.

SELLES. — *Selles difficiles*, évacuées seulement par de violents efforts, comme par inactivité du rectum. — Selles rares, dures, noueuses, comme des crottes de mouton. — Diarrhée muqueuse alternant avec constipation. — Envie fréquente d'aller à la selle, avec éva- cuations peu abondantes, mais molles. — Envie inutile d'aller à la selle, avec chute du rectum. — Chute du rectum à chaque selle. — Écoulement de sang, pendant la selle. — Déchirements et élançements dans le rectum.

URINES ET PARTIES VIRILES. — *Envie d'uriner, quelquefois très- pressante*, avec pression sur la vessie, et émission d'une urine peu abondante et verte. — *Pression sur la vessie*, quelquefois

même après et hors le temps de l'émission des urines. — Émission d'urine fréquente et abondante, même la nuit. — Envie continuelle d'uriner, même immédiatement après l'émission. — Rétention d'urine. — Émission d'urine involontaire la nuit, au lit, et le jour, pendant le mouvement. — Urine chargée de gravelle. — Exaltation de l'appétit vénérien. — Pollutions.

RÈGLES. — Stérilité. — Règles très-irrégulières. — Règles de trop courte durée, précédées et suivies de flueurs blanches. — Flueurs blanches après les règles.

LARYNX. — Douleur de contusion au larynx. — Toux, le soir, après s'être couché, avec expectoration abondante de mucosités visqueuses, et soulèvement de cœur, comme pour vomir. — Toux croassante, la nuit, avec grattement dans la poitrine. — Toux avec expectoration abondante de matières purulentes. — Expectoration de mucosités épaisses, jaunâtres, presque sans toux, mais avec sensation de fatigue dans la poitrine.

POITRINE. — *Haleine très-courte, avec dyspnée.* — Pression à la poitrine, avec sensation de plénitude. — Compression nocturne de la partie inférieure de la poitrine. — *Lancinations dans la poitrine, souvent avec suspension de la respiration*, principalement en montant un escalier. — Sensation de froid, ou chaleur dans la poitrine. — Sensation de rongement dans la poitrine. — Au sternum, place douloureuse au toucher. — Battement de cœur avec anxiété.

TRONC. — *Douleurs de brisement dans le dos et aux reins*, souvent avec étouffement de la respiration. — Traction dans la nuque et les omoplates. — Douleur de contusion aux reins et dans le sacrum. — Élancements dans les reins, en marchant et en se baissant, ou seulement en étant assis.

BRAS. — Douleur de luxation dans l'articulation de l'épaule, surtout en laissant pendre les bras ou en les appuyant. — Secousses dans les bras, comme si c'était dans les os. — Déchirements sourds dans les os du bras et les articulations du coude. — *Douleur de contusion* dans l'articulation du coude. — *Douleur de brisement dans les avant-bras*, ainsi que dans les os et les articulations des mains. — Tractions pressives et crampoïdes, et déchirement dans les avant-bras, les mains et les doigts. — *Roideur paralytique du poignet. — *Douleur de luxation ou élancements dans les poignets. — Douleur dans le poignet, en soulevant un fardeau. — Torpeur et fourmillement dans les mains, après des efforts. — Contraction crampoïde des doigts. — Veines gonflées aux mains.

JAMBES. — Traction crampoïde dans les cuisses, jusque dans l'articulation coxo-fémorale et le sacrum. — *Douleur de brisement dans*

l'articulation coxo-fémorale et les os des jambes, comme par une contusion, surtout au toucher et en les étendant. — Faiblesse dans les os des cuisses, en se levant de son siège, comme s'ils étaient brisés. — Faiblesse, tremblement, et pesanteur paralytique des genoux et des jambes, qui ne permet pas de se tenir solidement debout. — Fatigue et lourdeur des jambes, après la marche. — Sensation de raccourcissement des tendons du genou. — Ulcères fistuleux aux jambes. — Fléchissement des genoux, surtout en descendant un escalier. — Douleur brûlante, rongeante, dans les os des pieds, qui ne permet pas de les appuyer. — Roideur paralytique du cou-de-pied.


192. — SABADILLA.

SABAD. — Sédaville. — ARCHIVES DE STAFF. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 2 à 3 semaines.

ANTIDOTES : Camp. puls.

COMPARER AVEC : Ant. ars. caps. cham. chin. cin. non. ign. natr-m. u-vom. plat. plum. puls. rhus. sep. veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Fièvres intermittentes, surtout au printemps; Angines chroniques, opiniâtres; Affections vermineuses, surtout souffrances par le ténia; Œsophagite? Gastrite; Grippe, etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions douloureuses dans les membres, comme dans la moelle des os, avec disposition à s'étirer les membres, soulagées pendant le repos. — Raclement et douleurs incisives dans le os, comme par des couteaux, surtout dans les articulations, aggravés au toucher, soulagés en remuant promptement la partie. — Lancinations picotantes, pressives et sourdes, à diverses parties. — Fourmillement dans les membres. — Convulsions. — Lourdeur de la marche et des mouvements. — Sensation douloureuse de paralysie dans les membres, et surtout dans les genoux. — Lassitude et pesanteur dans tous les membres, aggravée le soir, ou vers midi, temps pendant lequel les douleurs dans les membres s'aggravent aussi. — En étant couché, on se trouve mieux qu'en marchant ou en se tenant debout. —*

Plusieurs symptômes paraissent d'abord au côté droit, puis au côté gauche. — *Grande sensibilité au froid, qui aggrave le malaise et les douleurs.

PEAU. — Élançements fourmillants et brûlants sous la peau. — Bandes, taches et points rouges à différentes parties de la peau, apparaissant plus fortement au froid.

SOMMEIL. — Forte envie de dormir le jour, avec bâillements continuels et pandiculations. — Sommeil tardif par affluence d'idées. — Sommeil incomplet le soir, avec esprit fatigué par des pensées étranges. — *Sommeil de nuit agité, non réparateur, avec rêves anxieux.

FIÈVRE. — Fièvre sans soif, consistant seulement en froid, et en accès de chaleur isolés, qui sont plus sensibles à la face et aux mains qu'aux autres parties du corps. — Frisson ou froid extérieur, avec tremblement des membres, sans frisson, et avec soif peu forte ou complètement nulle; puis chaleur, avec soif modérée accompagnée ou suivie de sueur. — °Pendant le frisson, douleurs dans les côtes supérieures, toux sèche, crampoïde, et déchirements dans tous les membres et les os. — °Pendant la chaleur, délire, bâillements et pandiculations. — Sommeil pendant la sueur. — °Fièvre quotidienne, tierce, quarte, apparaissant à heures fixes, avec absence d'appétit, ballonnement pressif de l'estomac, douleurs de poitrine, toux, frissonnement, faiblesse et soif, entre les frissons et la chaleur. — °Dans l'apyrexie, courbature des membres, sans autres souffrances.

MORAL. — Inquiétude et angoisse, avec grande agitation. — Disposition à s'effrayer. — Mauvaise humeur et colère. — Éloignement pour le travail. — Fureur. — Exaltation de l'esprit, avec caractère froid, et vice versa. — Difficulté de penser. — Erreurs de l'imagination par rapport à soi-même; il semble que le corps soit défait et comme un cadavre, que l'estomac soit rongé, etc.

TÊTE. — Vertige avec nausées, soulagé en appuyant la tête. — Vertige avec perte de connaissance et obscurcissement des yeux, en se levant de son siège. — Mal de tête, avec douleur tensile, surtout pendant une fatigue intellectuelle. — *Mal de tête pressif et étourdissant, dans le front et les tempes. — Pesanteur douloureuse de la tête. — Douleurs térébrantes dans la tête toutes les fois qu'on s'est promené. — Battement pulsatif et douloureux dans la tête. — Fourmillement brûlant et picotement dans le front et au cuir chevelu.

YEUX. — Cuisson brûlante dans les yeux. — Pression sur le globe des yeux, surtout en regardant en l'air. — *Rougeur du bord des paupières. — *Larmolement, surtout pendant la promenade au grand air, en regardant la clarté, en toussant, en bâillant,

et à la plus légère douleur à d'autres parties. — Faiblesse de la vue.

OREILLES. — Otalgie, avec pression pénible. — *Chatouillement dans les oreilles.* — Prurit brûlant et élancements aux lobes de l'oreille. — Surdit   comme s'il y avait un bandeau sur les oreilles. — Bourdonnement, grondement et d  tonation dans les oreilles. — T  r  bration dans les parotides.

NEZ. — *Fourmillement pruriant dans le nez*, et cuisson contractive. —   pistaxis. — Grande sensibilit      l'odeur de l'ail. —   ternument   branlant. — Obturation tant  t de l'une, tant  t de l'autre narine. —   Coryza fluent, avec visage alt  r   et t  te entreprise. — Mouchement de grosses masses de mucosit  s blanches et transparentes, sans coryza.

VISAGE. — *Chaleur de la face avec rougeur ardente*, surtout apr  s avoir bu du vin. — Cercles bleus autour des yeux. — Peau marbr  e, dartreuse,    la face. — Sensation br  lante, douleur d'excoriation, picotement et fourmillement pruriant, aux l  vres. — T  r  bration dans la m  choire inf  rieure et les glandes sous-maxillaires.

DENTS. — Odontalgie, avec douleur tractive et pulsative. — *Douleur lancinante dans les dents molaires.* — Carie des dents. — Gencives bleu  tres. — Picotement dans les gencives.

BOUCHE. — Sensation dans la bouche et sur la langue, comme si elles   taient br  l  es et excori  es. — Picotement au bout de la langue. — Bout de la langue bleu  tre. —   Langue charg  e d'un enduit   pais, jaun  tre. —   S  cheresse de la bouche, sans soif. — *Accumulation abondante de salive (douce  tre) dans la bouche.*

GORGE. — *Mal de gorge, comme par une cheville*, ou un gonflement int  rieur, pendant et hors le temps de la d  glutition. — Sensation de constriction dans la gorge. — *Pression et sensation br  lante dans la gorge*, pendant et hors le temps de la d  glutition. — *S  cheresse de la gorge.* — *Apret   et grattement dans la gorge*, avec besoin continuel d'avaler ou de ren  cler. — Inflammation de la luette.

APP  TIT. — *Go  t amer (ou d'une douceur r  pugnante).* — *Forte soif d'eau froide*, de lait et de bi  re, m  me le matin. — Faim avec *r  pugnance pour tous les aliments*, surtout la viande (le caf  , le vin et les acides). — *Boulimie*, surtout le matin et le soir (et principalement pour le miel et les farineux).

ESTOMAC. — Renvois g  n  ralement    vide, et quelquefois avec horripilation. — Renvois douloureux et incomplets. — *Pyrosis.* — **Naus  es avec envie de vomir*, souvent avec horripilation, soulag  es en mangeant. — *Vomissement de lombrics.* — Mollesse, malaise et froid dans l'estomac. — Fouillement dans la r  gion   piga-

strique, avec *douleur d'excoriation* en pressant dessus. — Fréquemment, sensation subite de gêne de la respiration dans le scrobicule, avec anxiété. — Sensation de chaleur au scrobicule et *brûlement à l'estomac*.

VENTRE. — Raclement pressif dans la région hépatique. — Traction fouillante dans le foie, avec douleur d'excoriation en pressant dessus. — Sensation de chaleur dans la région hépatique. — *Mal de ventre, comme par des vers*. — Constriction dans le ventre. — (*Tranchées, comme par des couteaux*). — Élancements violents dans les côtés du ventre qui obligent à se courber. — Térébration, fouillement et rotation dans le ventre. — Sensation de froid, ou *brûlement dans le ventre*. — Contraction crampoïde des muscles du ventre. — Taches et points rouges sur le ventre.

SELLES. — *Constipation*. — *Selle interrompue*, dure, insuffisante. — Forte envie d'aller à la selle, avec évacuation peu abondante. — *Selles diarrhéiques* brunes ou fermentées, mêlées de mucosités et de sang. — Pincements, déchirement et *fourmillement dans le rectum*.

URINES. — *Envie pressante d'uriner*, surtout le soir, avec ténésme et émission peu abondante. — Sécrétion d'urine plus abondante. — Urine trouble, épaisse, bourbeuse. — *Sensation brûlante en urinant*.

PARTIES GÉNITALES. — Douleur fouillante et pressive dans les testicules. — Appétit vénérien diminué. — Érections tensives et douloureuses, sans désir du coït. — Pollutions avec flaccidité de la verge. — (Règles en retard, mais plus abondantes et de plus longue durée.)

LARYNX. — Voix rauque, enrouée. — Renâchement d'un sang rouge vif, venant des fosses nasales. — Toux courte, sèche, même la nuit, par un grattement dans la gorge. — °Toux, avec vomissement, élancements au vertex et douleur à l'estomac. — °Toux sourde, quelquefois avec crachement de sang. — °Toux dès que l'on se couche. — Toux avec expectoration et lancinations dans la poitrine.

POITRINE. — Respiration gênée, comme s'il y avait une pierre sur la poitrine. — *Respiration courte*, difficile. — Respiration sifflante. — Pression à la poitrine. — Sensation brûlante dans la poitrine. — *Élancements dans les côtés de la poitrine*, surtout en respirant et en toussant, qui troublent le sommeil de nuit et ne permettent pas de se coucher sur le côté. — (Inflammation de la plèvre.) — Battement de cœur, avec pulsation dans tout le corps. — Taches et points rouges sur la poitrine.

TRONC. — Douleur de brisement dans le dos et aux reins, surtout en étant assis. — Sensation de constriction depuis les omoplates jusque

dans la poitrine, avec sensation comme si le sang n'y circulait pas, aggravée au froid.

BRAS. — Mouvements convulsifs des bras. — Tremblement des bras et des mains. — Taches, bandes et points rouges aux bras et aux mains. — Lancinations picotantes dans les avant-bras. — Sécheresse de la peau des mains. — Distorsion des doigts. — Taches jaunes aux doigts. — Desquamation de la peau autour des ongles.

JAMBES. — Élançements dans les cuisses et les genoux. — Faiblesse et fléchissement des genoux. — Déchirement et *tension dans les mollets*, même la nuit. — Pesanteur des pieds. — Gonflement des pieds, avec sensibilité douloureuse de la plante des pieds. — Sueur abondante à la plante des pieds.


193. — SABINA.

SABIN. — Sabine. — ARCHIVES DE STAPF. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : 3 à 4 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTE : Camph.

COMPARER AVEC : Acon. *arn.* bell. cham. cocc. graph. ipec. puls. *thui.* veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections arthritiques, aiguës et chroniques; Maladies des os?; Odontalgie rhumatismale; Aménorrhée; Flueurs blanches; *Métror-rhagies actives*, surtout par suite de pléthore, et chez des femmes qui ont été réglées de bonne heure et très-abondamment; *Métror-rhagies* à la suite de l'accouchement, ou par suite d'un avortement; *Disposition à l'avortement*, surtout dans le troisième mois de la grossesse; *Podraga*, etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX. — °Douleurs arthritiques, lancinantes et déchirantes, surtout dans les articulations, °et quelquefois avec gonflement rouge et luisant des parties affectées. — °Nodosités goutteuses. — Traction lancinante dans les os cylindriques. — Sensation brûlante, pressive, dans le périoste qui est gonflé. — Hémorrhagies. — *Battement tressaillant dans toutes les artères*. — Malaise général, comme après avoir beaucoup veillé.

PEAU. — Prurit à la peau, avec excoriation et ulcération ou plaques

croûteuses, après avoir gratté. — Sensation brûlante au toucher, dans les parties de la peau qui sont affectées.

SOMMEIL. — *Sommeil agité*, avec réveil fréquent, bouillonnement de sang, chaleur et sueur. — Rêves anxieux. — Rêves continuels, pleins d'imaginings et d'efforts intellectuels. — Paroles et ronflement bruyant pendant le sommeil. — Disposition à être couché sur le côté gauche, en dormant.

FIÈVRE. — *Horripilation et frisson*, avec chair de poule et obscurcissement de la vue. — Chaleur brûlante sur tout le corps, avec grande agitation. — Chaleur de la face, avec froideur glaciale des pieds et des mains. — Fièvre le soir : d'abord frisson, puis chaleur, et enfin sueur. — Sueur nocturne.

MORAL. — Abattement, découragement et tristesse. — Morosité, avec éloignement pour la conversation, surtout en se promenant au grand air. — Disposition à se fâcher, avec pleurs et sanglots. — Indifférence. — Faiblesse de la mémoire.

TÊTE. — Vertige étourdissant, à faire tomber, avec obscurcissement de la vue. — Accès de migraine. — *Pesanteur et pression* pénible dans la tête, souvent *depuis le sinciput jusque dans la nuque*. — Sensation d'écartement dans le front et les tempes. — Douleurs tractives dans la tête, surtout dans le front et les tempes. — *Douleurs de tête lancinantes*, avec cuisson ou pression, souvent dans tout le cerveau. — Fouillement et térébration dans la tête. — *Maux de tête pulsatifs*, avec pesanteur et étourdissement. — Les maux de tête paraissent souvent subitement, diminuent lentement, et se renouvellent fréquemment.

YEUX ET OREILLES. — Douleurs tensives dans les yeux, comme si les muscles étaient trop courts. — *Yeux ternes, abattus*. — Chaleur des yeux. — Larmes cuisantes. — Tressaillement frémissant des paupières. — Nuages devant les yeux. — Pincement dans les oreilles. — Dureté de l'ouïe.

VISAGE. — Face pâle, avec cercles bleus autour des yeux. — Pores noirs sur les joues et autour du nez. — Douleur paralytique et pression à l'os de la pommette. — Lancinations depuis la mâchoire inférieure, jusque dans l'os de la pommette.

DENTS. — *Odontalgie pendant et après le repas* et la mastication. — *Pression et battement dans les dents, surtout le soir et la nuit, avec *sensation comme si la dent allait être arrachée*, aggravée en buvant, en fumant, et à la chaleur du lit, améliorée après le lever. — Traction dans les dents, en buvant, en mangeant, et par le contact de l'air. — Sensibilité douloureuse et gonflement blanc des gencives, autour d'une dent cariée. — Ulcère des gencives.

BOUCHE. — Exhalaison putride par la bouche, — Salive rougeâtre

ou blanche, qui devient écumeuse en parlant. — *Crachement de sang*. — Langue chargée d'un enduit blanc ou brunâtre.

GORGE. — *Mal de gorge, pendant la déglutition*; comme par un corps étranger ou un gonflement intérieur dans le gosier, avec pression et étranglement. — Lancinations sourdes dans la gorge.

APPÉTIT. — Goût dans la bouche et la gorge, comme d'un vieux rhume. — Goût fade, gras, ou comme de sang, dans la bouche. — *Goût amer de la bouche, et amertume des aliments, surtout du lait et du café*. — Appétence pour les acides, surtout pour la limonade. — Après le repas, aigreurs dans l'estomac.

ESTOMAC. — *Renvois à vide*. — Nausées avec plénitude d'estomac. — *Vomissement de bile*, *ou des aliments. — Plénitude et ballonnement de la région de l'estomac. — *Prassion à l'estomac*. — Lancinations depuis le creux de l'estomac jusqu'à travers le dos.

VENTRE. — Pression dans la région hépatique. — Ballonnement du ventre. — Douleurs contractives dans le ventre. — Pincements pressifs dans le ventre, comme par un refroidissement ou pour une diarrhée. — Inflammation des intestins. — Douleur de meurtrissure dans les muscles abdominaux, le soir, au lit.

SELLES. — Évacuations alvines, d'abord molles, puis dures. — **Selles diarrhéiques*, molles, avec bruit et expulsion abondante de vents. — Écoulement de mucosités sanguinolentes par l'anus. — *Écoulement de sang par l'anus*, après une selle dure. — Boutons hémorroïdaux de l'anus, douloureux. — Fourmillement à l'anus.

URINES. — Rétention d'urine, avec émission goutte à goutte, et sensation brûlante. — Forte envie d'uriner, avec écoulement peu abondant. — Émission d'urine abondante, même la nuit. — Inflammation douloureuse de l'urèthre, avec écoulement de pus, comme par une gonorrhée.

PARTIES VIRILES. — Tumeur dure sur le dos de la verge. — Élançements dans le gland. — Rougeur foncée du gland. — Sensibilité douloureuse du prépuce, avec difficulté de le retirer. — Frein gonflé et tendu. — Douleur d'excoriation aux condylomes. — *Exaltation de l'appétit vénérien*, avec érections violentes et prolongées.

RÈGLES. — Forte exaltation de l'appétit vénérien chez la femme. — Douleur contractive dans la région de la matrice. — Congestion sanguine à l'utérus. — **Métrorrhagies*, avec écoulement d'un sang caillé ou d'un rouge vif, et douleurs comme pour l'enfantement aux reins et dans les aines. — **Règles trop abondantes*. — **Suppression des règles*, avec fleurs blanches. — **Avortement*. — Gonflement sensible des seins. — Fourmillement dans les seins.

— **Leucorrhée* pruriente, jaunâtre, fétide, épaisse comme de l'amidon.

LARYNX ET POITRINE. — *Toux sèche, provoquée par un chatouillement*, ou suivie plus tard d'expectoration de mucosités striées de sang. — Pression à la poitrine. — Tension pressive, crampoïde dans la poitrine, principalement au milieu du sternum. — Élanacement et douleur d'excoriation dans le cartilage syphoïde, avec aggravation en respirant profondément et par le toucher. — Tremblement dans les poumons, avec râlement sourd et pétilllement. — Battements de cœur, augmentés et étendus. — Lancinations à l'extérieur de la poitrine et dans la clavicule.

TRONC. — Traction pressive aux reins, jusque dans la région de l'aîne. — Déchirements pressifs et élancements dans l'épine dorsale. — Douleur de brisement dans les muscles et les vertèbres du cou.

BRAS. — Douleur de luxation dans les articulations de l'épaule et des mains. — Déchirements pressifs et élancements dans les bras, les avant-bras et les doigts. — *Roideur arthritique et gonflement de l'articulation du poignet*; avec déchirement et élancements. — Traction et déchirement dans les os des mains. — Faiblesse des mains (en écrivant). — Distorsion des doigts.

JAMBES. — Furoncle, avec douleur lancinante, à la fesse. — *Douleurs* lancinantes dans les articulations coxo-fémorales, en appuyant le pied. — Pression et traction dans les cuisses et les genoux. — Tension déchirante dans les cuisses, avec sensation, en s'accroupissant, comme si les muscles étaient trop courts. — *Ulère purulent et lardacé sur le tibia*. — Déchirement pressif dans les os des pieds. — **Gonflement rouge et luisant du gros orteil*, avec douleur térébrante et lancinante.

194. — SAMBUCUS NIGRA.


SAMB. — Sureau. — HAHNEMANN. — *Dose usitée*: 30. — *Durée d'action*: souvent seulement 3 à 4 heures, mais plus longtemps dans les affections chroniques.

ANTIDOTES: Ars. camph. — *On l'emploie comme antidote de*: Ars.

COMPARER AVEC: Arn ars. bell. chin. cupr. hep. ipec. merc. n-vom. op. rhus.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Affections hydropiques; Fièvres intermittentes; Hydrocèle, par suite de lésion mécanique; Coryza des nouveau-nés; Croup; Asthmes spasmodiques et crampes de poitrine, chez les adultes, sur-

tout chez des sujets arthritiques, ou par suite d'un refroidissement ; Angine de poitrine ? ; Coqueluche ? ; *Asthme de Millar* ; Croup ; Souffrances phthisiques, etc., etc.

 *Voy. la note, page 17.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Bouillonnement général de sang, le soir, après s'être couché, avec sensation de tremblement. — Souvent traction subite par toute la surface du corps, en étant assis. — La plupart des symptômes se manifestent pendant le repos, et se dissipent par le mouvement. — °Gonflement hydropique de tout le corps. — °Fort amaigrissement. — *Besoin de sommeil sans qu'on puisse dormir.* — *Réveil fréquent en sursaut, avec angoisse, tremblement et étouffement de la respiration, jusqu'à suffoquer. — *Sommeil incomplet, avec bouche et yeux à moitié ouverts. — Rêves lascifs. — Horripilation, avec frisson, froid glacial des mains et des pieds, et fourmillement picotant à la peau. — Frisson grelottant avant de s'endormir. — *Chaleur insupportable, sans soif*, avec crainte de se découvrir. — **Fièvre, avec sueurs excessives, surtout la nuit.* — *Forte disposition à s'effrayer.* — Humeur chagrine, pendant laquelle tout impressionne désagréablement. — *Délires* de temps à autre, avec visions effrayantes.

TÊTE — FACE. — Étourdissement et embarras dans la tête, surtout pendant le mouvement. — Mal de tête, comme par l'ivresse. — Tension dans la tête pendant le mouvement, comme si elle contenait de l'eau. — Pression et expansion dans la tête. — *Maux de tête pressifs, déchirants*, dans le front et les tempes. — Secousses subites dans le cerveau. — Douleur fouillante dans le vertex. — Pupilles, d'abord contractées, puis fortement dilatées. — Lancinations et douleurs crampoïdes dans les oreilles. — Fourmillement pruriant dans les oreilles. — *Sensation de torpeur dans le nez*, avec prurit sur le dos du nez. — Congestion sanguine au nez, avec sensation de pesanteur dans le bout du nez. — Obturation du nez, avec accumulation de mucosités épaisses et visqueuses dans les narines. — **Face bleudtre, bouffie*, °ou pâle et terreuse. — °Rougeur circonscrite des joues. — Sensation de torpeur et tension dans les joues, comme par un gonflement. — Taches rouges, brûlantes, sur les joues. — Pression rongearde dans les os de la mâchoire supérieure.

DENTS — RÈGLES. — Odontalgie, avec *déchirements et lancinations dans toutes les dents*, et avec sensation comme si la joue était gonflée. — Fourmillement pruriant dans la gorge. — Soif, sans que les boissons paraissent bonnes. — Vomissement, le matin,

d'abord du lait qu'on a pris, avec des mucosités, puis de la bile.
 — Pression à l'estomac. — Lancinations aiguës sous l'estomac, aggravées en pressant dessus. — *Pincements dans le ventre*, comme par refroidissement, avec expulsion de flatuosités. — Élanchements dans le côté gauche du bas-ventre. — Douleur de meurtrissure dans le ventre. — Déchirements crampoïdes, élancements et pincements dans les muscles abdominaux. — Douleur pressive dans le ventre, avec nausées en l'appuyant contre un corps dur. — *Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante*, même la nuit. — Urine d'un jaune foncé. — Émission d'urine en un jet mince. — °Gonflement du scrotum. — *Regles trop abondantes*, comme une métrorrhagie.

LARYNX — POITRINE. — Enrouement, par accumulation de mucosités visqueuses dans le larynx. — Toux profonde, rauque, creuse, avec agitation et soif. — °Toux continuelle, avec *expectoration abondante* d'un goût salé, ou de mucosités douceâtres. — **Accès de toux suffocante, avec cris*, chez les enfants. — °Toux, avec cris, comme par une douleur dans le gosier. — **Respiration sibilante* et accélérée. — Suspension de la respiration, en étant couché. — **Accès de suffocation crampoïde la nuit*, avec pleurs, grande agitation et jactation des mains. — *Gêne excessive de la respiration. — Oppression de poitrine, avec lancinations dans le côté, ou avec pression sous le sternum. — °Douleur pressive à la poitrine. — Sensation subite de contraction dans les côtés de la poitrine.

TRONC ET MEMBRES. — Maux de reins, avec pression tractive. — Coups incisifs dans les reins. — *Pression dans le milieu de l'épine dorsale*, pendant le repos et le mouvement. — Lancinations dans les omoplates. — Pesanteur pressive dans la nuque. — Lancinations profondes, incisives, dans les muscles du cou. — Traction dans les avant-bras et les os des mains. — Pesanteur paralytique de l'articulation du coude. — Lancinations dans les poignets. — Tremblement des mains (en écrivant). — Déchirement dans les articulations des doigts. — Tractions crampoïdes et élancements dans les cuisses. — Tension des tendons du jarret, comme s'ils étaient trop courts. — Lancinations aiguës dans le tibia. — °Gonflement œdémateux des pieds, jusqu'aux genoux. — Déchirement dans les jambes et les malléoles.

198. — SANGUINARIA CANADENSIS.

SANG. — Sanguinaire du Canada. — ARCHIVES DE STAFF. — Doses usitées ?
ANTIDOTES ?

CLINIQUE. — En examinant les symptômes que nous donnons plus loin, l'on verra les cas dans lesquels on pourra espérer un secours réel de cette substance contre les affections suivantes : — *Affections rhumatismales et arthritiques* ; Paralysie, faiblesse ; Éruptions urticaires ; Ulcères chroniques ; Excroissances fongueuses ; Verrues ; Ictère ; *Fièvres intermittentes* ; *Fièvres lentes* ; *Fièvres des marais* ; Migraine ; Polype nasal ; *Angines et esquinancies* de différentes sortes ; *Souffrances gastriques* ; Gastrite ; Affections hépatiques ; Inflammation des organes abdominaux en général ; Indurations dans le ventre ? ; Coliques spasmodiques ; Diarrhées ; Hémorroïdes ; Gonorrhées ? ; Métorrhagies ; Avortement ; Aménorrhée ; Souffrances de l'âge critique ; Croup ; Grippe ; Coqueluche ; Asthme ; *Pneumonies* ; Phthisie pulmonaire ; *Panaris*.

GÉNÉRALITÉS. — **Douleurs rhumatismales et arthritiques dans les membres*, parfois avec roideur. — Le soir, douleur dans les parties du corps où les os sont moins couverts ; au toucher, la douleur disparaît pour reparaitre immédiatement à un autre endroit. — *Grande faiblesse*, surtout pendant et après les vomissements, ou le soir en se promenant au grand air, dans les jambes. — Faiblesse comme de défaillance. — Insensibilité générale et froid. — Roideur spasmodique des membres. — Torpeur et langueur. — **Paralysie du côté droit*. — *Changement continuel des symptômes*, dès qu'un symptôme nouveau se manifeste, l'ancien disparaît. — La plupart des symptômes paraissent se manifester le soir et le matin.

PEAU. — **Sécheresse et chaleur de la peau*. — **Éruption urticaire*, pruriteuse, précédée de mal au cœur. — **Ulcères chroniques*, indolents, calleux et ichoreux. — **Excroissances fongueuses*. — **Verrues*. — **Jaunisse*.

SOMMEIL. — *Insomnie*. — Réveil en sursaut, comme par une chute. — Rêves de voyages par mer, espèce de vertige. — Rêves d'un pendu.

FIÈVRE. — *Frissons* : le soir au lit, avec horripilation au dos ; avec grelottement, et douleur sous l'omoplate pendant le mouvement ;

avec nausées; pendant le mal de tête. — **Chaleur fugace*, °parfois comme si un courant d'eau bouillante se répandait de la poitrine au ventre; chaleur fugace depuis la tête jusqu'à l'estomac. — Chaleur brûlante, alternant rapidement avec frissons et horripilations. — °Chaleur avec peau sèche et pouls fréquent. — Pulsations par tout le corps. — *Les fortes doses rendent le pouls plus fréquent*; les faibles doses, au contraire, en diminuent la fréquence. — **Pouls irrité, dur, fréquent*; ou bien °souple, plein, vibrant et facile à comprimer pendant les pneumonies. — Pouls supprimé, avec défaillance, par de fortes doses. — Sueurs abondantes.

MORAL. — Irritabilité chagrine. — Angoisse avant les vomissements. — (Délires).

TÊTE. — **Vertiges*: °en tournant rapidement la tête et en levant les yeux; °avec tintement des oreilles, renvois d'air et chatouillement au gosier, forçant à tousser; avec obscurcissement de la vue avant et après les vomissements; avec mal au cœur. — Étourdissement et embarras à la tête, avec rapports. — Congestion à la tête, avec bourdonnement des oreilles et chaleur fugace, suivie d'écoulement d'eau de la bouche comme pour vomir, et se terminant par une selle. — Pesanteur au cerveau. — Mal de tête comme si le front allait éclater, avec frisson, et avec brûlement dans l'estomac. — Douleurs de tête qui passent rapidement d'un endroit à l'autre. — Élançements au front et à la tempe gauche. — Forte douleur dans tout le côté gauche de la tête, surtout à l'œil, et en même temps au pied gauche. — Mal de tête avec douleurs rhumatismales et roideur des membres et de la nuque, et précédé d'envie de vomir. — **Mal de tête avec vomissement amer*, °parfois débutant le matin, supportable seulement dans un repos absolu, et amélioré par le sommeil. — *Mal de tête pulsatif*, aggravé par le mouvement, et parfois avec vomissement amer. — *Pendant le mal de tête*: chatouillement dans la gorge; frissons, parfois avec nausées, suivies de chaleur fugace depuis la tête jusqu'à l'estomac; vertiges et douleur à l'oreille. — *Les maux de tête s'aggravent particulièrement par le mouvement et en se baissant*, et viennent parfois par accès. — °Mal de tête avec douleur d'excoriation, surtout aux tempes. — °Mal de tête remontant de la nuque comme un rayonnement. — Sensation comme si quelque chose tirait la tête en avant. — Douleur d'excoriation aux téguments de la tête, en y touchant. — *Sensation comme si la peau de la tête était détachée du côté droit*, avec tiraillement en levant les yeux. — **Enflure des veines à la tête*, °particulièrement aux tempes.

YEUX. — *Yeux larmoyants*, avec brûlement, ou bien avec douleur au toucher, suivie de coryza. — Sensation comme si des vapeurs

acides étaient entrées dans l'œil. — Yeux troubles, avec sensation comme s'il y avait des cheveux dedans. — Scintillement devant les yeux. — Obscurcissement fréquent de la vue. — Pupilles dilatées.

OREILLES. — Battement au-dessous des oreilles. — °Douleur d'oreille, avec mal à la tête. — °Chaleur brûlante aux oreilles, avec joues rouges. — Élançement dans l'oreille gauche. — Bruissement et tintement dans les oreilles. — Ouïe très-sensible, chaque coup de marteau (d'une forge) est ressenti douloureusement.

NEZ. — Sensation de chaleur dans le nez. — Perte de l'odorat. — Odeur devant le nez, comme des oignons rôtis. — Répugnance pour l'odeur de la mélasse. — *Éternument fréquent.* — *Coryza fluent, corrosif, avec excoriation des narines*, ou bien avec larmolement violent de l'œil droit et selles diarrhéiques. — Alternation de coryza fluent et d'obturation du nez. — °Coryza avec gorge enrouée, douleur de poitrine, toux et diarrhée.

FACE. — Sensation de plénitude à la face. — Bouffissure du visage, avec rougeur foncée et sensation de roideur. — *Rougeur de la face*, parfois avec chaleur et brûlement. — °Rougeur de l'une des joues. — °Rougeur circonscrite de la face. — Face pâle pendant l'envie de dormir. — °Couleur livide des joues et des mains, dans les pneumonies typhoïdes. — Tressaillement aux pommettes. — Roideur des mâchoires. — *Sensation de sécheresse aux lèvres.*

DENTS. — *Douleur dans les dents cariées*, surtout au contact des aliments, ou en y portant le cure-dent. — Rongement dans une molaire. — *Mal aux dents, au réveil*, avec mal de tête du même côté (droit), *aggravation du mal de dents par l'eau froide* et amélioration par des boissons chaudes. — *Branlement des dents*, au point qu'on croit les pouvoir ôter toutes.

BOUCHE. — *Salivation*, avec branlement des dents. — *Fourmillement et picotement à la langue*, surtout au bout de la langue. — *Sensation d'excoriation* et de *sécheresse* à la langue, comme après avoir mangé des choses âcres, le matin, au réveil. — °Langue au vif, avec douleur d'ulcération. — Élançement au côté gauche de la langue. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Perte du goût.

GORGE. — Sensation de sécheresse dans la gorge, sans soulagement par la boisson. — Chaleur dans la gorge, soulagée par l'inspiration de l'air frais. — Sensation d'âcreté, comme après avoir mangé quelque chose d'âcre. — *Brûlement dans le gosier*, surtout après avoir mangé des choses sucrées. — *Sensation de gonflement*: comme si la gorge était fermée, et que la tumeur allait l'étouffer, avec aphonie; ou bien le soir, *le plus fort pendant la déglutition*, et surtout du côté droit. — °Ulcération à la gorge.

APPÉTIT ET GOUT. — **Manque d'appétit*, avec langue chargée d'un enduit blanc. — Le sucre paraît amer, et cause un brûlement au gosier. — Goût gras ou muqueux à la bouche. — Répugnance pour le beurre, qui a un arrière-goût douceâtre. — Désir de choses non définies, avec manque d'appétit. — Désir de choses piquantes. — **Grande faiblesse de digestion*. — Après le repas, sensation de vacuité dans l'estomac.

ESTOMAC. — *Renvois*: spasmodiques et à vide; d'une odeur désagréable, avec envie de vomir et face pâle; avec soulagement des étourdissements. — *Pyrosis et dégoût*. — Hoquet en fumant du tabac. — *Pituites* avec envie de vomir. — **Nausées*: après le repas; *périodiques*, avec manque d'appétit; en se baissant; avec besoin de cracher beaucoup; avec salivation et sensation comme si l'on allait mourir; avec frissons et chaleur, pendant le mal de tête aussi; avant l'éruption urticaire, ou avant le mal à la tête. — *Vomissements*: précédés de grande angoisse, d'envie inutile d'aller à la selle, ou de beaucoup d'autres souffrances; avec désir de manger, pour apaiser le mal de cœur; avec diarrhée; avec grande faiblesse; *vomissements amers*. — *Sensation de chaleur, ardeur et brûlement dans l'estomac*. — Mouvements dans l'estomac, comme si quelque chose de vivant y sautillait. — *Inflammation de l'estomac*?

VENTRE. — *Douleurs dans les hypochondres*, avec vertiges continus et lassitude. — **Douleur dans l'hypochondre gauche*, plus forte en toussant, moindre en pressant dessus et en se pliant à gauche. — **Torpeur et atonie du foie*. — **Sensation d'un courant chaud passant de la poitrine au ventre*, suivie de diarrhée. — Battement dans le ventre. — Crampe dans le ventre, passant d'une place à l'autre. — **Ballonnement du ventre*, le soir, avec émission de vents par le vagin. — Émission de vents par le haut et le bas, en se redressant à cause de la toux, qui disparaît ensuite. — Les maux de ventre viennent par accès. — Tranchées tractives. — Douleur fouillante dans le ventre, la nuit, avec maux de reins. — Élançements violents dans le ventre, comme par des couteaux, suivis de diarrhée aqueuse. — Le matin, colique, suivie de diarrhée. — Sortie fréquente de vents fétides.

ANUS ET SELLES. — *Envie inutile d'aller à la selle*, avec sensation d'un gros tampon dans l'anus, ou bien suivie de vomissement, ou encore avec émission fréquente de vents. — *Diarrhée*: avec émission fréquente de vents; précédée de tranchées, de coliques, de douleurs violentes. — *Après les selles diarrhéiques*, cessation du coryza, de la toux, des douleurs de poitrine. — Selles avec évacuation des aliments non digérées. — Selles molles, plus fréquentes, les premiers jours.

URINES. — *Pissement fréquent, surtout la nuit aussi, avec émission fréquente d'urines claires, aqueuses.*

PARTIES VIRALES. — *Pollutions, deux nuits de suite.*

RÈGLES. — *Souvent mal au ventre, comme si les règles allaient venir.*

— Règles trop hâtives de 8 jours, avec sang noir. — Règles plus fortes, avec mal à la tête surtout du côté droit, comme si les yeux allaient sortir de la tête. — Métrorrhagies. — Avortement. — Émission de vents par le vagin, avec orifice ouvert de la matrice. — Élançement dans les mamelles. — Douleur d'excoriation au-dessous du mamelon droit, plus sensible au toucher. — Excoriation et sensibilité douloureuse des mamelons.

LARYNX. — *Toussotement fréquent, surtout en mangeant; ou bien avec chatouillement à la gorge, le soir, parfois surtout après s'être couché, ou avec mal à la tête. — Toux sèche pendant le sommeil, et réveillant, ne cessant que par l'émission de vents par le haut et le bas après s'être redressé sur son séant. — *Toux, *avec ou *sans expectoration, *parfois violente, continue, avec rougeur circonscrite des joues, et douleur de poitrine. — Facilite l'expectoration.*

POITRINE. — **Douleurs de poitrine, avec toux périodique, avec ou sans expectoration. — *Respiration difficile, avec couleur livide des joues et des mains, et pouls vibrant et facile à comprimer (dans une pneumonie typhoïde). — *Pression et ardeur à la poitrine, suivies de chaleur dans le ventre et diarrhée. — *Oppression et sensation de faiblesse dans la poitrine. — Sensation d'un courant ardent dans le côté droit de la poitrine, partant de la clavicule et de l'aisselle droites, et descendant jusqu'à la région du foie. — Élançements, dans la poitrine, à droite et à gauche. — Pression dans la poitrine, le dos et la région du cœur. — Battement de cœur avec grande faiblesse.*

TRONC. — **Maux de reins à la suite d'un tour de reins. — *Douleurs au dos. — Mal aux reins, soulagé en se courbant en avant. — *Douleurs rhumatismales à la nuque, aux épaules et aux bras, *parfois le plus fort la nuit, au lit, et surtout en se retournant. — Douleur d'excoriation à la nuque. — Douleur au cou, comme à la suite d'un tour de reins.*

EXTRÉMITÉS SUPÉRIEURES. — *Douleurs rhumatismales dans les bras et la paume des mains. — Douleur d'ulcération dans la paume des mains. — Brûlement à la paume des mains, parfois avec rougeur. — *Couleur livide des mains. — *Roideur des articulations des doigts. — Douleur d'ulcération au-dessous de l'ongle du pouce. — *Panaris à tous les doigts.*

EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES. — **Douleurs rhumatismales et de meurtrissure dans la hanche gauche, *ainsi qu'au côté intérieur de la*

cuisse droite, °ou bien alternant avec brûlement et pression dans la poitrine. — *Roideur et tension dans les jarrets.* — Crampe et traction dans les mollets. — Élançements dans l'articulation du pied et les malléoles. — °Pieds froids, après midi. — **Brûlement à la plante des pieds et à la paume des mains, plus fort la nuit, au lit.* — Douleurs aux cors. — Grande faiblesse dans les jambes.

196.—SAPO DOMESTICUS.

SAP. — Savon de ménage. — Médicament qui n'est point encore connu, quant à ses effets primitifs, mais qui a été employé à l'extérieur et à l'intérieur (30°) contre des *Brûlures*.


197.—SASSAPARILLA.

SASS. — Salsepareille. — HAHNEMANN. — *Doses usitées : 30.* — *Durée d'action : jusqu'à 5 semaines dans des affections chroniques.*

ANTIDOTES ?

COMPARER AVEC : Amm. cham. clem. cocc. merc. puls. ran. sep. sil. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales et arthritiques, surtout à la suite d'un refroidissement dans l'eau ou après la suppression d'une gonorrhée; *Ulcères* et autres souffrances par l'abus du mercure; Dartres, Calculs urinaires et rénaux; Constipation, etc., etc.

 *Voy. la note, page 17.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs lancinantes, déchirantes, pressives.* — *Déchirement paralytique dans toutes les articulations et les membres*, souvent accompagné de tremblement des mains et des pieds, déchirements douloureux dans la tête, et pincements dans le ventre. — °Douleurs arthritiques, avec diminution de la sécrétion des urines. — Roideur et immobilité des membres. — Gonflements chauds et épais. — Grande lassitude, surtout dans les membres inférieurs. — Lassitude dans les mains et les pieds. — *Amaigrissement.* — Les douleurs attaquent le moral et abattent l'esprit.

PEAU. — *Prurit*, quelquefois sur tout le corps, surtout le soir au lit, et le matin, en se levant. — Boutons rouges et secs, qui ne dé-

mangent qu'à la chaleur. — Éruption miliaire, au contact de l'air frais, en sortant d'un appartement chaud. — Éruptions urticaires. — Vésicules purulentes. — *Dartres*, presque à toutes les parties du corps. — Verrues. — *Peau ridée*. — *Rhagades* profondes, brûlantes, douloureuses (aux doigts).

SOMMEIL. — Sommeil de bonne heure, le soir. — Insomnie nocturne et réveil fréquent. — *Rêves effrayants*, avec sursauts fréquents.

FIÈVRE. — Frissons nuit et jour. — *Froid*, même auprès du feu, par tout le corps, excepté au visage et à la poitrine, mais principalement *aux pieds*. — Chaleur le soir, avec bouillonnement de sang, battement de cœur et sueur au front.

MORAL. — Anxiété, avec tremblement dans les pieds. — Morosité et mauvaise humeur, avec aptitude au travail. — Irrascibilité et susceptibilité. — Humeur changeante.

TÊTE. — Vertige, en fixant longtemps les yeux sur un objet. — Vertiges, avec nausées et renvois aigres. — Maux de tête, avec nausées et vomissements aigres. — Maux de tête *lancinants* ou pressifs, ou bien *pressifs et lancinants à la fois*. — Douleurs de tête crampoïdes, semi-latérales, comme si la tête était serrée dans un étau, avec obscurcissement des yeux, besoin de se coucher et résonnement dans le cerveau à chaque parole qu'on prononce. — *Douleurs battantes dans la tête*. — Bruit et bourdonnement dans la tête. — *A l'extérieur de la tête*, douleurs pressives et incisives, ou *lancinantes pressives*, tractives et déchirantes, aggravées par le contact et la marche. — Sensibilité du cuir chevelu. — Chute des cheveux.

YEUX. — Douleurs dans les yeux, par la clarté du jour. — Pression dans les yeux, surtout le soir, en lisant aux lumières. — *Élancements dans les yeux*. — Sensation brûlante dans les yeux et les paupières. — Agglutination des paupières, le matin. — Angles internes des yeux, bleus et gonflés. — *Obscurité devant les yeux*, comme un brouillard. — Reflet rouge du papier blanc, le soir.

OREILLES ET NEZ. — Élancements dans les oreilles. — Contraction et pression dans les oreilles. — Croûtes brûlantes, pruriantes, aux lobes des oreilles. — Tintement et sonnerie dans les oreilles. — Épistaxis. — Éruption croûteuse, sur, sous et dans le nez. — Coryza sec et obturation du nez. — Mucosités nasales très-épaisses.

VISAGE. — *Éruption faciale*. — Éruption pruriente sur le front, avec sensation brûlante et suintement après avoir gratté. — Taches rudes, rouge pâle sur le front. — *Croûtes épaisses au visage. — Roideur et tension dans les masséters, et les articulations de

la mâchoire. — Dartre sur la lèvre supérieure. — Vésicules purulentes et pruriantes au menton.

DENTS. — Odontalgie, avec déchirements tractifs, par un courant d'air froid ou par des boissons froides. — Agacement des dents supérieures. — Déchirement dans les gencives. — Gencives gonflées, avec douleur d'excoriation.

BOUCHE ET GORGE. — Sécheresse de la bouche. — Aphthes sur la langue et au palais. — Mal de gorge, avec douleur lancinante, en avalant. — Pression crampoïde dans la gorge, *comme un étranglement*, avec gêne de la respiration. — Sécheresse et âpreté dans la gorge, surtout le matin. — Accumulation de mucosités visqueuses dans la gorge.

APPÉTIT. — *Goût amer*, ou acide et pâteux, ou bien douceâtre, métallique et herbacé. — Amertume du pain. — Insipidité des aliments. — Après le repas, sensation de vide dans l'estomac, comme si on était à jeun, ou bien dégoût seulement en pensant à ce que l'on a mangé. — Soif d'eau surtout, même le matin.

ESTOMAC. — *Renvois et régurgitations*, surtout pendant et après le repas, généralement *amers* ou aigres. — *Nausées fréquentes ou continuelles, avec envie inutile de vomir. — Vomissements aigres. — Douleurs constrictives dans l'estomac. — Pression dans le creux de l'estomac. — Chaleur et sensation brûlante dans l'estomac, surtout après avoir mangé du pain.

VENTRE. — Douleur de brisement dans l'hypochondre gauche. — Elancements dans l'hypochondre gauche. — Grande sensibilité du ventre à la pression extérieure. — Douleurs intestinales, constrictives et crampoïdes. — Tranchées, surtout dans la région ombilicale. — *Elancements dans les côtés du ventre*, surtout dans le côté gauche. — Sensation de froid, ou chaleur et sensation brûlante dans le ventre. — *Sensation de vacuité et borborygmes dans le ventre*. — Expulsion abondante de vents fétides. — Inertie des intestins.

SELLES. — Selles dures, retardées et rares, souvent avec besoin pressant. — *Evacuations alvines, douloureuses, difficiles*, avec douleurs contractives dans le ventre et forte pression vers le bas. — °Constipation opiniâtre, avec envie fréquente d'uriner. — Selle gluante, tenace. — Selles diarrhéiques, âcres, corrosives, avec maux de ventre. — Pendant la selle, accès d'évanouissement. — Douleur d'excoriation et prurit brûlant à l'anus.

URINES. — *Ténésme vésical*, avec pression sur la vessie et écoulement d'une matière blanche et trouble, mêlée de mucosités. — Envie fréquente d'uriner, sans résultat, ou avec émission peu abondante. — *Emission fréquente et abondante d'une urine pâle*,

jour et nuit, souvent sans sensation dans les voies urinaires. — Urine trouble, bourbeuse. — Urine enflammée, rare, rouge. — Flocons filiformes dans les urines. — Sang dans les urines, vers la fin de l'émission. — *Urines chargées de gravelle et de petits calculs. — *Sensation brûlante en urinant*. — Crampe de la vessie, avec douleur contractive. — Écoulement de pus par l'urèthre, comme une gonorrhée.

PARTIES GÉNITALES. — Exhalaison fétide des parties génitales. — Inflammation et rougeur du gland. — Dartre sur le prépuce. — Désir du coït, avec pollutions fréquentes et douloureuses. — Règles en retard, peu abondantes et âcres. — Pendant les règles, envie d'uriner, excoriation entre les cuisses, pincements dans le ventre et serrement comme par une griffe aux reins, et dans le creux de l'estomac. — Leucorrhée muqueuse.

LARYNX. — Toux violente, avec sensation d'ulcération chatouillante dans le gosier, ou par une âpreté dans la gorge. — Respiration courte et gênée. — Forte dyspnée et étouffement, par une sensation de constriction dans la gorge, qui oblige à se débarrasser de tous les vêtements qui couvrent le cou et la poitrine. — *Oppression crampoïde de la poitrine*. — Respiration profonde, fréquemment. — En respirant profondément, sensation comme s'il y avait un corps qui se fût arrêté dans le dos. — Haleine fétide. — Pression à la poitrine, souvent avec haleine courte. — Élançements dans les côtés de la poitrine, qui forcent souvent à se replier sur soi-même. — Battements de cœur. — Douleur tensive à l'extérieur de la poitrine, comme par raccourcissement, en se redressant. — Mamelons flétris, insensibles.

TRONC. — Douleur de brisement aux reins, surtout pendant qu'on se baisse et après. — Fourmillement aux reins. — Douleur tensive depuis les reins jusque sur les hanches, au moindre mouvement. — Pression douloureuse et tension dans le dos et la nuque, avec *lancinations au moindre mouvement* du tronc ou de la tête. — Lancinations entre les omoplates et dans les muscles du cou. — Gonflement d'un côté du cou, douloureux au toucher.

BRAS. — *Déchirements et élancements pressifs* dans les bras, les avant-bras et les articulations des mains et des doigts. — Sueur aux mains. — Dartres aux mains. — Engourdissement des doigts. — Douleur au bout des doigts, comme par ulcération sous-cutanée. — Vésicules purulentes aux doigts. — *Rhagades profondes à la peau des doigts*.

JAMBES. — *Déchirements pressifs et élancements* dans les cuisses, les genoux et les jambes. — Lassitude dans les cuisses et les articulations des genoux. — Gonflement et roideur des genoux, avec

élançements. — Taches dartreuses, rouges, aux mollets. — Roideur des jambes, comme par contraction. — Crampes dans les jambes et les mollets. — Sensibilité douloureuse de la plante des pieds. — Tension et gonflement des pieds, avec chaleur et rougeur. — *Froid aux pieds, *surtout avant de se coucher.

198. — SCROPHULARIA NODOSA.

SCROPHUL. — Grande scrofulaire. — ARCHIVES DE STAFF. — *Durée d'action?*
ANTIDOTES?

SYMPTOMES. — *Grande envie de dormir* : le matin, avec lassitude et plénitude dans tout le corps; avant et après le repas, insurmontable, et sieste prolongée. — *Tête* entreprise et lourde, comme après un repas trop abondant; *vertige* dans le vertex, en se tenant debout; *céphalalgie frontale, le matin*, quelquefois pressive; céphalalgie au-dessus des sourcils, en marchant. — *Globe de l'œil* douloureux; élançements pulsatifs au sourcil droit. — *Tintement d'oreilles*. — Au *visage*, chaleur agréable aux joues. — Sur la *langue*, accumulation partielle d'eau douceâtre. — Dans la *gorge*, le matin, mucosités épaisses, visqueuses, d'un goût désagréable; goût âcre, avec grande faiblesse et roideur des articulations du genou; sensation comme s'il y avait un *corps mou*, ou bien un *morceau de mucosités* dans le gosier, avec goût répugnant, visqueux, immédiatement au-dessus de la fossette du cou. — *Coliques* au-dessus de l'*ombilic*, l'après-midi, avec pincements dans le côté; pincements sur le devant du ventre, le matin. — Dans l'*urèthre*, ténésmes et élançements; émission fréquente d'une urine rare, l'après-midi. — Dans la *poitrine*, constriction au travers, comme après avoir beaucoup pleuré; élançements aigus, pinçants, dans la région des dernières vraies côtes droites, en marchant; oppression de poitrine, avec tremblement, comme après avoir beaucoup pleuré. — Dans les *bras* et les *main*s, bourdonnement; tiraillements et élançements spasmodiques dans les muscles de la paume de la main gauche.


199. —SECALE CORNUTUM.

SEC. — Seigle ergoté. — HARTLAUB ET TRINKS. — *Doses usitées* : 3, 30. — *Durée d'action* : jusqu'à 7 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Camph. (solan.-nigr.).

COMPARER avec : Arn. camph. ign. laur. veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — *Hémorrhagies*, surtout chez les sujets faibles, cachectiques; *Spasmes hystériques*, chez des femmes d'une constitution faible; *Convulsions* par suite d'une frayeur; *Gangrène sénile*??; *Amblyopie amaurotique*; *Hémorrhagie nasale*; *Souffrances des enfants*, par suite de la dentition; *Affections gastriques* et bilieuses; *Coliques*; *Gastrite*??; *Entérite*??; *Choléra asiatique et sporadique*; *Cholérine*; *Diarrhées*, surtout chez les vieillards; *Métrorrhagies* des femmes faibles et cachectiques; *Prodrômes de l'avortement*, surtout dans le troisième mois; *Absence de douleurs d'enfantement*; *Douleurs d'enfantement spasmodiques*; *Adhérence du placenta*; *Lochies de trop longue durée*; *Métrite* par suppression des lochies; *Affections hystériques* par manque de vitalité dans l'utérus?; *Affection gangréneuse de la matrice*, etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Traction, déchirement et fourmillement dans les membres et les articulations.* — *Douleurs cram-poïdes*, violentes et erratiques. — *Sensation brûlante dans toutes les parties du corps*, comme par des étincelles. — *Distorsion des membres.* — *Spasmes toxiques.* — *Tressaillements et mouvements convulsifs dans les membres*, se manifestant surtout la nuit, souvent aussi périodiquement, et soulagés en étirant violemment les parties. — *Tétanos.* — *Attaques d'épilepsie.* — *Atrophie générale et amaigrissement.* — *Marche mal assurée.* — *Évanouissements.* — *Grande lassitude et paresse.* — *Tremblement des membres.* — *Faiblesse, pesanteur et torpeur des membres.* — *Paralysies.* — *Mort de quelques parties par le sphacèle.*

PEAU. — *Peau blafarde, plombée, flétrie et ridée.* — *Peau rude, sèche.* — *Torpeur et insensibilité de la peau.* — *Éruption miliaire*, surtout à la poitrine et à la nuque. — *Fourmillement sous-cutané.* — *Desquamation générale de l'épiderme.* — *Pétéchies.*

— Furoncles. — Pustules noires, gangréneuses. — Vésicules sanguinolentes, et qui passent à la gangrène, aux membres.

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir et somnolence.* — Sommeil profond, comateux. — *Insomnie avec agitation et chaleur sèche. — *Somnolence avec délire, sursauts et effroi.

FIÈVRE. — Frisson violent, suivi de chaleur brûlante, avec forte soif. — *Froid excessif dans le dos, le ventre et les membres. — *Chaleur sèche, avec pouls accéléré, agitation et insomnie. — *Pouls petit, supprimé. — *Sueurs froides.

MORAL. — Découragement et caractère peureux. — *Tristesse et mélancolie. — *Forte angoisse. — *Démence furieuse*, avec désir de s'élancer dans l'eau. — Fureur et envie de mordre. — **Crainte de la mort.* — Manie. — Faiblesse des facultés intellectuelles. — Aliénation mentale. — *Délires. — *Perte de connaissance.*

TÊTE. — *Tête embarrassée, étourdie.* — Ivresse. — **Accès de vertiges de diverses natures*, même opiniâtres. — *Mal de tête*, avec embarras sourd et douloureux, surtout à l'occiput, — Douleur de tête semi-latérale. — *Chute des cheveux.*

YEUX. — **Globe des yeux enfoncé.* — Pupilles contractées spasmodiquement, ou bien dilatées. — Yeux convulsés. — *Regard fixé, égaré.* — Diplopie. — Brouillard, taches et voile devant la vue. — Faiblesse de la vue. — Scintillement devant les yeux et obscurcissement de la vue.

OREILLES ET NEZ. — Bourdonnement d'oreilles et *dureté de l'ouïe.* — Surdité passagère. — **Épistaxis.*

FACE ET DENTS. — **Visage décoloré, pâle, jaune, hâve, avec yeux caves, bordés d'un cercle bleu.* — Distorsion des traits du visage. — Taches livides à la face. — Visage d'un rouge foncé. — Gonflement de la face. — *Fourmillement dans le visage.* — Lèvres et bouche douloureusement contractées. — *Trismus.* — Grincement des dents. — *Vacillement et chute des dents.*

BOUCHE ET GORGE. — Sécheresse de la bouche, avec soif. — *Craquement de sang.* — *Écume à la bouche*, sanguinolente ou vert jaunâtre. — Langue décolorée, brune ou noire, ou bien chargée d'un enduit épais. — *Fourmillement douloureux dans la langue.* — Gonflement de la langue. — *Parole bégayante, embarrassée, indistincte, faible.* — Sécheresse de la gorge. — *Sensation brûlante, ou fourmillement pénible dans la gorge.* — (Inflammation de l'œsophage).

ESTOMAC. — Goût émoussé. — **Soif ardente, inextinguible.* — Faim insatiable, surtout pour les acides. — *Renvois fréquents. — **Dégoût et nausées.* — **Vomituration et vomissement de matières bilieuses, crues.* — Vomissement facile. — **Vomissement*

des aliments, avec grande débilité. — Vomissement de lombrics. — *Vomissement de mucosités.* — Vomissement de bile noire. — *Pression à l'estomac.* — Crampe d'estomac. — *Sensibilité douloureuse excessive, oppression pénible et angoisse dans le creux de l'estomac,* avec envie inutile de vomir. — *Sensation brûlante dans le scrobicule et l'estomac.* — Inflammation et cancer de l'estomac.

VENTRE. — *Ventre excessivement ballonné et tendu. — °Tranchées et douleurs déchirantes dans le ventre. — °Douleurs fixes, brûlantes dans les régions splénique et lombaire. — °Coliques, avec maux de reins, douleurs dans les cuisses, rapports fréquents et vomissements. — **Coliques douloureuses, avec convulsions.* — Sensation d'un froid excessif dans le ventre et le dos. — *Sensation brûlante dans le ventre. — °Borborygmes.

SELLES. — Constipation, avec besoin continu et inutile d'aller à la selle. — *Selles diarrhéiques, fréquentes, avec évacuations sereuses, muqueuses,* ou bien décolorées, ou brunâtres. — Diarrhée d'odeur putride. — **Diarrhées,* avec °prostration subite des forces. — *Selles involontaires.* — Expulsion de vers.

URINES. — Suppression de la sécrétion des urines. — °Urines rares, chaudes, brûlantes. — Urine émise goutte à goutte; difficile, rare, avec besoin continu. — *Urine claire comme de l'eau,* blanche. — Sécrétion d'urine augmentée. — *Hémorrhagie par l'urèthre.*

RÈGLES. — **Règles trop abondantes et de trop longue durée,* quelquefois avec spasmes violents. — **Métrorrhagies* d'un sang noir, liquide, coulant surtout pendant un mouvement un peu fort, quelquefois avec fourmillement dans les jambes et grande débilité. — *Avortement.* — °Après l'avortement, manque de contraction de l'utérus. — °Gonflement et verrues au col de la matrice qui est béant. — *Congestion sanguine à l'utérus. — Lochies rares, fétides ou de trop longue durée et sanguinolentes.

POITRINE. — Voix rauque, creuse. — Respiration anxieuse et gênée, avec soupirs et sanglots. — Dyspnée et oppression de poitrine. — *Oppression de poitrine suffocante,* avec crampe dans le diaphragme. — *Battements de cœur spasmodiques,* violents.

TRONC. — *Fourmillement et insensibilité dans le dos.* — Roideur de la nuque. — Sensation de froid au dos. — °Forte éruption miliaire à la nuque *et à la poitrine.

BRAS. — Courbure spasmodique du bras, avec tiraillement dans la partie. — *Sensation brûlante dans les mains.* — Gonflement des mains, avec pustules noires. — Gonflement œdémateux à l'articulation de la main. — Distorsion des mains. — *Fourmillement dans le bout des doigts,* avec torpeur et insensibilité de ces parties.

— Contraction, distorsion et renversement des doigts. — Sphacèle des doigts.

JAMBES. — Lassitude et endolorissement dans les jambes. — Contraction des jambes et des orteils. — **Crampes pénibles dans les mollets et la plante des pieds, surtout la nuit.* — *Sensation brûlante dans les pieds.* — Distorsion des pieds. — *Gonflement des pieds, avec pustules noires.* — Sphacèle des orteils. — *Fourmillement dans les orteils.*

200. — SELENIUM.

SEL. — Selenium. — **HERING.** — *Doses usitées : 30.* — *Durée d'action : 5 à 6 semaines* dans les affections chroniques.

ANTIDOTES : Ign. puls. — Le vin. et chin. aggravent les souffrances.

COMPARER AVEC : Carb. cinnab. graph. ign. lach. merc. nitr-ac. puls. rhus. sulf. thui. — C'est surtout après cinnab., que selen. est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs dans tous les membres, comme par un refroidissement. — *Amaigrissement* excessif, surtout du visage, des mains et des jambes. — Le china produit des souffrances extraordinaires et aggrave celles déjà existantes d'une manière insupportable. — *Grand désir d'être couché et de dormir, surtout pendant la chaleur du jour.* — *Aggravation des symptômes après avoir dormi.* — *Impossibilité de supporter le courant d'air.* — *Accès de vertige avec défaillance, sueur anxieuse, face pâle et décomposée, nausées et vomissements, surtout après le déjeuner et le repas fait à midi, avec grande faiblesse, selles bilieuses, élancements dans la poitrine comme par des flatuosités incarcérées, tête douloureusement entreprise, hoquets et rapports fréquents.*

PEAU. — Fourmillement fréquent à des parties circonscrites de la peau, avec forte envie de gratter. — Éruptions miliaires. — *Suintement prolongé des parties que l'on a grattées.* — Ulcères lisses.

SOMMEIL. — Envie de dormir; le soir, de bonne heure, avec sommeil incomplet la nuit et réveil fréquent. — Sommeil tardif, le soir. — Tressaillement du corps en s'endormant. — *Sommeil léger, la nuit, avec réveil au moindre bruit.* — *Réveil de bon matin et toujours à la même heure.* — Rêves de querelles et de cruautés contre nature. — Sommeil plein de rêves avec des comptes et des calculs. — Rêves de voyages.

FIÈVRE. — Ardeur brûlante à quelques parties assez étendues de la peau (de la poitrine, du ventre, des lombes et des côtés). — Chaleur et froid alternant constamment. — *Tendance par trop excessive à transpirer*, pendant la marche et la sieste. — Sueur qui fait des taches blanches dans le linge et le roidit (sur la poitrine et sous les aisselles).

MORAL. — *Révasseries religieuses et mélancoliques.* — Grande *loquacité*. — Oubli excessif, surtout dans les affaires. — Incapacité absolue d'exécuter un travail quelconque.

TÊTE. — Fatigue de la tête, par un travail intellectuel. — Vertige à faire tomber, le soir en allant en voiture. — Vertige en se levant. — Mal de tête toutes les après-midi. — *Maux de tête après avoir bu de la limonade, du vin ou du thé.* — Violents accès de maux de tête lancinants, au-dessus de l'œil, avec besoin de se coucher, sensibilité de l'extérieur de la tête, émission d'urine abondante, absence d'appétit et mélancolie, provoqués par la marche et les odeurs fortes. — Chute des cheveux en se peignant. — Douleur au cuir chevelu, comme si on arrachait les cheveux. — Élançements au front, aux tempes et aux yeux, en passant de l'air froid à la chaleur de la chambre.

YEUX — NEZ. — Douleurs dans la profondeur des orbites. — Vésicules pruriantes dans les sourcils et sur le bord des paupières. — Chute des sourcils. — Sécrétion plus abondante d'un cérumen qui se durcit dans l'oreille de laquelle on est sourd. — Prurit au nez, dans les narines et sur le bord des ailes du nez. — Besoin de mettre les doigts dans le nez. — Obturation du nez. — Coryza fluent le soir. — Mucosités nasales, jaunes, épaisses, gélatineuses.

FACE — GORGE. — Peau huileuse à la face. — Tressaillement des muscles du visage. — Lèvre supérieure gercée. — Odontalgie qui force à se servir du cure-dents jusqu'à ce que le sang vienne. — Douleur dans une dent cariée, avec sensation de froid jusque dans la joue, s'aggravant le soir au lit, soulagée par l'air libre, l'eau froide, le boire, le manger et la fumée du tabac. — Térébration dans les dents molaires. — Les dents deviennent dures, lisses et crient quand on les frotte. — Sécheresse de la gorge. — Espèce de bégaiement, qui fait qu'on confond et qu'on déplace les syllabes des mots. — Douleur sous la racine de la langue. — Langue chargée d'un enduit blanc, épais, le matin. — Grande sécheresse de la gorge surtout le soir.

APPÉTIT. — Goût douceâtre, désagréable, après avoir fumé. — Absence d'appétit, le matin. — Faim la nuit. — Répugnance pour les choses salées. — *Désir fréquent d'eau-de-vie.* — Hoquet et renvoi après avoir fumé. — Après le repas, *battement des artères*

dans tout le corps, surtout dans le ventre. — Beaucoup de soif, le soir.

VENTRE ET SELLES. — Douleur au foie, surtout en inspirant, s'étendant jusqu'à la région des reins, avec sensibilité à la pression extérieure. — Miliaire rouge, pruriant, à la région hépatique. — Elancements violents dans la rate en marchant. — Constipation. — Selles dures, suivies d'écoulement de mucosités ou de sang. — Selles moitié liquides, avec ténésmes. — Filaments, comme des cheveux, dans la selle.

URINES. — Urine rare et de couleur foncée, ou d'odeur de violette. — Urine rouge, le soir. — Émission involontaire de quelques gouttes en marchant. — Sédiment rouge, comme de l'argile, ou comme du gros sable, dans les urines. — Pissement fréquent, la nuit.

PARTIES GÉNITALES. — Chatouillement et prurit aux parties génitales, surtout au scrotum. — Impuissance, avec idées lascives. — Pollutions, avec flaccidité de la verge. — Écoulement de sperme goutte à goutte, pendant le sommeil. — Écoulement de liqueur prostatique pendant et hors le temps des selles. — Sperme séreux et sans odeur. — Pendant le coït, érection faible, lente et éjaculation trop prompte. — Après le coït, faiblesse et mauvaise humeur.

LARYNX. — Enrouement, en commençant à chanter. — Renâchement de mucosités et de petits globules de sang. — Toux matutinale qui fatigue toute la poitrine, avec expectoration de sang et de petits globules de mucosités. — Gêne de la respiration, pendant la marche au grand air. — Besoin fréquent de respirer profondément, comme des soupirs. — Étouffement de la respiration, la nuit, en étant couché, par des douleurs à la poitrine, dans le côté et aux reins.

TARONC ET EXTRÉMITÉS. — Sensation de paralysie dans les reins. — Roideur des muscles du cou et de la nuque, qui ne permet pas de tourner la tête. — Miliaire à l'avant-bras. — Déchirement nocturne dans les mains. — Prurit au poignet, dans la paume des mains, ainsi que sur et entre les doigts. — Boutons galeux à la main. — Amaigrissement des mains. — Boutons pruriants aux fesses et aux cuisses, près du scrotum. — Amaigrissement des jambes. — Craquement des genoux en les pliant. — Ulcères lisses aux jambes. — Prurit aux pieds, le soir, surtout autour des malléoles.


201.—SENEG.

SENEG.—Polygale de Virginie.—ARCHIVES DE STAFF.—*Dose usitée* : 30.—*Durée d'action* : 5 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Arn. bell. bry. camph.

COMPAREZ AVEC : Arn. ars. bar. bell. bry. canth. euphr. squill. stann. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — *Souffrances des membranes muqueuses*; Affections des personnes pléthoriques avec laxité des fibres; Anasarque et hydropisie des organes internes?; Inflammations internes; Plaies par la morsure d'animaux venimeux; Angines catarrhales et muqueuses?; Grippe; Laryngite chronique?; Phthisie laryngée?; Blennorrhée des poumons; Phthisie muqueuse?; Pneumonie?; Hydrothorax?, etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Sensation d'une grande lassitude*, générale, avec tremblement, surtout dans les membres inférieurs. — *Grand accablement moral et physique*, avec pandiculation des membres, lourdeur, vacuité et battement dans la tête. — *Grande faiblesse* qui semble provenir de la poitrine. — *Évanouissement*, en se promenant au grand air. — Plusieurs souffrances, surtout celles de la poitrine, s'aggravent par le repos et s'améliorent par la marche au grand air. — Forte envie de dormir le soir et *sommeil profond, engourdissant*, peu après qu'on s'est couché. — *Sommeil agité* par des affections de poitrine ou bien des crampes d'estomac vers le matin. — Frisson fréquent, provenant de lassitude dans les jambes. — Horripilation au dos, avec chaleur à la face, sensation brûlante dans les yeux, dyspnée, élancements dans la poitrine et battements dans la tête. — *Mélancolie hypochondriaque*, avec grande *susceptibilité aux offenses*. — *Angoisse excessive*, souvent avec respiration accélérée et précipitée. — *Gaieté*, *avec irritabilité et disposition à s'abandonner à des accès de colère et de fureur.

TÊTE. — Tête entreprise, avec étourdissement. — *Embarras et vacuité dans la tête*, avec pression dans les yeux. — Vertige, avec bruit dans les oreilles. — *Maux de tête qui affectent en même temps les yeux*, s'aggravent à la chaleur de l'appartement

et sont soulagés au grand air ou au froid. — Céphalalgies pressives, dans le front et les orbites. — Traction dans le sinciput et les tempes, jusque dans la face. — Congestion de sang à la tête et aux yeux, en se baissant. — Céphalalgie pulsative, avec pression dans les yeux. — Horripilation au cuir chevelu et prurit. — Éruption à la tête.

YEUX. — Douleur dans les yeux, comme s'ils se dilataient et qu'ils fussent poussés en dehors des orbites. — Pression dans les yeux, le soir, surtout aux lumières et en se baissant. — Congestion de sang aux yeux en se baissant. — Sensation brûlante dans les yeux, en lisant et en écrivant (le soir). — Gonflement des paupières, avec pression brûlante et fourmillement. — Sécheresse des yeux. — Larmoiement au grand air et en regardant fixement un objet. — Le matin, accumulation de chassie sèche aux paupières. — Tressaillement et traction spasmodique dans les paupières. — Paupières inférieures contractées convulsivement. — Fixité du regard. — Opacité de la cornée. — Amblyopie, avec lueurs devant les yeux, augmentée en les frottant. — Confusion des caractères et éblouissement en lisant. — Tous les objets paraissent être dans l'ombre. — Taches brillantes devant la vue. — Photophobie.

OREILLES ET NEZ. — Pression dans les oreilles, pendant la mastication. — Sensibilité douloureuse de l'ouïe. — Prurit à l'intérieur du nez. — Odeur de pus dans le nez. — Éternument, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — Sécheresse pénible du nez.

FACE ET DENTS. — Sensation de paralysie des muscles de la face. — Vésicules brûlantes aux commissures des lèvres et sur la lèvre supérieure. — Dents agacées. — Fouillement dans les dents, en inspirant (l'air humide et froid).

BOUCHE. — Sécheresse de la bouche, surtout le matin. — Sécrétion de salive plus abondante. — Haleine putride. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Sensation brûlante sur la langue et au palais.

GORGE. — Mal à la gorge, comme si elle était excoriée et à vif. — Grattement, sensation brûlante et sécheresse dans la gorge, avec irritation qui provoque la toux et parole embarrassée. — Sensation de constriction du gosier. — Gonflement inflammatoire du palais et de la luette. — Accumulation abondante de mucosités visqueuses dans la gorge et au palais, se détachant en petits globules.

APPÉTIT. — Goût moins sapide des aliments. — Goût métallique dans la bouche, ou comme celui de l'urine. — Goût pâteux dans la bouche. — Absence totale d'appétit, surtout le matin. — Faim

rongeante, avec sensation de vacuité dans l'estomac. — *Soif ardente.*

ESTOMAC. — Renvois. — Dégoût et *nausées*, avec envie de vomir, *qui semble provenir de l'estomac*, avec vomiturition. — Vomissements, avec diarrhée et forte angoisse. — *Crampe d'estomac*, avec douleur pressive, même la nuit. — Sensation brûlante dans l'estomac. — Sensation de vacuité dans l'estomac.

VENTRE. — *Maux de ventre avec douleurs térébrantes* et fouillantes, surtout dans la partie supérieure du ventre et les hypochondres. — Rongement dans le bas-ventre. — Ardeur et serrement dans la partie supérieure du ventre, en inspirant. — *Traction entre les téguments du ventre*, comme par un corps étranger. — Affections flatulentes, avec sensation, comme si tout se portait vers le bas-ventre.

SELLES. — *Selles lentes, dures et rares*, avec efforts, et suivies de pression à l'anus et au rectum. — Selles diarrhéiques, fréquentes et de la consistance de la bouillie.

URINES. — *Sécrétion d'urine diminuée.* — Sécrétion plus abondante d'urine. — *Pissement au lit, la nuit.* — Urine écumeuse ou mêlée de filaments muqueux, et devenant trouble et nuageuse en se refroidissant. — Sédiment rougeâtre dans les urines, avec flocons muqueux. — Sensation en urinant, comme si l'urèthre était obstrué. — *Élancements et sensation brûlante dans l'urèthre après et pendant l'émission des urines.*

PARTIES GÉNITALES. — Exaltation de l'appétit vénérien, avec érections douloureuses. — Leucorrhée muqueuse.

LARYNX. — Grande sécheresse du larynx, surtout le matin et avant midi. — *Enrouement* et âpreté dans la gorge. — *Chatouillement* et sensation brûlante dans le larynx, surtout en étant couché, avec péril de suffocation. — *Accumulation abondante de mucosités dans le larynx et la trachée-artère*, avec haleine courte. — *Toux sèche et ébranlante, provoquée par un chatouillement dans le larynx*, plus forte au grand air. — Expectoration de mucosités transparentes et jaunes, en toussant. — *Toux avec expectoration abondante de mucosités visqueuses.*

POITRINE. — *Dyspnée*, avec sensation de *stagnation dans les poumons.* — Haleine courte, en marchant vite et en montant un escalier. — *Oppression de poitrine*, pénible, surtout au grand air, et en se baissant, comme si le thorax était trop étroit. — *Pression à la poitrine, dans le repos* surtout, et le matin ou la nuit, en se réveillant. — Grande sensibilité des parois internes de la poitrine, au toucher. — Serrement et douleurs crampoïdes dans la poitrine, avec agitation et anxiété, surtout quand on est couché sur le côté. — *Élancements dans la poitrine*, surtout en toussant et

en inspirant. — *Douleur d'excorsiation dans la poitrine*, aggravée par la pression extérieure, le mouvement, en toussant et en éternuant. — *Traction et sensation brûlante dans la poitrine*. — *Fourmillement dans la poitrine*. — *Forte congestion de sang à la poitrine, avec pulsation* et bouillonnement au point de s'évanouir. — *Battement de cœur violent, ébranlant*. — *Pression et térébration dans la région du cœur*. — *La plupart des souffrances de la poitrine sont plus fortes dans le repos*, et ne gênent pas la respiration.

TRONC ET EXTRÉMITÉS. — *Pression et traction dans le dos et les omoplates, ainsi qu'entre et sous les omoplates*. — *Sensation brûlante, et prurit sous-cutané dans tout le dos*. — *Traction paralytique dans les avant-bras, jusque dans les doigts*. — *Douleur de luxation dans l'articulation de la main*. — *Sensation de lassitude excessive dans les jambes, avec sensation de paralysie dans les articulations*. — *Douleur de luxation dans l'articulation coxo-fémorale*. — *Tremblement dans les jambes*.

202. — SENNA.

SENNA. — *Séné.* — Médicament encore très-peu connu, mais qui a été recommandé contre l'*Insomnie* et les *coliques des nouveau-nés*.

SYMPTÔMES. — *Bouillonnement de sang*, surtout la nuit, troublant le sommeil. — **Insomnie*, avec *cris* et jactation, surtout chez les nourrissons. — *Pesanteur de la tête*, en se baissant, comme si on appuyait dessus. — *Douleur dans la nuque en relevant la tête*. — *Commissures des lèvres couvertes de petites vésicules brûlantes*. — *Absence d'appétit*. — *Soif*. — *Renvois à vide, ou aqueux et fétides*. — *Dégoût et nausées, avec envie de vomir*. — **Coliques, surtout chez les petits enfants*. — *Sensation de froid dans le ventre, avec vacuité et malaise dans l'estomac*. — *Accumulation de flatuosités, avec grondement et fermentation dans le ventre et expulsion de vents fétides*. — *Selles diarrhéiques, avec ténésmes, et suivies de sensation brûlante à l'anus*.


203. — SEPIA.

SEP. — Le suc de la sépia. — HAHNEMANN. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 7 à 8 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Acetum. acon. nitr-spir. tart. — On l'emploie comme antidote de : calc-ph. chin. merc. sassap. ? sulf.

COMPARER AVEC : Acon. ambr. ant. ars. bar. bell. carb-v. caus. cham. chin. coff. con. fer. graph. ign. led. lyc. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-mos. n-vom. petr. phos. phos-ac. plumb. puls. rhod. rhus. sabad. sass. sil. sulf. tart. verat. zinc. — C'est surtout après : Caus. led. merc. puls. sil. et sulf., que la sépia est efficace, lorsqu'elle est d'aillettrs indiquée. — Après la sépia, conviennent quelquefois : Carb-v. caus. puls.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections du sexe féminin, et surtout des femmes d'une constitution faible, ayant la peau délicate et sensible; Affections des vaisseaux capillaires et du système nerveux; Affections à la suite d'une contrariété; Faiblesse physique et nerveuse par suite d'onanisme; Affections scrofuleuses (et rachitiques?); Engorgement et inflammation des glandes; Tumeurs lymphatiques, inflammatoires; Affections rhumatismales, surtout chez les personnes d'une taille élancée; Éruptions et dartres chroniques; Gale; Taches livides des femmes enceintes ou nerveuses; Indurations squirrheuses; Verrues; Fièvres intermittentes; Manie; Hystérie; Céphalalgies nerveuses et hystériques; Migraine; Teigne; Ophthalmies scrofuleuses et autres; Amblyopie amaurotique; Hémorrhagie nasale; Croûte de lait; Stomacace et affection scorbutique des gencives?; Odontalgies, surtout chez les femmes hystériques ou enceintes; Disposition chronique aux angines; Dyspepsie, aigreurs, gastralgie et autres affections gastriques; Grosseur du ventre chez les femmes âgées; Ascite; Diarrhées, même chez les sujets scrofuleux; Blennorrhée du rectum?; Constipation chronique; Gonorrhée chronique; Pollutions par suite d'onanisme; Disménie des jeunes filles; Dysménorrhée; Métorrhagie; Aménorrhée; Chlorose?; Flueurs blanches; Odontalgie, constipation ou diarrhée, affections gastriques, avec vomissement, taches jaunâtres à la peau, et autres souffrances des femmes enceintes; Disposition à l'avortement; Excoriation des mamelles; Écorchure des enfants; Toux de différentes espèces; Coqueluche?; Pneumonie?; Hémoptysie; Souffrances phthisiques; Panaris, etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Élancements et douleurs picotantes* dans les membres et autres parties du corps. — *Douleurs brûlantes à diverses parties du corps. — *Tension dans les membres, comme s'ils étaient trop courts. — Traction et déchirement dans les membres et les articulations. — Douleurs qui sont soulagées par la chaleur extérieure. — Douleurs par accès, avec horripilation. — *Douleur de luxation, surtout par un effort de la partie affectée, ainsi que la nuit, à la chaleur du lit. — *Douleurs rhumatismales, avec gonflement des parties affectées, sueur facilement excitée, frissonnement ou frissons alternant avec chaleur. — **Fortes incommodités à la suite de contrariétés.* — *Engourdissement facile des membres (bras et jambes), surtout après un travail manuel. — **Roideur et manque de flexibilité des articulations.* — Luxations et entorses faciles, aux membres. — *Dispositions à se donner un tour de reins. — **Commotions et tressaillement dans les membres*, nuit et jour. — *Tressaillement dans les muscles. — Accès de malaise et spasmes hystériques. — Gonflement et suppuration des glandes. — Exacerbation et renouvellement de plusieurs souffrances, pendant et immédiatement après le repas. — *Les symptômes se dissipent pendant tout exercice violent*, excepté celui du cheval, et sont aggravés pendant le repos, comme aussi le soir, la nuit, à la chaleur du lit (et avant midi). — Sensibilité douloureuse de tout le corps. — Traction dans tous les membres. — *Pandiculations fréquentes. — **Inquiétudes et battement dans tous les membres*, avec agitation qui ne permet de rester nulle part. — **Fort bouillonnement de sang, même la nuit*, avec pulsation dans tout le corps. — Gonflement général du corps, avec haleine courte, sans soif. — Lourdeur et paresse physique. — *Manque de solidité dans les membres. — *Accès de faiblesse et de défaillance hystériques ou autres. — Évanouissements. — *Lassitude avec tremblement. — **Manque de vigueur*, quelquefois seulement au réveil. — *Prompte fatigue en se promenant au grand air. — *Forte disposition à prendre des refroidissements, et sensibilité à l'air froid*, surtout au vent du nord. — Après avoir été mouillé, frisson fébrile, accès d'évanouissement, et ensuite coryza.

PEAU. — Sensibilité excessive de la peau. — Prurit à diverses parties, qui se change en sensation brûlante. — Prurit et éruption boutonneuse dans les articulations. — *Excoriation surtout dans les articulations. — **Éruptions comme la gale*, sèches et pruriantes. — **Taches brunes* ou vineuses, ou bien *rougettes et dartreuses*, à la peau. — *Desquamation en forme d'anneau (dartres annulaires). — *Dartres humides, croûteuses, avec prurit et sensation brûlante. — *Furoncles.* — *Glandes engorgées. —

°Indurations squirrheuses. — °Éruptions de vésicules, semblables au pemphigus. — *Ulcères* pruriants, lancinants, brûlants, ou quelquefois *indolents*. — Cors aux pieds, avec douleur lancinante. — Difformité des ongles. — °Taches hépatiques.

SOMMEIL. — **Forte envie de dormir le jour et le soir de trop bonne heure.* — Accès de somnolence, réapparaissant en type tierce. — Sommeil tardif le soir. — Insomnie par surexcitation. — Réveil de trop bonne heure et veille prolongée. — **Réveil fréquent, sans cause appréciable.* — **Sommeil agité, avec fort bouillonnement de sang, jactation continuelle, rêves fantastiques, anxieux, effrayants, et sursauts fréquents, avec effroi.* — En dormant, on croit s'entendre appeler. — **Sommeil non réparateur; on n'a pas assez dormi le matin.* — *Rêves lascifs.* — En dormant, paroles, cris, et tressaillement des membres. — La nuit, divagations, angoisse, chaleur fébrile et agitation dans le corps, maux de dents, coliques, toux et beaucoup d'autres souffrances.

FIÈVRE. — Horripilation pendant les douleurs. — **Manque de chaleur vitale.* — Frissonnement fréquent, surtout le soir, au grand air. — **Accès de chaleur (fugace),* surtout en étant assis et en se promenant au grand air, comme aussi lorsqu'on se fâche ou pendant une conversation importante. — Accès de chaleur (et de frissons) avec soif. — Chaleur continue, avec rougeur de la face et forte soif. — **Fièvre avec soif pendant les frissons,* douleurs dans les membres, froid glacial des mains et des pieds, et doigts morts. — **Sueur pendant qu'on est assis.* — **Sueur abondante au plus léger mouvement.* — **Sueurs nocturnes, quelquefois froides.* — *Sueurs matutinales, quelquefois d'odeur acide.*

MORAL. — **Tristesse et abattement avec pleurs.* — **Mélancolie et morosité.* — **Angoisse et inquiétude, quelquefois avec chaleur fugace, généralement le soir, et quelquefois au lit.* — *Grande inquiétude sur son état de santé.* — °*Caractère rêveur.* — **Forte disposition à s'effrayer.* — **Découragement* souvent au point d'être dégoûté de la vie. — **Indifférence* pour toute chose et même pour les siens. — °*Répugnance à s'occuper de ses affaires.* — *Caractère susceptible, acariâtre, avec forte disposition à la colère et à l'emportement.* — Humeurs querelleuse et caustique. — **Faiblesse de la mémoire.* — Distraction. — Disposition à se tromper en parlant et en écrivant. — **Inaptitude aux travaux intellectuels.* — Lenteur de la marche des idées.

TÊTE. — **Tête entreprise.* — Accès de vertige, surtout en se promenant au grand air ou en écrivant, ou bien au moindre mouvement des bras. — *Vertige, comme si tous les objets remuaient, ou comme si quelque chose roulait dans la tête.* — Vertige, le matin, en se levant, ou l'après-midi. — **Accès de maux de tête,*

avec nausées, vomissement, et douleurs lancinantes ou térébrantes qui forcent à crier. — **Maux de tête, tous les matins.* — **Maux de tête, qui ne permettent pas d'ouvrir les yeux.* — **Maux de tête, avec désir excessif du coït.* — *Céphalalgie en secouant ou en remuant la tête, comme aussi à chaque pas que l'on fait, comme si le cerveau était ébranlé.* — *Douleurs de tête semi-latérales, quelquefois le soir, après le coucher, précédées de pesanteur de la tête.* — **Pesanteur de la tête.* — **Céphalalgie pressive au-dessus des yeux, à la clarté du jour.* — **Pression expansive dans la tête, quelquefois en se baissant, comme si elle allait éclater.* — Contraction dans la tête. — **Traction et déchirement dans la tête et à la tête, quelquefois d'un seul côté.* — *Céphalalgie lancinante, souvent semi-latérale ou frontale.* — Tressaillement et secousses dans la tête. — **Céphalalgie battante, surtout dans l'occiput.* — **Forte congestion de sang à la tête, avec chaleur, surtout en se baissant.* — Froid à l'extérieur de la tête. — **Tremblement involontaire, et secousses de la tête.* — Mobilité du cuir chevelu. — **Prurit à la tête.* — **Croûtes humides à la tête.* — Chute des cheveux. — Gonflement de la tête, surtout du front.

YEUX. — **Pesanteur et affaissement de la paupière supérieure.* — **Pression sur le globe des yeux.* — Prurit et cuisson dans les yeux et les paupières. — **Picotement dans les yeux, le soir, aux lumières.* — Sensation brûlante dans les yeux, surtout le matin, au réveil. — **Inflammation des yeux, avec rougeur de la sclérotique et élancements.* — *Inflammation, rougeur et gonflement des paupières, avec orgelets.* — **Pustules à la cornée.* — **Gonflement des yeux, surtout le matin, au réveil.* — Croûtes dans les sourcils. — Yeux vitreux, noyés, le soir. — **Fongus hématoïde à la cornée.* — Croûtes sèches aux paupières, surtout le matin au réveil. — Couleur jaune de la sclérotique. — Larmolement, surtout le matin, ou **agglutination nocturne des paupières.* — Frémissement et tressaillement des paupières. — **Paralysie des paupières et impossibilité de les ouvrir, surtout la nuit.* — Vue trouble, en lisant et en écrivant. — **Presbyopie.* — **Faiblesse de la vue, comme par amaurose, avec pupilles contractées.* — **Voile, taches noires, points et traces lumineuses devant la vue.* Reflet vert autour de la lumière, le soir. — **Grande susceptibilité des yeux à la clarté du jour.*

OREILLES. — Otalgie. — *Élancements dans les oreilles.* — Douleur d'excoriation dans l'oreille. — Gonflement et éruption purulente à l'oreille extérieure. — Dartres au lobe de l'oreille. — Écoulement d'un pus liquide par l'oreille, avec prurit. — **Sensibilité excessive de l'ouïe à la musique.* — **Durété de l'ouïe.* — Surdité subite, comme par un tampon dans les oreilles. — Bruissement et

bourdonnement devant les oreilles. — ° *Dartres derrière les oreilles et à la nuque.*

NEZ. — ° *Gonflement et inflammation du nez, surtout du bout.* — *Croûte sur le bout du nez.* — *Narines croûteuses, ulcérées.* — *Mucosités durcies dans le nez.* — *Épistaxis, et mouchement fréquent de sang,* ° *même après le plus léger échauffement, ou la plus légère contusion au nez.* — ° *Absence d'odorat.* — ° *Odeur fétide dans le nez.* — ° *Obturation ou sécheresse pénible du nez.* — *Coryza sec.* — *Mucosités sèches qui obstruent le nez.* — *Violent coryza fluent, avec éternement, douleur dans l'occiput et traction dans les membres.*

FACE. — *Pâleur de la face, avec cercles bleus autour des yeux, qui sont rouges et ternes.* — ° *Couleur jaune de la face.* — ° *Face amaigrée.* — ° *Trace jaune à cheval sur le nez et les joues.* — *Forte chaleur à la face.* — *Bouffissure pâle de la face.* — ° *Inflammation érysipélateuse et gonflement d'un côté de la face (provenant d'une dent cariée).* — *Gonflement inflammatoire de la face, avec boutons rapprochés à croûte jaune.* — ° *Dartres et croûtes à la face.* — ° *Verrues à la face.* — *Pores noirs à la face.* — *Prurit et éruption à la face et sur le front; quelquefois comme rougeur et rudesse de la peau.* — *Tumeurs au front.* — *Douleurs faciales, tractives.* — *Douleur crampoïde et déchirement dans les os de la face.* — ° *Sécheresse et exfoliation des lèvres.* — *Tension de la lèvre inférieure.* — ° *Couleur jaune et éruption dartreuse autour de la bouche.* — *Éruptions humides et croûteuses sur la partie rouge des lèvres et au menton.* — *Ulcère douloureux à la face interne des lèvres.* — *Engorgement et sensibilité douloureuse des glandes sous-maxillaires.*

DENTS. — *Odontalgie en serrant les dents ou en y touchant, et en parlant, comme aussi par le plus léger courant d'air froid.* — *Odontalgie nocturne, avec forte surexcitation.* — ° *Odontalgie pulsative ou lancinante, ou bien tractive, s'étendant quelquefois jusque dans l'oreille, ou dans les bras et les doigts.* — ° *Maux de dents, avec gêne de la respiration, fluxion à la joue, engorgement des glandes sous-maxillaires, et toux, ou bien avec fort bouillonnement de sang et pulsation dans tout le corps.* — *Secousses déchirantes dans les dents.* — *Émoussement, vacillement, saignement facile et carie des dents.* — ° *Gonflement, excoriation, ulcération et saignement facile des gencives.*

BOUCHE. — *Haleine fétide.* — *Gonflement de l'intérieur de la bouche.* — ° *Sécheresse de la bouche et de la langue.* — *Salivation salée.* — *Douleur de la langue et du palais, comme s'ils étaient brûlés.* — *Excoriation de la langue.* — *Vésicules sur la langue.* — ° *Langue chargée d'un enduit blanc.*

GORGE. — Mal de gorge avec gonflement des glandes du cou. —

*Sensation pressive, comme s'il y avait un tampon dans la gorge, ou *douleur d'excoriation et élancements pendant la déglutition.*

— **Tressaillement dans la gorge. — Gonflement et inflammation du gosier. — Inflammation, gonflement et suppuration des amygdales. — Sécheresse dans la gorge, avec tension et grattement.*

— **Gorge comme pâteuse. — Accumulation de mucosités dans la gorge et au voile du palais. — *Rendement de mucosités, surtout le matin. — Expulsion de mucosités sanguinolentes, en renâclant.*

APPÉTIT. — *Goût putride ou aigre. — Goût trop salé des aliments.*

— **Adypsie, ou soif excessive, surtout le matin et le soir, quelquefois avec anorexie. — *Grande voracité. — *Boulimie, avec sensation de vacuité dans l'estomac. — Désir ardent de vin. —*

**Répugnance et dégoût pour les aliments, surtout pour la viande et le lait, qui donne la diarrhée. — La fumée de tabac ne convient pas. —*

**Après des aliments gras, renvois désagréables avec nausées. — *Faiblesse de la digestion. — *Après le repas, aigreurs dans la bouche, renvois fréquents, grattement et sensation brûlante dans la gorge, pulsation dans le scrobicule, hoquet, ballonnement du ventre, sueur, chaleur fébrile, battement de cœur, céphalalgie, nausées, vomissements, douleurs d'estomac, etc.*

ESTOMAC. — **Renvois fréquents, généralement aigres ou amers, ou bien comme des œufs pourris, ou avec le goût des aliments.*

— *Renvois douloureux, pendant lesquels il vient du sang dans la bouche. — Aigreurs avec dégoût de la vie. — Nausées quelquefois le matin à jeun, soulagées en mangeant quelques bouchées.*

— *Nausées, avec goût amer et renvois. — Nausées, par le mouvement de la voiture. — *Nausées et vomissement après le repas.*

**Vomissement de bile et d'aliments. — *Maux d'estomac après le repas, quelquefois le soir. — Douleur violente au cardia, en ingérant des aliments. — *Douleur dans le scrobicule en marchant.*

— **Pression dans l'estomac, comme par une pierre, surtout pendant ou après le repas, ou bien la nuit. — *Crampe d'estomac contractive. — *Pituïtes de l'estomac, surtout après avoir bu, ou précédées d'une sensation de tournoiement dans l'estomac. —*

Vomissement de sérosités laiteuses (chez des femmes enceintes).

— *Vomissement nocturne avec mal à la tête. — Crampes d'estomac et de poitrine. — Térébration déchirante dans la région stomacale, jusque dans les reins. — *Élancements pressifs dans le scrobicule et la région de l'estomac. —*

**Sensation brûlante dans l'estomac et le scrobicule. — Battement dans le creux de l'estomac. —*

Sensation de vacuité douloureuse dans l'estomac.

VENTRE. — Douleurs au foie, en étant en voiture. — Pression, battement et élancements dans la région hépatique. — °Térébration, ou élancements tensifs dans les hypochondres, surtout pendant le mouvement. — Élancement dans l'hypochondre gauche. — Maux de ventre, le matin, au lit. — *Pression et pesanteur dans le ventre, avec sensation d'expansion, comme s'il allait éclater. — *Fort ballonnement du ventre.* — Pesanteur et °dureté dans le bas-ventre. °Grosseur du ventre (chez les femmes qui ont eu des enfants). — *Gonflement hydropique du ventre. — *Crampes abdominales*, avec douleur de griffement, comme si les intestins étaient tordus. — *Coliques incisives, surtout après un exercice corporel, ou la nuit, avec envie d'aller à la selle. — *Fouillement, tranchées et pression dans le bas-ventre. — *Douleur de meurtrissure dans les intestins. — °Froid dans le ventre. — *Sensation brûlante et élancements dans le ventre, surtout du côté gauche et quelquefois jusqu'à la cuisse. — Sensation de vacuité dans le ventre. — Lancinations dans les aines. — Taches brunâtres au ventre. — *Mouvements et borborygmes dans le ventre, surtout après le repas. — Production abondante et incarceration de flatuosités.

SELLES. — *Envie sans résultat d'aller à la selle, ou seulement avec évacuation de mucosités et de vents. — °Évacuations insuffisantes, lentes et comme des crottes de mouton. — Évacuations peu abondantes; avec efforts et ténesmes. — *Selles trop molles. — Selles gélatineuses, avec tranchées. — *Diarrhées débilitantes. — *Diarrhées verdâtres, souvent avec odeur putride ou aigre, ou surtout chez les enfants. — *Pendant la selle, écoulement de sang. — Douleur contractive et tension, prurit, fourmillement, sensation brûlante et élancements à l'anus et dans le rectum. — Suintement par le rectum. — °Écoulement muqueux par le rectum, avec douleurs lancinantes et déchirantes. — *Chute du rectum, surtout pendant la selle. — Congestion de sang à l'anus. — *Sortie des boutons hémorroïdaux du rectum. — Hémorroïdes fluentes. — Excoriation entre les fesses. — Douleur contractive au périnée.

URINES. — Besoin fréquent et impossibilité d'uriner. — *Pression sur la vessie. — °Émission d'urine, la nuit. — *Pissement au lit, dans le premier sommeil. — *Urine foncée, d'un rouge de sang. — *Urine trouble, avec sédiment rouge, sablonneux ou briqueté. — Urine fétide, avec sédiment blanc, abondant. — Urine qui dépose du sang. — Crampe de la vessie. — Sensation brûlante dans la vessie et l'urèthre. — *Cuisson dans l'urèthre, surtout en urinant. — Douleurs incisives et élancements dans l'urèthre. — °Écoulement muqueux par l'urèthre, comme une gonorrhée chronique.

PARTIES GÉNITALES. — *Sueur abondante des parties génitales et
1^{re} Part. — T. II.

surtout des testicules. — *Prurit autour des parties génitales. — Éruption pruriente au gland et au prépuce. — *Gonorrhée *btarde*, d'odeur acide, salée. — Ulcères au gland et au prépuce. — *Douleurs dans les testicules. — *Gonflement du scrotum. — *Faiblesse des parties génitales. — Exaltation de l'appétit vénérien, avec érections fréquentes. — *Pollutions fréquentes. — Écoulement de liqueur prostatique après avoir uriné et pendant une selle difficile. — Après le coït et les pollutions, fatigue intellectuelle, morale et physique.

RÈGLES. — *Excoriation à la vulve et entre les cuisses, quelquefois avant les règles. — *Chaleur intérieure et extérieure aux parties génitales. — Douleur contractive dans le vagin. — *Gonflement et éruption pruriente, humide, aux petites lèvres. — *Pression vers le bas, dans la matrice, gênant la respiration. — *Chute de la matrice. — *Métrorrhagies. — *Règles trop abondantes. — *Induration du col de la matrice. — *Règles supprimées, ou trop faibles, ou trop hâtives. — Avant les règles, coliques. — Pendant les règles, mélancolie, odontalgie, céphalalgie et courbature dans les membres, ou coliques spasmodiques et pression vers les parties. — Stérilité. — *Leucorrhée d'une eau jaune ou rouge verdâtre, ou purulente, fétide, quelquefois avec ballonnement du ventre, ou élancements dans le vagin. — *Leucorrhée pruriente, corrosive. — Élancements dans les mamelles. — *Excoriation des mamelons. — *Écorchure des enfants.

LARYNX. — Enrouement avec coryza. — Sensation de sécheresse dans la trachée-artère. — Toux provoquée par un chatouillement dans le larynx ou la poitrine. — *Toux sèche, qui semble venir de l'estomac, surtout le soir, au lit, et souvent avec nausées et vomissement amer. — Toux grasse, après un refroidissement. — *Toux, avec expectoration abondante de mucosités généralement putrides, ou de goût salé, souvent seulement le matin ou le soir, et fréquemment accompagnée de bruit, de faiblesse, et de douleur d'excoriation dans la poitrine, comme si elle était à vif. — *Toux nocturne, avec cris, suffocation et vomiturition. — *Toux semblable à la coqueluche. — *Toux provoquée par un chatouillement, et accompagnée de constipation. — *Expectoration qui se détache difficilement. — Expectoration jaune verdâtre, purulente, en toussant. — Expectoration en toussant, le matin et le soir, avec expectoration de mucosités le jour. — Pendant la toux, lancements dans la poitrine ou le dos.

POITRINE. — *Dyspnée, oppression de poitrine, et haleine courte en marchant et en montant, ainsi qu'en étant couché au lit, le soir et la nuit. — *En respirant et en toussant, douleur dans les côtés de la poitrine. — *Oppression de poitrine, produites par accumu-

lation de mucosités, ou par une expectoration trop abondante. —

*Douleur de poitrine par le mouvement. — *Pression dans la poitrine, surtout le soir, au lit. — Pesanteur, plénitude et tension dans la poitrine. — ° Douleur d'excoriation dans la poitrine. — Crampes de poitrine. — *Élancements et picotements dans la poitrine et les côtés de la poitrine, quelquefois en respirant et en toussant, ainsi que par un travail de tête. — *Bouillonnement de sang dans la poitrine et battements de cœur violents. — Intermittence des battements du cœur. — *Taches brunâtres sur la poitrine.

TRONC. — *Douleurs aux reins et dans le dos, avec déchirement brûlant. — ° Battement aux reins. — Faiblesse aux reins, en marchant. — *Douleurs incisives, pression, fouillement et déchirements crampoïdes dans le dos. — * Roideur du dos et de la nuque. — ° Frissonnement dans le dos. — Taches brunâtres sur le dos. — Taches rougeâtres, dartreuses, au-dessus de la hanche et aux deux côtés du cou. — ° Éruption pruriente au dos. — ° Dartres à la nuque et derrière les oreilles. — Taches vineuses au cou et sous le menton. — Furoncle au cou. — *Sueur sous les aisselles. — Gonflement et suppuration des glandes axillaires. — ° Dartre humide sous l'aisselle.

BRAS. — *Douleur de luxation dans l'articulation de l'épaule, surtout en soulevant ou en tenant un objet. — Lassitude dans le bras. — Sensation de roideur et de froid dans le bras, comme s'il était paralysé. — *Douleur de traction paralytique dans le bras et l'articulation de l'épaule, jusque dans les doigts. — Élancement dans les bras et l'articulation de la main, en fatiguant ou en remuant ces parties. — *Tension douloureuse dans les bras, et les articulations du coude et des doigts, comme par raccourcissement. — Gonflement inflammatoire rouge foncé, dur, marbré, au milieu du bras. — Pustules aux bras, avec prurit violent. — *Roideur des articulations du coude et des mains. — Taches brunâtres, peau dartreuse et croûtes pruriantes au coude. — *Vésicules purulentes sur le dos de la main et au bout des doigts. — ° Dartres sur le dos des mains. — ° Gonflement de la main avec éruption de vésicules, semblable au pemphigus. — ° Élancements dans le poignet en remuant la main. — ° Chaleur ardente dans la paume des mains. — *Sueur froide aux mains. — ° Gale maligne et croûtes aux mains. — Traction arthritique et élancements dans les articulations des doigts. — Distorsion des doigts. — ° Ulcères indolores dans les articulations et au bout des doigts. — Verrues aux mains. — Envies aux doigts. — ° Ongles difformes. — *Panaris avec douleurs pulsatives et lancinantes.

JAMBES. — * Douleurs dans les hanches, avec élancements déchi-

rants. — Douleur dans les fesses et les cuisses après avoir été assis. — ° *Faiblesse paralytique des jambes*, surtout après s'être mis en colère. — *Roideur des jambes*, jusque dans l'articulation coxo-fémorale, après avoir été assis un peu de temps. — ° *Froid aux jambes et aux pieds*. — *Gonflement des jambes et des pieds*. — Crampes dans les cuisses, en marchant. — ° *Lancinations déchirantes ou saccadées dans les cuisses* et le tibia, au point de faire crier. — *Furuncles* à la cuisse et dans les jarrets. — Traction et élancements déchirants dans les genoux, les jambes et les talons. — Gonflement douloureux du genou. — ° *Roideur des articulations du genou et du pied*. — ° *Crampes aux mollets*, quelquefois la nuit. — Inquiétudes dans les jambes, le soir. — Boutons pruriants sur les jambes et le cou-de-pied. — ° Douleur tractive dans les jambes et les gros orteils. — ° *Élancements au tibia et au cou-de-pied*. — Sensation dans les jambes, comme si une souris y courait. — ° *Tressaillement des pieds en dormant*. — Ulcères sur le cou-de-pied. — Roideur dans les talons et les articulations du pied, comme par raccourcissement. — ° *Picotement et sensation brûlante dans les pieds*. — Fourmillement et engourdissement de la plante des pieds. — ° *Sueur aux pieds, abondante*, ou bien supprimée. — ° *Ulcères au talon*, provenant de vésicules rongeantes. — ° *Ulcères indolents*, aux articulations et au bout des orteils. — ° *Cors aux pieds*, avec douleur lancinante. — ° *Difformité des ongles des orteils*.

204. — SILICEA.


SIL. — Silice. — HAHNEMANN. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : 7 à 8 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Camph. hep. — *On l'emploie comme antidote de* : Merc. sulf. (psorinum).

COMPARER AVEC : Alum. amm. bar-c. bell. calc. carb-an. carb-v. chin. cin. cycl. graph. hep. kal. lach. lyc. magn. merc. natr. petrol. phos. puls. ran. rhod. rhus. sass. sep. spig. sulf. veratr. — C'est surtout après : Calc. hep. lyc. sulf., que silic. est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après silic. conviennent quelquefois : Hep. lach. lyc. sep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Suites fâcheuses de l'abus du mercure; Souffrances hystériques; Faiblesse physique chez les enfants, avec difficulté d'apprendre à marcher; Paralysies; Épilepsie; Surexcitation nerveuse avec insomnie; Affections rhumatismales et arthritiques, chroniques; In-

inflammations flegmoneuses ; Tumeurs lymphatiques ; Affections scrofuleuses et rachitiques , même avec tête grosse , et fontanelles tardives à s'ossifier ; Engorgement , inflammation , induration et ulcération des glandes ; Inflammation , ramollissement , ulcérations et autres maladies des os ; Abscesses ; Indurations squirrheuses ; Ulcères presque de toutes natures , surtout chez les personnes malpropres , cachectiques et adonnées aux boissons spiritueuses ; Ulcères scrofuleux , mercuriels et scorbutiques ; Ulcères carcinomateux ; Hydrarthre ? ; Hystérie ; Vertiges ; Migraine ; Teigne ; Chute des cheveux à la suite de fortes maladies aiguës ; Fongus hématode dans l'œil ; Ulcères de la cornée ; Cataracte ; Amblyopie amaurotique ; Dureté de l'ouïe ; Cancer aux lèvres ; Fièvre de dentition ; Boulimie , pituites de l'estomac , gastralgie , dyspepsie et autres affections gastriques ; Abscesses hépatiques ; affections vermineuses , surtout chez les sujets scrofuleux ; Gonorrhée chronique ; Hydrocèle , surtout chez les sujets scrofuleux ; Excoriation des mamelons ; Ulcération et même affection carcinomateuse des mamelles ; Coryza chronique et disposition opiniâtre à des rhumes de cerveau ; Souffrances phthisiques , même chez les sculpteurs ; Gonflement inflammatoire du genou ; Panaris ; Paralysie des mains , aussi chez les lépreux , etc. , etc.

 Voy. la note , page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Traction , déchirement et élanacement dans les membres (bras et jambes). — °Élancements nocturnes dans toutes les articulations. — *Disposition des membres à s'engourdir. — *Douleur de brisement et faiblesse paralytique dans les membres , surtout le soir. — *Disposition à se donner des tours de reins. — *Crampes dans les bras et les jambes. — *Gonflement et *induration des glandes* , généralement sans douleur , seulement quelquefois avec prurit pénible. — *Tressaillement des membres , jour et nuit. — **Attaques d'épilepsie*. — Plusieurs affections et douleurs s'aggravent ou se manifestent la nuit et le soir , comme aussi pendant le mouvement. — **Aggravation des symptômes à la nouvelle* ou °à la pleine lune. — Douleurs aux changements de temps. — *Inquiétudes dans tout le corps , après avoir été longtemps assis*. — °Bouillonnement de sang et soif après avoir bu peu de vin. — Amaigrissement excessif. — °Enfants tardifs à marcher. — Marche nonchalante , maladroite. — Faiblesse des articulations ; elles fléchissent. — *Lassitude et tremblement dans les membres , surtout le matin. — *Inertie générale et *grande faiblesse nerveuse*. — °Évanouissement en se couchant sur le côté. — Grande fatigue , lassitude et envie de

dormir, à l'approche d'un orage. — * *Grande disposition à prendre des refroidissements*, même seulement en se découvrant les pieds.

PEAU. — *Sensibilité douloureuse de la peau*. — * Prurit sur tout le corps, souvent formicant ou lancinant. — Éruption comme des varicelles sur tout le corps. — * Taches tubéreuses, rosées, à la peau. — * Tumeurs et abcès lymphatiques, même avec ulcères fistuleux. — Engorgement et induration des glandes. — * Inflammation, ramollissement et ulcération des os. — * Indurations squirrheuses. — * Ulcères fistuleux, putrides, phagédéniques, fongueux, etc., avec végétations ou sanie fétide et rongeante. — *Suppurations bénignes et malignes*, surtout dans les parties membraneuses. — Peau malade; toute lésion tend à s'ulcérer. — * Pression, prurit, cuisson, et élancements térébrants dans les ulcères. — Furoncles. — * Charbons de nature maligne. — * Ganglions. — Verrues. — * *Panaris*.

SOMMEIL. — * *Sommeil excessif*, sans que l'on puisse s'endormir. — * Bâillements fréquents. — *Sommeil le soir, de bonne heure*. — * *Sommeil tardif*. — * *Sommeil trop léger la nuit*, comme si on n'était qu'assoupi. — * *Insomnie*, causée surtout par *bouillonnement de sang*, *chaleur à la tête*, et grande affluence d'idées. — * Visions effrayantes, la nuit, et *affluence de rêves anxieux et fantastiques*, avec pleurs, paroles, cris et réveils fréquents en sursaut. — * *Tressaillement du corps, pendant le sommeil*. — Rêves lascifs. — * Ronflement en dormant. — Cauchemar. — *Somnambulisme*. — Rêves de brigands, d'assassins, de chiens, de voyages, de spectres, etc. — * La nuit, congestion de sang à la tête, avec douleurs pulsatives et battement au cerveau, douleur d'estomac, nausées et vomissement ou élancements dans toutes les articulations, sécheresse du nez, et beaucoup d'autres souffrances.

FIÈVRE. — * *Forte disposition frileuse* et horripilation avec frissons fréquents, même au plus léger mouvement. — Chaleur fréquente, quelquefois fugace. — *Fièvre avec forte chaleur*, généralement sans frisson et avec sueur peu abondante, ordinairement depuis 40 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. — * Sueur pendant une marche modérée. — * *Sueur abondante la nuit*, quelquefois d'odeur acide. — * Sueur débilitante le matin.

MORAL. — Humeur mélancolique et envie de pleurer. — Nostalgie. — * *Anxiété et agitation*. — Humeur taciturne: on est concentré en soi-même. — * Inquiétude et mauvaise humeur pour la moindre chose, provenant de grande faiblesse nerveuse. — Scrupules de conscience. — * Grande disposition à s'effrayer, sur-

tout au bruit. — *Découragement. — *Morosité, mauvaise humeur, et désespoir avec dégoût profond de la vie. — *Disposition à se fâcher, opiniâtreté et grande irritabilité. — *Répugnance pour le travail. — °Apathie et absence d'intérêt. — *Faiblesse de la mémoire. — *Incapacité de réfléchir. — Grande distraction. — Disposition à se tromper en parlant. — °Idées fixes; on ne songe qu'à des épingles, on les craint, les cherche, et les compte partout.

TÊTE. — *Obnubilation. — *Fatigue de la tête, par le travail intellectuel (lire, écrire ou réfléchir). — *Étourdissement, surtout le soir, comme si on était ivre. — *Vertiges de diverses natures, surtout le matin, et principalement en levant les yeux, ou en étant en voiture, ainsi qu'en se baissant ou après des émotions morales. — *Vertige avec nausées* et vomituration, ou bien *qui monte du dos dans la nuque et à la tête*. — *Vertige à tomber à la renverse. — *Douleur qui remonte depuis la nuque jusque dans le vortex, quelquefois empêchant de dormir la nuit. — °Céphalalgie en s'échauffant. — Céphalalgie avec frisson, lassitude et besoin de se coucher. — *Mauv de tête tous les matins. — *Pression dans la tête*, avec mauvaise humeur, et pesanteur dans tous les membres, quelquefois le matin. — *Pesanteur de la tête; il semble que le front va éclater, quelquefois tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir. — *Tension et pression dans la tête, comme si elle allait éclater. — Tiraillements dans la tête, qui semblent sortir par le front. — *Douleurs déchirantes dans la tête, souvent semi-latérales, avec élancements qui semblent sortir par les yeux et s'étendent jusque dans les os de la face, aux dents, ou qui se manifestent tous les matins, avec *chaleur à la tête*, principalement dans le front. — *Lancinations dans la tête*, surtout dans les tempes. — *Céphalalgie battante, généralement par *congestion de sang à la tête*. — Secousses douloureuses dans la tête. — Mouvements et tournoiement dans la tête, comme si tout y était vivant. — Ébranlement et résonnement dans le cerveau, à chaque pas que l'on fait. — Les maux de tête sont aggravés principalement par le travail intellectuel, par la parole et en se baissant. — Après les douleurs de tête, obscurcissement de la vue. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la tête au moindre contact. — °Sueur à la tête, le soir. — °Élévations tubéreuses au cuir chevelu. — Fort prurit au cuir chevelu. — °Teigne humide, pruriteuse. — Chute des cheveux.

YEUX. — Douleurs dans les yeux, le matin, comme provenant d'une trop grande sécheresse ou de sable qui s'y serait introduit. — Pression et cuisson dans les yeux et les paupières. — Élancements qui semblent sortir par les yeux. — *Prurit, cuisson et ar-

deur dans les yeux. — **Rougeur des yeux*, avec douleur cuisante dans les angles. — **Inflammation des yeux*. — *Gonflement de la glande lacrymale*. — °*Fistule lacrymale*. — *Larmoiement*, surtout en plein air. — **Agglutination des paupières*, la nuit. — °*Fongus hématode et ulcères de la cornée*. — °*Taches et cicatrices sur la cornée*. — Frémissement des yeux. — Occlusion spasmodique des paupières. — °*Presbyopie*. — **Les caractères se confondent, en lisant*. — Les objets semblent être pâles, en lisant. — **Vue trouble comme à travers un voile grisâtre*. — **Accès momentanés de cécité subite*. — °*Obscurcissement du cristallin*. — °*Obscurcissement de la vue, comme par une amaurose*. — °*Étincelles et taches noires devant la vue*. — **Photophobie* et éblouissement à la clarté du jour.

OREILLES. — Otalgie, avec douleur tractive. — °*Térébration et battement dans les oreilles*. — °*Élancements qui semblent sortir par les oreilles*. — Prurit aux oreilles. — Inflammation et suintement du bord des oreilles. — Croûtes derrière les oreilles. — Gonflement de l'extérieur de l'oreille, avec *écoulement par l'oreille*, accompagné d'une sorte de sifflement. — Accumulation abondante d'un cérumen humide. — Sensibilité excessive de l'oreille, au bruit. — **Obturation des oreilles*, °qui se dissipe quelquefois en se mouchant ou bien avec une *détonation*. — **Durété de l'ouïe*, quelquefois sans bruit dans les oreilles, ou bien exclusivement pour la voix humaine. — °*Durété de l'ouïe, augmentée à la pleine lune*. — Tintement, gloussement et bruit, comme si un oiseau battait des ailes dans les oreilles. — Carie de l'apophyse mastoïde. — **Gonflement et induration des parotides*.

NEZ. — Os du nez, douloureux au toucher. — *Douleurs rongeantes dans le haut du nez*, avec pesanteur en se baissant et sensibilité excessive à la pression. — Douleur pulsative d'ulcération, dans le nez et jusque dans la tête. — **Inflammation dans les narines*. — **Prurit et rougeur du nez (au bout)*, qui est couvert de vésicules croûteuses. — Furoncles au nez. — **Croûtes, boutons et ulcères dans le nez*. — **Épistaxis*. — °*Absence d'odorat*. — °*Éternuments avortés, interrompus*. — **Éternument par trop fréquent, immodéré*. — **Obturation du nez*, opiniâtre, °quelquefois par des *mucosités*. — °*Sécheresse pénible du nez*, quelquefois la nuit. — **Coryza sec*. — **Coryza continu*. — **Coryza fluent*, fréquemment, °ou qui enlève une obturation opiniâtre du nez. — Mucosités nasales, âcres et corrosives.

FACE. — Face pâle, terreuse. — Taches blanches sur les joues, de temps à autre. — Taches rouges, brûlantes, sur les joues et le nez, surtout après le repas. — Chaleur à la face. — °*Élancements*

dans les os de la face. — Prurit dans les favoris. — Furoncle sur la joue. — *Gerçures et rhagades à la peau du visage. — *Induration squirrheuse au visage et à la lèvre supérieure. — Gonflement des lèvres. — Ulcération des commissures des lèvres. — *Eruptions croûteuses aux lèvres*, avec douleur cuisante. — **Ulcères sur la partie rouge de la lèvre inférieure*. — Furoncles au menton. — **Dartres au menton*. — *Crampe dans l'articulation de la mâchoire. — *Élancements et tractions nocturnes dans la mâchoire inférieure. — *Gonflement et carie des os de la mâchoire inférieure. — **Gonflement des glandes sous-maxillaires*, avec douleur au toucher ou même avec induration.

DENTS. — *Odontalgie par des aliments chauds ou l'introduction de l'air froid dans la bouche. — *Traction, tressaillement et *déchirements dans les dents* et la joue, *aggravés la nuit*, ou bien seulement en mangeant. — *Odontalgie généralement lancinante, la nuit, qui trouble le sommeil, aggravée par les choses froides ou chaudes. — *Maux de dents avec gonflement de l'os ou du périoste de la mâchoire et chaleur nocturne, universelle, qui empêche de dormir. — *Fouillement et térébration dans les dents. — Dents émoussées. — Inflammation douloureuse, gonflement, excoriation et *saignement facile des gencives.

BOUCHE. — *Sécheresse de la bouche*. — Haleine fétide, surtout le matin. — *Stomacace. — *Mucosités continuelles dans la bouche. — Sensation comme s'il y avait un cheveu sur la langue. — *Excoriation de la langue. — Gonflement d'un seul côté de la langue. — Ulcère au palais. — Langue chargée de mucosités brunâtres.

GORGE. — Mal de gorge avec *accumulation de mucosités dans la gorge*. — Douleur d'excoriation et *picotement comme par des épingles, dans la gorge, pendant la déglutition. — Gonflement de la luette. — Déglutition difficile, comme par paralysie du gosier. — Tendance des aliments à remonter dans les fosses nasales, pendant la déglutition.

APPÉTIT. — *Perte du goût. — *Amertume dans la bouche, même le matin. — Goût aigre, putride, ou comme si l'on avait du sang ou des mucosités dans la bouche. — *Forte soif, quelquefois avec absence d'appétit. — **Répugnance pour tous les aliments*, surtout les *aliments cuits et chauds*, avec appétence seulement pour les choses froides. — **Dégoût pour la viande*; elle est indigeste. — *Répugnance de l'enfant pour le sein de la mère, avec vomissement après avoir tété. — **Après le repas*, forte envie de dormir, pyrosis, *aigreurs dans la bouche*, renvois aigres, plénitude dans l'estomac et le ventre, ou bien (souvent consécutivement), *pression à l'estomac*, écoulement d'eau par la bouche, comme des pi-

tuites, vomissement, frissons fébriles, congestion à la tête, chaleur aux joues.

ESTOMAC. — *°Renvois, avec goût des aliments, quelquefois après chaque repas. — °Renvois aigres. — Pyrosis. — Hoquet quelquefois le soir, au lit. — °Nausées tous les matins, avec douleur dans la tête et les yeux, en tournant les yeux, ou bien suivies de vomissement d'eau amère. — °Nausées continuelles, et vomissement, même la nuit. — °Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, quelquefois avec horripilation. — °Vomissement toutes les fois que l'on boit. — °Vomissement des aliments, même la nuit. — °Pression à l'estomac, quelquefois après chaque repas, ou en buvant vite. — °Sensibilité douloureuse du scrobicule, en pressant dessus. — Pesanteur dans l'estomac. — °Serrement dans le scrobicule, comme par une griffe, quelquefois après le repas. — °Sensation brûlante dans le creux de l'estomac.*

VENTRE. — *°Gonflement et induration de la région hépatique. — °Douleur d'ulcération à la région hépatique, avec battement; les douleurs s'aggravent au toucher et en marchant. — Élançements dans les hypochondres, surtout à gauche. — Coliques pendant lesquelles les mains jaunissent et les ongles deviennent bleus. — Pression dans le ventre, surtout après le repas. — °Ventre dur, tendu, chaud (même chez les enfants), et quelquefois douloureux au toucher. — °Grosseur du ventre. — °Coliques par constipation. — °Tranchées ou pincement dans le ventre, avec ou sans diarrhée. — °Sensation brûlante dans le ventre. — Les maux de ventre sont soulagés par l'application de linges chauds. — °Hernie inguinale, douloureuse. — Inflammation et gonflement des glandes de l'aîne. — °Incarcération de flatuosités. — Gargouillement et borborygmes dans le ventre, surtout en remuant le corps. — °Expulsion difficile des flatuosités. — Flatuosités très-fétides.*

SELLES. — *°Constipation et selles lentes, dures, difficiles, noueuses. — °Dureté des selles, avec ténesme fréquent. — °Selles de la consistance de la bouillie, plusieurs fois par jour. — Diarrhée avec coliques. — Selles rougeâtres, ou avec mucosités sanguinolentes. — Écoulement fréquent de sérosités fétides, d'une odeur cadavéreuse. — Élançements et prurit à l'anus et au rectum, même pendant la selle.*

URINES. — *Ténesme urinaire. — Besoin continuel d'uriner, avec écoulement peu abondant. — °Émission fréquente d'urine, même la nuit. — °Pissement au lit. — Sable rougeâtre et sédiment jaune, sablonneux dans les urines.*

PARTIES GÉNITALES. — *Prurit et taches rouges sur le gland. — °Excitation, prurit et rougeur au prépuce. — Gonflement du pré-*

puce, qui est couvert de boutons pruriants et humides. — *Gonflement hydropique du scrotum. — Sueur et prurit au scrotum. — **Tache pruriant et humide au scrotum.* — *Absence d'appétit vénérien, avec faiblesse des fonctions génitales, ou bien *exaltation immodérée de l'appétit vénérien*, avec affluence d'idées lascives, et érections fortes et fréquentes. — Écoulement de liqueur prostatique pendant les selles. — Après le coït, courbature dans les membres, ou sensation de paralysie dans un côté de la tête.

RÈGLES. — *Règles trop hâtives et trop faibles*, ou bien *trop abondantes*. — *Suppression des règles.* — *Métrorrhagie.* — °Avant les règles, diarrhée. — °Pendant les règles, douleurs dans le ventre, ou vue pâle, ou sensation brûlante et excoriation à la vulve. — **Prurit à la vulve.* — °Écoulement de sang par la matrice pendant l'allaitement. — *Avortement.* — **Leucorrhée* qui coule en urinant, ou après les règles. — °*Leucorrhée* comme du lait, coulant par intervalles, et précédée de tranchées dans la région ombilicale. — **Leucorrhée dore, corrosive.* — °Inflammation des mamelons. — °Absès au sein, même avec ulcères fistuleux. — Indurations au sein.

LARYNX. — *Enrouement, avec âpreté et excoriation dans le larynx. — Toux par les boissons froides, ou pour peu qu'on ait parlé. — Toux ébranlante, provoquée par un chatouillement suffocant dans la fossette du cou. — *Toux fatigante, jour et nuit, aggravée par le mouvement, avec expectoration muqueuse peu abondante. — *Toux nocturne, suffocante. — Toux spasmodique. — Toux sèche, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — Toux avec vomissement de mucosités. — *Expectoration abondante de mucosités transparentes, en toussant. — **Expectoration de pus*, en toussant. — Expectoration de sang, avec toux creuse, profonde.

POITRINE. — **Étouffement de la respiration*, °en étant couché sur le dos, ou bien en se baissant, en courant ou en toussant. — Respiration profonde, suspirieuse. — °*Haleine courte*, pendant un travail manuel peu fatigant, ou bien en marchant vite, quelquefois avec dyspnée pendant le repos. — °Respiration haletante en marchant vite. — Gêne de la poitrine, comme par constriction de la gorge. — **Pression à la poitrine*, quelquefois seulement en toussant ou en éternuant. — **Élancements* et picotements dans la poitrine et le côté, quelquefois jusqu'au travers du dos. — Battement dans le sternum. — Douleur de brisement dans la poitrine, en respirant et en toussant.

TRONC. — **Douleur aux reins*, au toucher, et sans qu'on y touche. — °Traction crampoïde aux reins, qui ne permet pas de se redresser, et force à rester couché. — °*Absès inflammatoire dans la ré-*

gion lombaire. — *Faiblesse et roideur paralytique dans le dos, aux reins et à la nuque. — *Déchirements et élancements dans le dos. — °Élancements dans les lombes, en étant assis ou couché. — °Gonflement et déviation de la colonne vertébrale. — °Douleur de brisement entre les omoplates. — Tractions tensives, déchirements et lancements dans et entre les omoplates. — °Ulcère purulent à la nuque. — Boutons et furoncles à la nuque. — *Gonflement des glandes à la nuque, au cou et sous les aisselles, quelquefois avec induration. — °Suppuration des glandes axillaires. — °Carie de la clavicule.

BRAS. — *Tractions et déchirements dans les bras, les mains et les doigts. — *Pesanteur et lassitude paralytique des bras, qui tremblent au moindre travail. — *Engourdissement des bras lorsqu'on est couché dessus, ou en s'accoudant sur une table. — Battement et tressaillement des muscles du bras. — Peau gercée, aux bras et aux mains. — Furoncles et verrues aux bras. — *Faiblesse paralytique de l'avant-bras; on laisse tout tomber des mains. — Induration du tissu cellulaire de l'avant-bras. — °Élancements nocturne dans l'articulation de la main, jusqu'au haut du bras. — Douleur crampeuse dans les mains et les doigts. — Engourdissement des mains, la nuit. — Faiblesse paralytique des mains. — Ganglion sur le dos de la main. — °Ulcère sur le dos de la main. °Fourmillement dans les doigts. — Sensation brûlante dans le bout des doigts. — Douleur dans les articulations des doigts, en pressant dessus. — *Faiblesse, roideur et manque de flexibilité des doigts. — Vésicules rongeantes, purulentes, avec brûlement aux doigts. — *Panaris, surtout avec végétations, cris et douleurs insupportables jour et nuit.

JAMBES. — Tractions, déchirements et tensions dans les jambes. — Engourdissement facile des jambes, surtout en étant assis. — Faiblesse paralytique des jambes. — *Pression, déchirement et élancements dans les muscles des cuisses. — °Ulcères pruriants aux cuisses et aux malléoles. — *Furoncles aux cuisses et aux mollets. — °Ramollissement et ulcération du fémur. — *Déchirements dans le genou. — °Gonflement inflammatoire du genou. — °Fongus au genou. — Douleur tractive dans les jambes. — Froid aux jambes. — Gonflement des jambes jusqu'aux pieds. — °Ulcères aux jambes, souvent avec teint maladif. — Tache rouge, cuisante, sur le tibia. — °Carie du tibia. — Tension des mollets, comme par raccourcissement. — *Crampes aux mollets, surtout le soir, après un travail corporel. — °Torpeur des mollets. — Miliare pruriante aux mollets. — Déchirement et élancements dans les mollets, les talons et les orteils. — °Lancination dans la malléole, en appuyant le pied. — Engourdissement des pieds, le

soir. — **Froid aux pieds*, quelquefois après une suppression de la transpiration des pieds. — Sensation brûlante dans les pieds et la plante des pieds, surtout le soir et la nuit. — **Gonflement des pieds*, généralement le matin. — **Odeur fétide des pieds*. — **Sueur aux pieds*, avec excoriation entre les orteils. — **Sueur aux pieds* supprimée. — **Durillons durs et douloureux à la plante des pieds*. — **Chatouillement voluptueux à la plante des pieds*, au point de rendre fou après s'être gratté tant soit peu. — Crampe à la plante des pieds. — Vésicules rongeantes au talon. — Roideur des orteils. — **Ulcération du gros orteil*, avec douleur lancinante. — **Cors aux pieds*, avec douleurs lancinantes.

208. — SOLANUM LYCOPERSICUM.

SOLAN-LYC. — Pomme d'amour; lycopersicon esculentum. — ARCHIVES XVII. —
Durée d'action?

ANTIDOTES?

SYMPTOMES. — Difficulté de *s'endormir*, avec agitation et malaise dans toutes les positions; position sur le dos, la nuit, à cause d'une sensation de paralysie; réveil fréquent et jactation, la nuit, les membres sont comme paralysés; il faut se lever la nuit pour uriner; *rêves* indifférents, qui cependant éveillent; mauvaise humeur, avec irritation pour des vécilles, et aggravation de la mauvaise humeur, à cause de la faiblesse de la mémoire. — *Ineptie*; impossibilité de réfléchir, pire en s'appuyant la tête. — *Tête lourde*, quelquefois avec embarras, ou bien avec faiblesse des muscles de la nuque; compression de la tête, des deux côtés; perforation à gauche, dans les muscles de la nuque; tension et perforation dans les téguments du front; pression au-dessous de l'os frontal, comme si le cerveau allait s'échapper, toute la soirée et même encore au lit, soulagé en se soutenant la tête. — *Au visage*, élancements dans la joue gauche, ou bien dans la pommette. — Coryza sec. — Dans la *poitrine*, élancements à gauche, au-dessous du sternum. — A l'*avant-bras* gauche, élancements. — Au *pied* droit, élancements à la malléole extérieure.

206. — SOLANUM MAMMOSUM.

SOL-M. — Médicament encore très-peu connu, mais qui a été employé contre un cas de *Varicelle*.

SYMPTOMES. — Érysipèle vésiculeux. — Dartres. — Forte envie de dormir, et lassitude sans que l'on puisse dormir. — Sommeil profond, avec réveil incomplet. — Agitation qui pousse constamment de côté et d'autre. — Disposition à se fâcher pour des griefs imaginaires. — Incapacité de penser ou d'écrire avec un peu de suite. — Sensibilité de la fumée du tabac. — Tressaillement des muscles dans le dos. — Élançements paralytiques dans l'articulation coxo-fémorale, en marchant.

207. — SOLANUM NIGRUM.

SOL-N. — Morelle noire. — Médicament qui n'a point encore été étudié sur l'homme en santé, mais qui s'est montré efficace contre des cas d'Empoisonnement par le *seigle ergoté*.

SYMPTOMES (qui dans ces cas d'empoisonnement ont été guéris par ce médicament). — °*Fourmillement dans les membres*. — °*Tressaillement*. — °*Contraction des muscles fléchisseurs, comme si on allait sauter*. — °*Distorsion spasmodique des membres*. — °*Spasmes toxiques*. — °*Convulsions épileptiques*. — °*Fureur*. — °*Imbécillité*. — °*Rire sardonique, par distorsion des muscles de la face*. — °*Contraction des mains*. — °*Traction dans les doigts*. — °*Crampes dans les mollets*. — °*Pieds tournés en dedans*.

208. — SPIGELIA.


SPIG. — Spigélie anthelminthique. — HAHNEMANN. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : 3 à 4 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTE : Camph. — *On l'emploie comme antidote de* : Merc.

COMPARER AVEC : Acon. aur. chin. dig. euphr. laur. merc. natr-m. sil, spong. tar. veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : —

Convulsions; Fièvres muqueuses et vermineuses?; Fièvres intermittentes larvées?; *Céphalalgies, prosopalgies et odontalgies intermittentes, nerveuses et rhumatismales*, surtout chez les femmes d'une constitution nerveuse; Ophthalmies rhumatismales et arthritiques; Douleurs névralgiques aux yeux, surtout après s'être fatigué la vue; Affections vermineuses; Grippe; Fièvres catarrhales; Hydrothorax; *Maladies du cœur*, etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs arthritiques, lancinantes ou déchirantes* dans les membres. — Déchirement auprès des articulations, comme si on en ratissait les os. — Sensations de pesanteur et de brisement dans les membres. — °Convulsions. — *Lassitude*, surtout après un léger exercice et au grand air. — °Accès d'évanouissement, surtout en faisant des efforts pour aller à la selle, ou dans un appartement chaud. — Grande sensibilité à l'air froid, avec souffrances par la marche au grand air. — *Grande facilité à prendre un refroidissement.

PEAU. — Sensibilité douloureuse de toute la peau du corps, au toucher. — Boutons rouges, avec douleur d'excoriation au toucher.

SOMMEIL. — Forte envie de dormir, le jour, et même dès le matin, ou le soir; on ne s'endort, cependant, que longtemps après qu'on s'est couché. — Sommeil de nuit non réparateur, agité, avec inquiétudes dans les membres. — Sommeil lourd; engourdisant.

FIÈVRE. — *Frissons fréquents*, surtout le matin ou pendant un léger exercice. — Chaleur fréquente, quelquefois fugace. — Pendant la chaleur, soif de bière.

MORAL. — Tristesse et découragement. — Agitation et anxiété, avec soucis inquiets sur l'avenir. — Caractère peureux. — Morosités jusqu'à la manie du suicide. — *Faiblesse de la mémoire*. — Absence d'idées. — Inaptitude aux travaux intellectuels.

TÊTE. — Tête embarrassée, comme par l'ivresse ou un étourdissement. — Vertiges, au point de tomber, en marchant, en étant debout, et en regardant en bas. — Vertige avec nausées. — Maux de tête, en branlant la tête, avec vertige et sensation de pesanteur. — **Douleurs de tête, aggravées par le plus léger mouvement*, un bruit un peu fort, et en ouvrant la bouche. — *Sensibilité douloureuse de l'occiput*, avec sensation d'engourdissement et de roideur dans la nuque. — **Maux de tête périodiques*. — *Pression dans la tête*, compressive et expansive, aggravée en se baissant. — *Douleur comme si la tête allait éclater, en toussant et en par-

lant fort. — *Maux de tête déchirants*, fouillants ou térébrants, surtout pendant le mouvement. — Lancinations pulsatives et étendues dans le front, avec bruit de coups de marteau devant les oreilles. — *Commotions et coups dans la tête*, pendant la marche au grand air. — Ébranlement dans le cerveau, à chaque pas et à chaque mouvement de la tête. — *Douleur brûlante à l'extérieur du front et des tempes, jusque dans les yeux. — Tension du cuir chevelu. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu, au toucher.

YEUX. — **Douleurs dans les yeux, profondément dans les orbites.* — **Pression sur le globe des yeux*, surtout en les tournant. — **Douleurs dans les yeux, pendant le mouvement, comme si le globe des yeux était trop volumineux.* — **Fouillement, térébration et élancements dans les yeux*, et jusque dans la tête, quelquefois avec douleurs qui portent au désespoir. — *Le mouvement des yeux et des muscles de la face aggrave les douleurs. — Fourmillement dans les yeux. — Chaleur sèche et sensation brûlante dans les yeux qui oblige à les fermer. — **Rougeur de la sclérotique*, avec injection des vaisseaux sanguins. — **Inflammation des yeux* et de la cornée. — **Inflammation et ulcération des paupières*, avec douleur cuisante d'excoriation. — **Yeux troubles, ternes.* — *Larmolement abondant.* — Larmes âcres, cuisantes. — **Grande sensibilité des yeux à la lumière.* — **Chute des paupières, comme par paralysie.* — °Tendance à cligner. — Difficulté de soulever les paupières, avec sensation de roideur douloureuse. — Contraction et mouvements involontaires des yeux. — Pupilles dilatées. — Perte (suspension momentanée) de la vue. — Presbyopie. — **Rayons lumineux devant la vue.*

OREILLES. — *Otalgie, avec douleur pressive, pénible*, comme s'il y avait une cheville dans l'oreille. — Déchirement tressaillant dans les oreilles. — Étreinte, prurit et sensation brûlante à l'oreille extérieure. — *Obturation des oreilles*, avec ou sans dureté de l'ouïe. — **Surdit   p  riodique.* — Mugissement, bourdonnement et pulsation dans les oreilles. — Bruit de coups de marteau devant les oreilles.

NEZ. — *Prurit au nez, avec chatouillement.* — Fourmillement, élancements, térébration, cuisson et démangeaison dans le nez. — Éruption dartreuse au nez, avec douleur d'excoriation. — Obturation et s  cheresse du nez, avec   coulement abondant de *mucosit  s* blanch  tres et jaun  tres, par les fosses nasales. — °Coryza fluent, fr  quemment, surtout apr  s le plus l  ger refroidissement.

VISAGE. — **Visage p  le, d  fait*, avec cercles jaunes autour des yeux. — °Joues et l  vres tant  t rouge fonc  , tant  t p  les. —

**Bouffissure de la face*, surtout après avoir dormi. — **Déchirements tressaillants*, sensation brûlante et *pression dans la région des os zygomatiques*, ou *°douleurs violentes*, qui ne supportent ni le plus léger contact, ni le moindre mouvement, avec gonflement luisant du côté affecté. — *°Douleurs semi-latérales à la face*, avec angoisse de cœur et grande agitation. — *Exostose au côté de l'orbite* qui est près de la tempe. — *Lèvres tendues et brûlantes*. — *Petits boutons noirâtres sur la lèvre supérieure*. — *Douleur pressive dans l'angle de la mâchoire inférieure*, comme dans la mâchoire ou dans les dents, provenant de l'oreille.

DENTS. — *Odontalgie* après avoir fumé. — *Douleur de pression écartante aux dents, immédiatement après le repas, ou la nuit*, ne permettant pas de rester couché. — **Maux de dents tressaillants*, ou avec déchirements *pulsatifs*, surtout dans les dents cariées, *aggravés par l'eau froide*, ou par le contact du grand air. — *°Maux de dents*, avec prosopalgie, face pâle et bouffie, cercles jaunâtres autour des yeux, battement de cœur, frissonnement et agitation.

BOUCHE — GORGE. — *Exhalaison fétide par la bouche*. — *Sèche-resse lancinante* dans la bouche, le matin, au réveil. — *Accumulation abondante de salive blanche, écumeuse*, dans la bouche. — *Mucosités blanches ou jaunes* dans la bouche et le palais. — *Langue fendillée*. — *Vésicules*, avec douleur brûlante sur la langue et au palais. — *Mal de gorge*, avec lancements et gonflement au palais.

APPÉTIT. — *Goût putride, fétide*. — *Absence d'appétit, avec forte soif*. — *Répugnance pour le tabac à fumer et à priser*. — *Répugnance pour le café*. — *Boulimie*, quelquefois avec nausées et soif.

ESTOMAC. — *Renvois après tous les aliments*. — *Renvois aigres*. — **Nausées à jeun*, avec sensation comme si quelque chose remontait de l'estomac dans la gorge. — *Accumulation de mucosités dans l'estomac*. — *Pression dans l'estomac* et dans le scrobicule, *comme par un corps pesant*. — *Lancements dans le creux de l'estomac et le diaphragme*, quelquefois avec étouffement de la respiration. — *°Impossibilité de supporter des vêtements serrés autour du scrobicule*; le moindre contact donne des angoisses, avec rougeur et chaleur du visage, et sensation comme si quelque chose se déchirait dans la poitrine.

VENTRE. — *Ventre dur et douloureusement tendu*. — *Pression dans la région ombilicale, comme par un corps dur*. — *Coliques avec douleurs pinçantes, tranchées* dans la région ombilicale, avec frisson, diarrhée et sécrétion abondante d'urine. — *Lancements dans le ventre*. — *Douleur tensive dans les aines*,

au toucher. — Grondement et borborygmes dans le ventre. — Expulsion de vents fétides.

SELLES. — Envie fréquente d'aller à la selle, sans résultat. — Selles molles, liquides. — *Selles dures avec efforts et mucosités abondantes.* — *Écoulement de mucosités par l'anus, sans selle.* — *Diarrhées liquides, de matières fécales et de mucosités.* — Diarrhée, avec pincements dans le ventre et froid au corps. — *Lombrics et ascarides du rectum.* — Prurit et sensation comme si quelque chose rampait dans le rectum et l'anus.

URINES. — Urine, avec sédiment blanchâtre. — *Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante, même la nuit.* — Suintement involontaire des urines, avec sensation brûlante dans la partie antérieure de l'urèthre.

PARTIES GÉNITALES. — Fourmillement autour du gland. — Gonflement semi-latéral du gland. — Érections, avec idées lascives, sans excitation voluptueuse. — (Écoulement de liqueur prostatique.)

LARYNX. — Catarrhe, avec enrouement, écoulement continu de mucosités nasales, chaleur sèche, sans soif, yeux proéminents, mal de tête pénible et envie de pleurer. — Catarrhe nocturne, avec toux. — Toux, au grand air, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — *Toux sèche, violente, creuse, avec étouffement de la respiration jusqu'à suffoquer.*

POITRINE. — Pression à la poitrine, avec oppression douloureuse. — °Haleine courte, surtout en parlant, avec anxiété et rougeur des joues et des lèvres. — °*Péril de suffocation au moindre mouvement et surtout en levant les bras.* — °Forte gêne de la respiration, en se remuant au lit, avec impossibilité de rester couché autrement que sur le côté droit et presque assis. — °Accès subits de suffocation, avec battement de cœur et angoisse. — *Contraction de la poitrine, avec angoisse et respiration gênée.* — °Bruit dans la poitrine, comme celui que fait un rouet, surtout dans la région du cœur. — °Pression, sensation brûlante ou incisive, douleur d'ulcération et *déchirement dans la poitrine*, surtout en levant les bras. — °Sensation d'un tremblement dans le thorax, aggravé par le mouvement des bras. — Sensation crampôide dans la poitrine, °partant du creux de l'estomac et produisant des étouffements. — *Lancinations tensives dans la poitrine*, surtout en respirant. — *Battements de cœur violents*, sensibles à la vue et à l'ouïe, *souvent avec oppression anxieuse de la poitrine*, aggravés en courbant la poitrine et en s'asseyant. — °Lancinations dans la région du cœur. — Sensation de tremblement au cœur. — Les battements du cœur ne répondent pas à ceux du pouls. — Mouvement du cœur, comme une ondulation.

TRONC. — Douleur de brisement dans le dos, même pendant le mouvement. — *Lancinations dans le dos*, quelquefois en respirant. — Boutons rouges au cou, avec douleur d'excoriation au toucher. — Gonflement dur et douloureux des glandes du cou.

BRAS. — Pesanteur et tremblement des bras. — Engourdissement facile des bras et des mains. — Tressaillement des muscles des bras et des avant-bras. — *Lancinations* violentes et saccadées, *dans le pli du coude* et les articulations des mains et des doigts. — Tractions et déchirements crampoïdes dans les os des mains. — Nodosités dures dans la paume des mains, avec prurit brûlant. — Mains jaune pâle. — Contraction des doigts. — Boutons purulents aux doigts.

JAMBES. — Douleur de brisement, tension et élancements dans les cuisses, presque exclusivement *en marchant et pendant les mouvements prompts*. — Lancinations violentes dans le genou, en le pliant. — Roideur douloureuse de l'articulation du genou. — Secousses lancinantes dans les articulations des pieds. — Excroissances, comme des verrues, aux orteils.


209. — SPONGIA TOSTA.

SPONG. — Éponge brûlée. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 2, 3, 30. — *Durée d'action* : 3, 4 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Camph.

COMPARER AVEC : Acon. ars. cupr. dros. hep. iod. merc. phos. spig. — C'est surtout après acon. que spong. est efficace (dans le croup), lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après spong., convient souvent (dans le croup) hep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections des glandes et des vaisseaux lymphatiques; Croup (avant d'employer hep., ou alternant avec celui-ci); Laryngite chronique; (Phthisie laryngée); Bronchite; Souffrances asthmatiques; Maladies du cœur; Tubercules aux poumons; etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Gonflement et induration des glandes. — Courbature des bras et des jambes. — Sensation de torpeur dans la partie inférieure du corps. — Lourdeur du corps. — Abattement excessif, moral et physique. — En étant couché tranquillement, on se trouve mieux que dans toute autre position. —

Élancements pruriants à la peau, surtout en se réchauffant au lit. — Sensation de quelque chose qui ramperait sur la peau, avec rougeur et chaleur de la partie, après s'être gratté. — Tache rouge, pruriante à la peau. — Éruptions pruriantes. — Éruptions miliaires. — *Dartres*. — *Insomnie, avec rêveries fantastiques et délire en s'endormant*. — Rêves tristes, anxieux, effrayants. — Frissons fréquents par tout le corps, surtout au dos. — Accès de chaleur fugace. — ° *Chaleur fébrile, avec peau sèche et chaude, soif continuelle, mal à la tête et délire*. — ° Pouls dur, accéléré. — Sueurs nocturnes. — *Accès d'angoisse, avec douleur dans la région du cœur*. — Humeur inconsolable et pleurs. — Caractère craintif et frayeur facile. — Humeur récalcitrante et bravades. — Gaieté immodérée et malicieuse. — Grande envie de chanter. — Esprit obtus, avec incapacité complète de se livrer à un travail de tête.

TÊTE. — *Vertige, avec étourdissement au point de tomber, quelquefois le soir, ou bien avec sensation comme si la tête allait fléchir de côté*. — Vertige avec nausées, la nuit, en se réveillant. — Pesanteur et plénitude de la tête. — Mal de tête sourd, semi-latéral, en entrant dans un appartement chaud, lorsqu'on vient du grand air. — Mal de tête, avec larmoiement en fixant les yeux sur un objet. — * *Maux de tête pressifs, quelquefois avec compression*. — *Douleurs dans la tête, comme si elle allait éclater, surtout dans le front*. — * *Battement et pulsation dans la tête*. — *Congestion de sang à la tête*. — Sensibilité désagréable de l'extérieur de la tête. — Prurit pénible au cuir chevelu.

YEUX. — Yeux ternes et troubles, avec bouffissure des paupières. — *Pression et élancements dans les yeux*. — * *Yeux brûlants, rouges et larmoyants*. — Agglutination des paupières. — Éruption de croûtes jaunes, dans les sourcils. — *Pesanteur pressive des paupières*. — Contraction des paupières le matin. — Myopie.

OREILLES ET NEZ. — Otalgie, avec douleur contractive. — Pression dans les oreilles. — Ulcération de l'oreille extérieure. — *Durété de l'ouïe*. — *Épistaxis, surtout après s'être mouché*. — Éruption au bout du nez.

VISAGE. — Visage pâle, avec yeux abattus. — ° *Visage bouffi, rouge ou bleudtre, avec physionomie anxieuse*. — *Gonflement des joues*. — Prurit et élancements dans les joues. — *Éruptions aux lèvres*. — Douleur crampoïde dans les articulations de la mâchoire. — *Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec douleur tensive*.

DENTS. — Sensation d'émoussement et de vacillement des dents, pendant la mastication. — Prurit et élancements aux dents. — Gonflement des gencives, avec douleurs pendant la mastication.

BOUCHE. — Bouche et langue couvertes de vésicules, avec douleur

brûlante et lancinante. — *Salivation*. — Parole faible. — °Langue sèche, brunâtre. — Sensation brûlante et élancements dans la gorge.

APPÉTIT. — Diminution du sens du goût. — **Goût amer*, quelquefois *seulement dans la gorge*. — Goût douceâtre dans la bouche. — Appétit modéré et satiété prompte. — *Pain violente, insatiable*. — **Soif*, °quelquefois inextinguible. — La fumée du tabac ne convient pas. — Après le repas, plénitude et souffrance dans l'abdomen, comme par difficulté de la digestion.

ESTOMAC. — **Renvois*, °quelquefois avec tranchées et déchirements dans l'estomac. — Renvois amers. — Régurgitations aigres. — Hoquets fréquents. — Nausées, avec fortes aigreurs dans la bouche. — Vomissement après avoir pris du lait. — Laxité de l'estomac, avec sensation comme s'il était ouvert. — Pression dans l'estomac et le scrobicule. — Pression des vêtements sur l'estomac. — Douleurs contractives à l'estomac.

VENTRE. — Ventre dur et tendu. — Crampes abdominales. — Fouillement et étranglement dans le ventre. — Tranchées dans le ventre, après le repas. — *Gronnement dans le ventre*, surtout le soir, et le matin, en étant couché. — Douleur comme par une hernie, dans l'anneau inguinal. — Gonflement des glandes de l'aîne.

SELLES. — **Selles dures et retardées*. — Selles diarrhéiques, blanchâtres. — Avant la selle, élancements à l'anus et gronement dans le ventre. — *Pendant la selle, ténésme à l'anus*. — Prurit, corrosion, et douleur d'excoriation à l'anus. — Ascarides du rectum et fourmillement au rectum.

URINES. — Sécrétion d'urine plus abondante. — °*Envie fréquente d'uriner*, avec émission peu abondante. — Incontinence d'urine. — Jet d'urine mince. — Urine écumeuse. — Sédiment épais, blanchâtre, grisâtre ou jaune, dans les urines.

PARTIES GÉNITALES. — Étranglement crampoïde dans les testicules. — *Gonflement dur des testicules* et du cordon spermatique, avec douleur pressive. — Appétit vénérien peu prononcé. — Absence d'érections. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Avant les règles, battement de cœur et douleur dans le dos. — Pendant les règles, traction dans les cuisses.

LARYNX. — **Enrouement*, quelquefois avec *toux et coryza*. — Voix faible, peu nette, et qui manque pendant le chant et la conversation. — **Douleur dans le larynx, au toucher et en tournant la tête*. — Pression dans le larynx, en chantant. — **Sensation d'obturation du larynx*, avec respiration empêchée. — **Apreté et sécheresse dans la gorge*. — **Douleur brûlante dans le larynx et la trachée-artère*. — Toux venant du fond de la poitrine, avec dou-

leur d'excoriation et sensation brûlante. — *Toux, avec expectoration jaunâtre et enrouement. — *Toux, creuse, sèche, *aboyante ou sibilante, jour et nuit, augmentée vers le soir, et quelquefois avec douleur dans le larynx. — *Toux avec expectoration de mucosités *visqueuses. — Toux sèche, provoquée par un chatouillement brûlant dans le larynx.

POITRINE. — Respiration lente et profonde, comme par faiblesse. — *Inspiration sifflante. — *Accès de râle muqueux, dans la trachée-artère. — *Respiration accélérée, anxieuse et difficile, quelquefois avec excès de suffocation et râle muqueux dans la poitrine. — Douleur fixe, lancinante et pressive dans la région des bronches. — Douleurs crampoïdes, constrictives, dans toute la poitrine. — Douleur de poitrine, avec dyspnée. — Plénitude et gêne dans la poitrine. — Élançement dans la poitrine. — Sensation brûlante qui remonte dans la poitrine. — Bouillonnement de sang dans la poitrine, après le plus léger effort et le moindre mouvement, avec étouffement de la respiration, angoisse, nausées, et faiblesse au point de s'évanouir. — Douleurs et anxiété dans la région du cœur.

TRONC. — Sensation de torpeur aux reins et dans les fesses. — *Maux de reins avec douleurs tractives, déchirantes et pressives. — Tension douloureuse et roideur des muscles du cou et de la nuque. — Gonflements gottreux, volumineux et durs, avec pression, fourmillement et élancements. — Crampes dans les muscles du cou.

BRAS. — Tressaillement des muscles, dans les articulations scapulaires. — Pesanteur et tremblement des avant-bras et des mains. Tiraillements dans les avant-bras et les articulations des mains. — Grosses ampoules sur l'avant-bras. — Gonflement des mains, avec roideur des doigts. — Rougeur et gonflement des articulations des doigts, avec tension en les faisant jouer. — Torpeur du bout des doigts.

JAMBES. — Tressaillement des muscles aux fesses. — Traction spasmodique des jambes, en avant et en arrière. — Roideur des jambes. — Traction et déchirement dans les jambes et les pieds, quelquefois la nuit seulement.




210.—SQUILLA MARITIMA.

SQUIL. — Scille maritime. — **HANNEMANN.** — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 2 à 4 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTE : Camph.

COMPARER AVEC : Bry. magn. mur-ac. n-vom. puls. rhab. rhus. seneg. spong.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections hydropiques?; Gastrite?; Entérite?; Ascite?; Affections catarrhales; Grippe; *Pneumonie, Pleurésie*, et souffrances à la suite de ces maladies, lorsqu'elles ont été traitées par des évacuations sanguines; Hydrothorax?; etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs sourdes, rhumatismales dans tout le corps, aggravées par le mouvement, et soulagées par le repos. — Palpitations musculaires. — Convulsions et accès de crampes. — Induration des glandes. — Pesanteur, fatigue et tiraillement dans les membres. — Inquiétudes dans les membres. — Sensation brûlante et pruriant à la peau. — Éruption comme une gale pustuleuse, avec prurit brûlant. — Excoriation dans le pli des membres. — Sphacèle. — Sommeil inquiet, avec rêves fréquents et jactation. — Insomnie. — Disposition frileuse. — Froid glacial des pieds et des mains, avec chaleur du corps. — *Chaleur sèche, brûlante, avec frissonnement et douleur pour peu qu'on se découvre. — *Après la chaleur, pâleur du visage sans frisson. — Angoisse, avec peur de la mort. — Gémissements. — Irritabilité chagrine. — Éloignement pour le travail intellectuel ou corporel.

TÊTE. — Vertige avec nausées. — Vertige le matin, à faire tomber de côté. — Mal de tête, le matin, après le réveil, comme une pesanteur pressive et douloureuse. — Sensibilité douloureuse du vertex, tous les matins. — Douleur serrante dans les côtés de la tête. — Contraction dans les tempes. — Maux de tête tractifs, lancinants. — Battement dans la tête, en se levant.

YEUX. — Douleur dans les yeux, avec sensation de contraction. — Déchirement dans les yeux, comme derrière les globes. — Sensation brûlante dans les angles extérieurs des yeux. — Gonflement des paupières supérieures. — Yeux grandement ouverts. — Regard

- fixe. — Pupilles contractées, ou fortement dilatées. — Tournement et obscurcissement devant les yeux.
- OREILLES ET NEZ.** — Déchirement dans les oreilles. — Narines douloureuses, comme si elles étaient excoriées. — Éruption suintante sous le nez, avec prurit lancinant. — Coryza fluent, avec narines ulcérées et éternement fréquent. — Mucosités nasales, âcres, corrosives.
- VISAGE.** — Visage tantôt très-altéré, tantôt physionomie animée. — Chaleur à la face, aisément excitée par le plus léger mouvement ou la parole. — Traits du visage tirés, contractés, surtout pendant la chaleur fébrile; après la chaleur, pâleur. — *Lèvres et dents noires. — *Lèvres gercées, avec croûtes brunâtres. — *Face rouge foncé.
- BOUCHE ET GORGE.** — *Bouche pâteuse et pleine de mucosités.* — *Bouche sèche et ouverte. — Vésicules sur la langue. — Apreté et grattement dans la gorge. — *Sensation brûlante dans le palais et la gorge.* — Sécheresse dans la gorge.
- APPÉTIT.** — Inapétence des aliments. — Goût empyreumatique dans le gosier, en mangeant. — *Goût doucedâtre, ou *amer, des aliments,* surtout de la viande et de la soupe. — *Dégoût des aliments. — Désir des acides. — Perte de l'appétit. — *Forte soif, surtout d'eau fraîche. — *Malgré la soif, on ne peut boire que goutte à goutte, à cause d'une gêne de la respiration. — *Voracité et boulimie.* — Faiblesse de la digestion.
- ESTOMAC.** — Nausées, quelquefois avec envie de vomir. — *Nausées continuelles le matin, pendant la toux. — Nausées avec envie de vomir, alternant constamment avec mouvements comme pour la diarrhée. — Vomiturition violente. — *Renvois amers. — *Pression sur l'estomac,* comme par une pierre.
- VENTRE.** — *Sensibilité douloureuse du ventre, avec ballonnement sans dureté. — Traction et déchirement à travers le ventre. — Pincements, grondement et borborygmes dans le ventre. — Expulsion fréquente de vents.
- SELLES.** — Constipation. — Selle dure, insuffisante. — *Diarrhée de mucosités brunâtres,* avec expulsion abondante de vents. — Selles diarrhéiques, noires. — Ascarides et filaments blancs, abondants avec la selle. — Selles fétides non digérées. — Selles sanguinolentes.
- URINES.** — Diminution de la sécrétion des urines. — *Forte envie d'uriner, avec émission abondante d'une urine aqueuse.* — Flux d'urine. — Émission fréquente d'urine, la nuit. — Pression continue sur la vessie, qui est très-sensible. — *Urines rouges, chaudes, foncées, avec sédiment rouge. — *Pissement de sang.* — Après l'émission des urines, ténésme.

PARTIES GÉNITALES. — Douleur dans les testicules, avec sensation compressive. — Métrorrhagies.

LARYNX. — Toux provoquée par un chatouillement au-dessous du cartilage xiphoïde, ou en respirant profondément. — Toux, jusqu'à provoquer des vomituritions. — *Toux violente, avec lancinations dans les côtés de la poitrine.* — Toux, avec ébranlement douloureux dans le ventre. — **Toux courte, sèche, chaque fois que l'on respire,* surtout le soir et la nuit. — Toux après avoir bu froid. — Râle muqueux avant la toux. — **Toux, avec expectoration de mucosités* et haleine courte. — **Toux, avec crachement de sang.* — Expectoration de mucosités rougeâtres. — Mal à la tête et suffocation en toussant, ou pression sur la vessie, et émission d'urine involontaire.

POITRINE. — Respiration accélérée et anxieuse, avec dyspnée et besoin d'être couché la tête et la poitrine hautes. — Respiration gémissante, avec bouche ouverte. — Pression des deux côtés de la poitrine, surtout en inspirant. — *Lancinations étendues, pressives ou tressaillantes, dans la poitrine et les côtés de la poitrine,* en respirant et en toussant. — **Sensation de pesanteur dans la poitrine.* — Congestion de sang à la poitrine. — Douleurs de poitrine, aggravées le matin.

TRONC ET MEMBRES. — Éruption pruriente au dos. — *Roideur de la nuque et du cou.* — Traction rhumatismale et serrement dans les muscles du cou. — Boutons au cou, douloureux seulement en les grattant. — Sueur sous les aisselles. — Tressaillement convulsif des bras. — Élancements dans les articulations des mains. — *Tressaillement convulsif dans les jambes.* — Tractions rhumatismales dans les cuisses et les jambes. — Sensation brûlante au gras du pied, comme s'il avait été gelé. — Sueur aux orteils. — Sueur froide aux pieds.

211. — STANNUM.

STAN. — Etain. — **HAHNEMANN.** — *Dose usitée :* 30. — *Durée d'action :* 6 à 7 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Puls.

COMPARER AVEC : Ars. bell. cann. caus. cham. chin. hell. ign. puls. seneg. stram. valer. verb. — C'est surtout après : *Caus.*, que stan. est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Paralysies; Épilepsie, surtout pendant la dentition; Fièvres lentes?;

Prosopalgie; Gastralgie et coliques spasmodiques, surtout chez des femmes hystériques ou chez des personnes hypochondriaques; Ténia?; *Flueurs blanches*; Catarrhe des bronches; Grippe; *Phthisie pituiteuse*; Phthisie laryngée; Hydrothorax; etc., etc.

☞ Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs pressives et tractivés* surtout dans les membres, s'aggravant insensiblement jusqu'à ce qu'elles deviennent très-violentes, et décroissant de même. — **Attaques d'épilepsie*, avec rétraction des pouces et jactation, ou bien avec renversement de la tête, pâleur du visage, mouvements convulsifs des mains et des yeux, et perte de connaissance; les accès viennent quelquefois le soir. — **Amaigrissement excessif*. — **Paralysies*. — Grande lourdeur et paresse. — **Abattement excessif*, et *accablement physique* et moral, avec tremblement, surtout en faisant un exercice doux, et avec disposition à transpirer facilement. — **Surexcitation nerveuse*. — **Inquiétudes insupportables dans le corps*. — **Fatigue excessive par la parole*. — Les souffrances semblent disparaître pendant la marche, à l'exception de l'abattement qui est excessif alors; elles reparaissent dès qu'on est tranquille.

PEAU. — Élançements pruriants (brûlants) sur toute la peau du corps. — Engélures. — Envies aux ongles.

SOMMEIL. — Envie de dormir, le jour. — Bâillement fréquent, avec oppression de la poitrine, comme si elle était entourée d'un cercle. — *Sommeil tardif*. — Le matin, on n'a pas assez dormi. — Sommeil profond. — **Agitation nocturne et affluence de rêves vifs, anxieux ou lascifs*. — Gémissements, pleurs et lamentations plaintives, en dormant.

FIÈVRE. — Frissons et horripilation, le matin, avec froid aux mains et torpeur du bout des doigts. — Frissonnement qui parcourt le dos, ou seulement à la tête, le soir, avec soif. — **Chaleur brûlante dans les membres, surtout aux mains*. — *Sensation de chaleur anxieuse au moindre mouvement*. — **Pouls petit, accéléré*. — **Sueurs nocturnes très-débilitantes*. — **Sueurs matutinales, abondantes*.

MORAL. — Humeur sombre, hypochondriaque. — **Grande agitation et angoisse*, mélancolie et disposition à pleurer. — On est très-affaîré, sans venir à bout de rien faire. — **Découragement*. — **Mauvaise humeur, avec taciturnité et éloignement pour la société et la conversation*. — *Emportement colérique subit*. — **Surexcitation nerveuse*.

TÊTE. — Vertige, comme si tous les objets étaient trop éloignés. —

Vertige en s'asseyant, avec perte des idées. — *Mal de tête, avec nausées et vomiturition*, quelquefois avec sensation brûlante dans le sinciput, les yeux et le nez, ou bien, le matin, avec mauvaise humeur. — **Pesanteur et pression étourdissante dans la tête, parcourant surtout le front.* — *Douleurs lancinantes dans la tête, surtout au front, et *principalement après une quinte de toux. — Douleurs crampoïdes dans la tête, comme par une tension ou un serrement. — Traction pressive et déchirement dans la tête. — Douleurs térébrantes dans la tête. — Douleurs battantes dans les tempes. — Secousses douloureuses à travers la tête.

YEUX. — Yeux douloureux, et comme excoriés par le frottement. — *Pression dans les paupières* et dans leurs angles. — Lancinations brûlantes dans les paupières. — Prurit, cuisson et sensation brûlante dans les yeux. — Orgelets. — *Agglutination nocturne des paupières.* — Ulcère à l'angle interne de l'œil, comme une fistule lacrymale. — *Yeux ternes, troubles.* — Tressaillement et frémissement des yeux. — Yeux convulsés ou proéminents. — Auréole irisée autour de la lumière.

OREILLES ET NEZ. — Otitie, avec déchirements tractifs. — Ulcération du trou percé pour les boucles d'oreilles. — Tintement d'oreilles. — Cris dans les oreilles, en se mouchant. — Pesanteur et sensation d'obturation dans la partie supérieure du nez. — Inflammation de l'intérieur du nez. — Sensation brûlante dans le nez. — Coryza sec d'un seul côté, avec gonflement et rougeur de la narine.

VISAGE. — *Visage pâle, hâve, avec yeux caves.* — Douleurs de la face, avec traction pressive, surtout aux pommettes et dans les orbites. — Douleur brûlante, lancinante dans les muscles de la face. — *Gonflement des joues* et de la mâchoire supérieure. — Crampe de la mâchoire. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires.

DENTS. — Odontalgie après le repas, avec douleur tressillante et chaleur du visage. — *Sensation d'allongement et de vacillement des dents. — Ulcère aux gencives, avec gonflement des joues.

BOUCHE ET GORGE. — Exhalaison fétide par la bouche. — Écoulement de salive acide. — *Parole embarrassée, abattue*, par faiblesse. — *Langue rouge. — Mal de gorge, comme par gonflement intérieur, avec traction et tension. — *Sensation de sécheresse dans la gorge*, avec lancinations. — Apreté et grattement dans la gorge, surtout le soir. — *Accumulation de mucosités dans la gorge et la bouche*, avec besoin de renâcler, suivi de sensation d'excoriation.

APPÉTIT. — Goût amer et aigre. — Goût amer de tous les aliments. — Goût amer, herbacé, de la bière. — Faim augmentée, avec impossibilité de se rassasier. — Soif augmentée. — Après le repas, nausées et vomissement. — °Faiblesse excessive de la digestion.

ESTOMAC. — Renvois, avec goût d'œufs pourris, ou amers. — *Renvois aigres, avec grattement dans la gorge. — Hoquet fréquent. **Nausées, surtout après le repas, suivies de vomissement amer et aqueux.* — **Vomituration violente*, suivie de vomissement des aliments. — **Pression à l'estomac*, quelquefois très-violente. — *Pression tensive au scrobicule*, qui est douloureux au toucher, comme par une ulcération sous-cutanée. — **Crampes d'estomac*, °quelquefois avec renvois amers, sensation de faim et diarrhée, ou bien avec nausées et teint pâle et maladif. — Serrement, comme par une griffe dans l'estomac et la région ombilicale, avec nausées.

VENTRE. — Coups obtus à travers les hypochondres. — *Crampes dans la région du diaphragme.* — Pression et °sensation brûlante dans la région hépatique. — *Pression, °douleur crampoïde et élancements dans l'hypochondre gauche. — Ventre douloureusement ballonné et sensible au toucher. — *Crampes abdominales*, avec douleurs au-dessus et en dessous de l'ombilic. — Fouillement, pincement et tranchées dans le ventre. — Sensation brûlante et élancements dans l'abdomen. — Sensation d'excoriation dans le ventre, aggravée au toucher. — Serrement comme par une griffe dans la région ombilicale, suivi de nausées. — Sensation de vacuité dans l'abdomen. — *Incarcération de flatuosités.*

SELLES. — Constipation. — *Envie d'aller à la selle*, inutile et fréquente. — Selles dures, sèches, noueuses, ou peu abondantes et verdâtres. — *Selles muqueuses.* — °Forte diarrhée.

URINES. — Rétention d'urine. — Émission d'une urine rare. — **Envie fréquente d'uriner*, quelquefois avec émission peu abondante. — Absence du besoin d'uriner, comme par insensibilité de la vessie.

PARTIES GÉNITALES. — *Exaltation de l'appétit vénérien.* — Excitation violente et voluptueuse à l'éjaculation. — *Pollutions fréquentes.

RÈGLES. — Menstruation plus abondante. — Avant les règles, anxiété et mélancolie. — °Pendant les règles, coliques. — Crampes de la matrice. — *Leucorrhée de mucosités transparentes ou jaunâtres, avec chute considérable des forces. — Le nourrisson quitte le sein de sa mère et ne veut plus teter.

LARYNX. — **Enrouement et âpreté dans la gorge*, avec chatouillement qui provoque la toux. — °Catarrhe avec voix rauque, sensation de fatigue dans la poitrine, gêne de la respiration et toux

avec expectoration. — **Accumulation abondante de mucosités dans la trachée-artère*, se détachant facilement par une toux légère. — Voix plus haute pour le chant, après avoir renâclé des mucosités. — **Toux provoquée par le rire, la parole et le chant, *ou par un chatouillement dans la poitrine.* — **Toux sèche, violente, ébranlante, au lit, le soir, jusqu'à minuit, ou plus violente le matin.* — **Toux excitée en se couchant du côté droit.* — **Toux, avec vomiturition et vomissement des aliments.* — **Toux avec expectoration fréquente de mucosités.* — **Expectoration, en toussant, verdâtre, douceâtre, ou jaune, salée, ou bien visqueuse et en morceaux, ou bien encore séreuse et de mucosités liquides, ou d'odeur putride.* — **Pendant et après la toux, douleur d'excoriation et élancements dans la poitrine.*

POITRINE. — **Étouffement de la respiration, la nuit, surtout en étant couché, ou le jour au moindre mouvement.* — **Dyspnée, le soir surtout, avec sensation de vacuité dans le scrobicule et angoisse qui force à desserrer les vêtements.* — **Oppression de poitrine, en marchant, et en montant.* — Râle muqueux et sifflement dans la poitrine. — En respirant profondément, sensation agréable de légèreté. — Douleur et brisement dans la poitrine. — **Pression profonde dans la poitrine comme par un fardeau.* — **Tension de la poitrine.* — **Constriction de poitrine, quelquefois le soir, avec angoisse.* — *Lancinations du côté gauche de la poitrine, en respirant, et en étant couché du côté droit.* — **Douleur d'excoriation dans la poitrine.* — **Sensation de faiblesse dans la poitrine, comme si elle était vide, surtout après avoir parlé ou expectoré.*

TRONC. — Renversement du dos, en arrière. — Lancinations dans les omoplates et la nuque. — Faiblesse des muscles de la nuque et craquement des vertèbres du cou, en secouant la tête.

BRAS. — Douleur paralytique dans l'articulation de l'épaule. — *Pesanteur paralytique dans les bras.* — Déchirement pressifs dans les muscles et les articulations des bras, des mains et des doigts. — Faiblesse et tremblement des mains. — **Gonflement des mains, surtout le soir.* — Tressaillement des mains. — *Violente sensation brûlante dans les mains.* — Petites taches rouges sur le dos des mains. — Engelures aux mains. — Contraction des doigts. — Rétraction des pouces. — Élanagements dans le bout des doigts. — Envies douloureuses aux ongles.

JAMBES. — Tractions et déchirements pressifs dans les hanches, jusqu'au-dessus du sacrum, comme aussi dans les jambes et les genoux. — *Lassitude paralytique et pesanteur des jambes.* — Fléchissement des genoux en marchant. — Roideur et tension dans le jarret. — Sensation de chaleur et sensation brûlante dans

les pieds. — Secousses déchirantes dans les malléoles, s'étendant jusqu'aux orteils. — **Gonflement des pieds*, surtout le soir. — *Gonflement rougeâtre des pieds.*

212.—STAPHYSAGRIA.

STAPH. — Staphysaigre. — HAHNEMANN. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : 3 à 4 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTE : Camph. — *On l'emploie comme antidote de* : Thui.

COMPARER AVEC : Amb. arn. coloc. con. ign. lyc. merc. mos. magn-m. phos-ac. puls. sabin. thui. — C'est surtout après thui., que staph. fait du bien, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — *Suites fâcheuses d'une contrariété, avec dépit et indignation*, ou d'un chagrin avec inquiétude; Faiblesse nerveuse par suite d'onanisme; Souffrances par abus du mercure; Affections scrofuleuses et scorbutiques; Blessures par des instruments tranchants; Affections carcinomateuses?; Inflammation, ramollissement, ulcération et autres affections des os; Éruptions croûteuses; Fièvres intermittentes, avec affections scorbutiques; Hystérie; Hypochondrie; Teigne, Prosopalgie; Blépharophthalmie; Polypes au nez et aux oreilles; Stomacace et affections scorbutiques des gencives; Odontalgie; Affections gastriques et bilieuses; Gastralgie; Dysenterie; Dysurie; Cancer de la matrice?; Goître?; Sciatique?; Coxalgie, avec tendance à la suppuration?, etc., etc.

☞ *Voy. la note, page 47.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — **Traction paralytique dans les articulations*, surtout pendant le mouvement ou une fausse position de la partie. — *Déchirements tractifs dans les muscles*, surtout en étant assis. — Lancinations aiguës, pénétrantes, profondes, à différentes parties. — Crampes dans les membres. — **Inflammations douloureuses des os.* — **Gonflement des os.* — **Paralyse semi-latérale*, après s'être mis en colère. — Accès d'évanouissement. — Sensibilité douloureuse de tous les muscles, au toucher, et des articulations en les faisant jouer. — *Courbature et lassitude excessive*, surtout pendant le mouvement, améliorées en étant assis ou couché. — Besoin continuel de rester couché. — Grande fatigue le matin, de bonne heure, avec roideur de toutes

les articulations. — Après la sieste, obnubilation, et pesanteur dans les membres.

PEAU. — Fourmillement, comme par des insectes, par tout le corps, surtout le matin. — **Éruptions miliaires, chroniques*, quelquefois avec tressaillements convulsifs la nuit. — Éruptions de nodosités pruriantes, suintantes, avec douleur brûlante. — Éruptions dartreuses, avec prurit, le soir, et sensation brûlante après s'être gratté. — **Dartres sèches, croûteuses, aux articulations.* — **Engorgement et induration des glandes.* — **Peau malade, suppurant facilement.* — **Furuncles fréquents.* — Ulcères avec élancements déchirants ou cuisson pruriente. — Tressaillement et déchirement autour des ulcères, surtout le soir et le matin.

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir le jour.* — *Pandiculations et bâillements violents*, qui font venir les larmes aux yeux. — **Sommeil tardif par affluence d'idées*, ou à cause d'un prurit et d'une sensation brûlante dans les dartres et les ulcères, ou de douleurs violentes dans les mollets. — Tressaillement des membres, en dormant. — Sommeil agité, avec rêves inquiets et réveil fréquent en sursaut. — **Rêves lascifs.*

FIÈVRE. — Frissons fréquents et horripilation, même la nuit. — **Fièvre le soir, consistant seulement en froid.* — **Fièvre tierce avec goût amer, gencives saignantes, anorexie et constipation.* — Chaleur brûlante extérieure, avec bouillonnement de sang et soif. — La nuit, chaleur ardente dans les pieds et les mains, qui force à les découvrir. — *Forte disposition à transpirer le jour*, même en étant tranquillement assis, ou bien impossibilité de transpirer, avec pâleur du visage, et mal à la tête. — **Sueurs nocturnes abondantes, quelquefois avec odeur putride.* — Sueur froide au front et aux pieds.

MORAL. — *Humeur hypochondriaque*, avec indifférence pour toute chose. — *Tristesse* avec craintes sur l'avenir. — **Pleurs et chagrin sur son état.* — **Caractère susceptible.* — Désir de la mort. — Anxiété, et agitation qui ne permet de rester nulle part. — **Mauvaise humeur, irascibilité et dépit excessif*, au point de jeter violemment tout ce qu'on a sous la main. — Éloignement pour la conversation, la méditation et pour tout travail intellectuel et sérieux. — *Faiblesse de la mémoire.* — Instabilité des idées. — *Esprit excessivement obtus*, avec impossibilité de se livrer à un travail quelconque. — Erreurs de l'imagination par des événements du passé. — Illusion, comme si tous les objets qui environnent étaient bas, et que l'on fût beaucoup plus grand.

TÊTE. — Tête confuse et embarrassée. — *Vertiges tournoyants*, quelquefois le soir, au lit, ou le jour en étant assis ou couché,

soulagés en se promenant. — Maux de tête, le matin, au réveil, comme si le cerveau était meurtri. — *Douleur étourdissante dans la tête*, alternant quelquefois avec térébration. — *Pesanteur de la tête*, surtout dans le front au-dessus de la racine du nez. — *Pression dans la tête*, tractive, déchirante ou lancinante. — Maux de tête comme si le front allait éclater, en se baissant et en se remuant. — *Douleurs de tête compressives ou expansives*. — Douleur de tête, semi-latérale, comme par un clou enfoncé dans le cerveau. — Maux de tête lancinants. — Sensation de vacillement du cerveau. — Douleurs rhumatismales et tractives à l'extérieur de la tête. — Prurit fourmillant, quelquefois aussi rongéant, au cuir chevelu, avec douleur d'excoriation. — *Production abondante de furfures avec prurit au cuir chevelu*. — **Teigne humide, fétide, avec prurit violent*. — **Chute des cheveux*.

YEUX. — Yeux, comme quand on a sommeil. — Pression dans les yeux, les paupières et les angles. — Prurit aux bords des paupières. — Prurit et cuisson mordicante dans les angles internes des yeux. — Cuisson et sensation brûlante dans les yeux, en écrivant. — Lancinations violentes dans les yeux, en les fatiguant. — **Inflammation des yeux*, qui sont entourés de boutons. — **Inflammation du bord des paupières*. — **Nodosités dans le bord des paupières*. — Grande sécheresse des yeux. — Mucosités abondantes, purulentes, sèches, dans les angles des yeux. — **Agglutination nocturne des yeux*. — Occlusion spasmodique des paupières. — Diminution de la vue. — *Vue trouble*, comme si on avait de l'eau dans les yeux. — Reflets noirs comme des éclairs, et scintillement lumineux devant les yeux. — Étincelles devant les yeux, dans l'obscurité. — Auréole autour de la lumière, le soir.

OREILLES ET NEZ. — *Élancements dans les oreilles*. — Eruption derrière les oreilles. — **Dureté de l'ouïe par un développement plus grand des amygdales*, principalement après avoir fait abus du mercure. — Tintement des oreilles. — *Nez ulcéré*, avec croûtes profondément dans l'intérieur. — Fort coryza fluent avec obturation d'un côté du nez, éternument fréquent et larmoiement. — **Coryza avec narines ulcérées*. — Obturation des fosses nasales, avec voix nasillarde.

VISAGE. — **Visage hâve, pointu, avec yeux caves, bordés d'un cercle bleu*. — **Visage bleuâtre et brunâtre*, en se mettant en colère. — **Douleur faciale pénible, pressive et battante*, depuis les dents jusque dans l'œil. — *Inflammation des os de la face*, avec élancements brûlants, ou tractions incisives et déchirements pressifs. — **Éruption faciale*, avec prurit et élancements. — *Lèvres couver-*

*tes d'ulcères et de croûtes, avec douleur brûlante. — *Gonflement des lèvres. — Luxation facile de l'articulation de la mâchoire. — *Gonflement douloureux et induration des glandes sous-maxillaires.*

DENTS. — **Odontalgie, avec gonflement des joues et des glandes sous-maxillaires. — *Odontalgie, immédiatement après le repas et la mastication, comme aussi après les boissons froides et l'introduction de l'air froid dans la bouche, la nuit ou le matin, principalement. — *Déchirements et tractions pressives dans les dents cariées, ou dans les racines de celles qui sont saines, ainsi que dans les gencives. — *Douleur rongearde dans les dents cariées. — Noircœur, ébrèchement et carie des dents. — Sensibilité douloureuse, gonflement et saignement facile des gencives. — *Nodosités et excroissances douloureuses aux gencives. — Gencives pâles, blanches, ulcérées.*

BOUCHE. — Bouche et langue couvertes de vésicules. — **Excroissances douloureuses à l'intérieur de la joue. — Ulcères dans la bouche. — Salivation. — Salive sanguinolente. — Gonflement des glandes sous la langue. — Élançements sur la langue, comme par des échardes. — Parole abattue par faiblesse des organes de la parole.*

GORGE. — *Apreté dans la gorge et grattement, avec sensation d'excoriation, en avalant et en parlant. — Déglutition continuelle, en parlant. — Sécheresse et élançements dans le palais et la gorge. — Gonflement des amygdales. — Tiraillement douloureux depuis l'arceau hyoïde jusque dans la gorge.*

APPÉTIT. — *Goût fade et aqueux, avec goût normal des aliments. — Goût amer de tous les aliments. — Goût aigre du pain. — Appétit avec insipidité des aliments. — *Faim vorace. — Boulimie, même après le repas, quelquefois avec pituites de l'estomac. — Grand désir de lait. — Le tabac a un goût piquant, et donne des pyrosis. — Appétence seulement pour les aliments liquides. — Désir excessif du vin et du tabac.*

ESTOMAC. — *Renvois, généralement à vide ou grattants. — Renvois amers, après des aliments acides. — Renvois salés et amers, après avoir mangé de la viande. — Renvois sanglotants. — Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites. — Nausées avec envie de vomir, tous les matins. — *Nausées fréquentes. — *Pression à l'estomac, comme par un fardeau, le matin, au lit. — *Tension et pression dans l'estomac, aggravées ou soulagées en mangeant, surtout du pain. — Plénitude, pression et élançements dans le scrobicule. — Douleur fouillante à l'estomac. — Tension anxieuse à travers les hypochondres, le matin, avec gêne de la respiration.*

VENTRE. — *Pression tensive dans le ventre.* — **Ventre gros*, chez les enfants. — *Traction au travers du ventre.* — *Sensation de faiblesse dans le ventre*, comme s'il allait tomber. — *Tranchées* après tous les aliments ou toutes les boissons. — *Tranchées cram-poïdes*, avec envie d'aller à la selle. — *Production abondante et incarceration de flatuosités.* — *Expulsion fréquente de vents chauds ou fétides.* — **Gonflement des glandes inguinales.* — *Hernie inguinale.*

SELLES. — **Constipation.* — *Dureté des selles.* — *Envie fréquente d'aller à la selle*, avec *évacuations peu abondantes, dures*, ou bien selles molles. — *Selles tardives sans être dures.* — *Évacuation difficile.* — **Selles dysentériques*, précédées, accompagnées et suivies de ténésme et de tranchées. — **Selles diarrhéiques*, avec *expulsion fréquente de vents fétides.* — *Évacuation involontaire d'une selle liquide.* — *Pendant la selle, tranchées brûlantes, pression et constriction à l'anus.*

URINES. — **Besoin très-fréquent d'uriner, avec émission goutte à goutte*, ou en un jet mince, d'une urine foncée. — **Émission d'urine excessivement douloureuse.* — *Émission fréquente d'une urine claire, aqueuse.* — *Émission fréquente d'une urine rouge.* — *Émission d'urine involontaire, en toussant.* — *Après avoir uriné, nouvelle envie comme si la vessie était encore pleine.* — *Sensation brûlante dans l'urèthre, surtout en urinant.*

PARTIES VIRILES. — *Excroissances molles, humides, sur et derrière le gland.* — *Inflammation des testicules*, avec *élançements brûlants*, ou *traction pressive et déchirements.* — *Exaltation prononcée de l'appétit vénérien*, avec *érections fréquentes* surtout la nuit. — *Prurit voluptueux au scrotum*, qui provoque l'éjaculation. — *Pollutions fréquentes*, même pendant la sieste. — *Après le coït, dyspnée.* — *Écoulement de liqueur prostatique, pendant une selle dure.*

RÈGLES. — *Sensibilité douloureuse des parties génitales.* — *Cuisson et prurit lancinant à la vulve.* — *Règles trop hâtives.*

LARYNX. — **Enrouement*, avec *accumulation de mucosités adhérentes dans le larynx et sur la poitrine.* — *Sensation de pression et contraction dans la fossette du cou, après s'être mis en colère, aggravée par la déglutition.* — *Apreté dans le larynx, après avoir beaucoup parlé.* — *Toux sèche, creuse, provoquée par un chatouillement dans le larynx.* — *Toux violente, avec expectoration de mucosités visqueuses, le soir, après s'être couché.* — **Toux, avec expectoration purulente, jaune, surtout la nuit.* — *Expectoration de sang, en toussant.* — *Pendant la toux, douleur dans la poitrine, comme par ulcération.*

POITRINE. — **Pression à la poitrine, avec pesanteur dans cette par-*

tie, en étant assis, soulagée en marchant. — *Oppression contractive et grande agitation dans la poitrine. — Lancinations dans la poitrine. — Douleur d'excorsiation et d'ulcération dans la poitrine. — Crampe dans le diaphragme, après s'être mis en colère. — Battement de cœur tremblotant, au plus léger mouvement, et à la moindre fatigue intellectuelle, comme aussi en écoutant de la musique, et après la sieste. — Éruption miliaire sur la poitrine, avec rougeur et prurit à la chaleur. — Éruption dartreuse sur les dernières côtes, avec prurit brûlant.

TRONC. — Douleur de brisement aux reins, ou sensation comme si l'on s'était donné un tour de reins, surtout dans le repos, et principalement la nuit et le matin. — Douleurs aux reins en se levant de son siège, ou en se retournant dans le lit. — Lancinations violentes qui remontent le dos. — Absès dans le muscle lombaire. — Pression tractive, rhumatismale, et tension dans la nuque, avec roideur. — Faiblesse des muscles de la nuque et du cou. — Éruption de boutons pruriants à la nuque. — *Gonflement des glandes au cou, à la nuque et sous les aisselles. — Lancinations sous les aisselles.

BRAS. — Pression sur les épaules. — Roideur de l'articulation de l'épaule, le matin. — Douleur ostéocope dans les bras, pendant le mouvement. — Traction pressive, paralytique, et déchirements lancinants dans les bras et les avant-bras, les épaules, les mains et les doigts. — Pression douloureuse dans l'os du bras. — Dartres sur les mains. — Torpeur du bout des doigts. — Déchirement tressaillant dans les doigts, surtout dans les bouts. — °Nodosités arthritiques aux articulations des doigts. — Crampes dans les doigts. — Mouvements convulsifs des doigts.

JAMBES. — Roideur de l'articulation coxo-fémorale, le matin. — Faiblesse douloureuse des cuisses et des jambes, et surtout de l'articulation du genou. — Douleur de brisement dans les cuisses, en marchant. — Dartres pruriantes aux cuisses et aux jambes. — Élançements tractifs dans les genoux et leurs articulations. — Tractions et déchirements pressifs sur le tibia et dans les os des pieds. — Crampes nocturnes dans les mollets et la plante des pieds. — Gonflement du cou-de-pied. — Gonflement des os du métatarse. — Prurit brûlant aux orteils, comme s'ils avaient été gelés.


213. — STRAMONIUM.

STRAM. — Pomme épineuse. — HAHNEMANN. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : 24 heures.

ANTIDOTES : Acetum. citr-ac. n-vom. tabac. acides végétaux. — *On l'emploie comme antidote de* : Merc. plumb.

COMPARER AVEC : Acon. asar. bell. bry. camph. cant. carb-v. cham. cocc. hall. hep. hyos. merc. mosch. n-vom. op. plumb. puls. rut. stann. veratr. zinc.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Convulsions, accès d'épilepsie, danse de Saint-Gui, catalepsie et autres *affections spasmodiques*, surtout à la suite d'une frayeur, ou de la respiration de la vapeur du mercure; Affections à la suite des morbilles; Fièvres typhoïdes; Imbécillité; *Delirium tremens*, surtout par l'abus de la bière; Manie; Hydrophobie; Nymphomanie des femmes en couche; Encéphalite; Hydrocéphale; Hoquet convulsif; Crampe de poitrine, etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs crampoïdes*, tractives, paralytiques dans les muscles et les articulations des muscles. — Sensation comme si les membres étaient séparés du corps. — Crampe contractive dans les membres. — *Fourmillement dans les membres*. — Contraction et extension lente des membres. — * *Accès de crampes* de diverses natures. — *Tétanos*. — Renversement du corps. — ° *Crampes et autres souffrances hystériques*. — Roideur et contractions de quelques membres. — * *Accès de roideur cataleptique* du corps, avec perte de connaissance, précédés de maux de tête, avec vertige. — *Mouvements faciles des membres*, ou grande pesanteur de ces parties. — * *Convulsions* qui ressemblent à la danse de Saint-Gui. — * *Tressaillement convulsif* des membres, avec pleurs. — * *Mouvements convulsifs et tressaillements*, surtout au toucher ou en fixant les yeux sur des objets brillants (une lumière, un miroir, ou de l'eau), ou bien apparaissant périodiquement. — ° *Convulsions*, comme dans l'épilepsie, mais sans perte de connaissance. — Accès d'évanouissement, avec ronflement. — *Tremblement des membres*. — Chancellement des membres en marchant et en se tenant debout. — *Paralysies*, quelquefois après une *attaque d'apoplexie*. — Faiblesse, avec be-

soin d'être couché. — *Suppression de toutes les sécrétions et excrétions.*

SOMMEIL. — Forte envie de dormir, le jour. — * *Sommeil profond, avec ronflement, cris et hurlement.* — *Somnolence comateuse*, avec physionomie ridiculement solennelle, au réveil. — Sommeil agité, avec rêves vifs. — * *Position agenouillée dans le lit, et sursauts au moindre attouchement, avec cris et gestes fous.*

FIÈVRE. — *Froid de tout le corps, surtout des membres*, avec frisson grelottant et tressaillement général. — Froid aux mains et aux pieds, avec rougeur de la face. — *Chaleur, avec anxiété* et rougeur des joues, ou bien avec soif et vomissements. — Chaleur à la tête d'abord, puis froid général, suivi de chaleur et de soif. — *Pouls petit, accéléré.* — *Sueurs fréquentes, abondantes*, même la nuit.

MORAL. — *Mélancolie.* — Tristesse, avec angoisse mortelle et pleurs abondants, surtout le soir, au lit. — Angoisse de conscience. — *Humeur inconsolable et irritation facile pour des vétilles.* — Grande activité et promptitude des mouvements. — Opiniâtreté et entêtement. — * *Rire aux éclats*, alternant avec emportements colériques, ou avec gémissements. — Hurlements et gémissements. — Murmures ou cris continuels. — *Fureur indomptable, envie de mordre, de donner des coups et de tuer.* — ° Tantôt grande indifférence pour les affaires, tantôt crainte d'être incapable de s'en acquitter. — * *Envie de s'enfuir.* — ° *Désir de société*, de lumière et de la clarté du soleil, parce que l'obscurité et la solitude aggravent l'état moral. — * *Après l'équinoxe d'automne, l'état moral est aggravé.* — Perte de la mémoire. — * *Émoussement de tous les sens*, et insensibilité aux influences extérieures. — * *Étourdissement*, avec agitation intérieure. — * *Délires*, généralement effrayants, *avec visions de fantômes qui font peur.* — Perte de connaissance, au point de ne plus reconnaître les siens. — Idée fixe; il semble que le corps soit coupé par moitié. — *Erreurs de l'imagination*, comme si tout ce qui entoure était très-petit, et que l'on fût très-grand et très-élevé. — * *Divagations*, avec idées extraordinaires. — * *Aliénation mentale*, avec prières et gestes pieux (prières, chants, air dévot, etc.). — * *Manie*, généralement avec *fictions inépuisables de l'imagination*, loquacité lascive, entretien avec les esprits, *importance affectée*, danses, rire, et coups ou *bouffonneries ridicules*, alternant constamment avec gestes tristes et sérieux.

TÊTE. — Ivresse et étourdissement. — *Vertige avec étourdissement et chancellement*, ou avec obscurcissement des yeux et mal de tête. — * *Mal de tête, avec obscurcissement des yeux* et dureté de l'ouïe. — Sensation pénible de légèreté et de faiblesse dans la tête. —

*Douleurs de tête pulsatives, au vertex, avec accès d'évanouissement. — *Congestion de sang à la tête*, avec chaleur. — *Renversement et mouvements convulsifs de la tête. — °On soulève souvent la tête en étant couché.

YEUX. — *Yeux rouges et gonflés*. — Pression et tension dans les yeux et les paupières. — *Inflammation du bord des paupières*. — Paupières ulcérées. — *Yeux larmoyants*. — Agglutination nocturne des yeux. — **Yeux fixes, étincelants*. — Regard vague, triste. — Paralyse et occlusion spasmodique des paupières. — Yeux convulsés. — **Pupilles dilatées* et insensibles. — *Obscurcissement de la vue*. — Cécité passagère. — *Myopie*. — Diplopie. — Vue indistincte, embrouillée. — *Amblyopie*. — Confusion des caractères, en lisant. — Erreurs de la vue; les objets semblent être de travers ou colorés. — *Illusions de la vue*.

OREILLES ET NEZ. — Il s'échappe du vent par les oreilles. — *Surdité*. — *Obturation du nez. — °Éternement spasmodique.

FACE ET DENTS. — Air d'hébétude et d'égarement, avec gestes craintifs. — *Distorsion douloureuse des traits du visage*. — Visage sillonné de rides profondes. — **Face bouffie, gorgée de sang*, quelquefois avec physionomie d'un niais. — °Rougeur circonscrite des joues. — **Face rouge foncé*, ou très-pâle. — Érysipèle d'un seul côté de la face et du nez. — Lèvres sèches et collant ensemble. — Raie jaune sur la partie rouge des lèvres. — Frémissement des lèvres. — Distorsion de la bouche. — *Grincement des dents*. — Odontalgie pulsative, comme si les dents allaient tomber.

BOUCHE. — *Sécheresse de la bouche*. — Salivation abondante. — *Écume sanguinolente à la bouche*. — Crachement de sang. — Langue gonflée, paralysée. — **Bredouillement et bégayement*. — Murmures continuels. — *Perte complète de la parole*.

GORGE. — **Constriction spasmodique de la gorge*. — *Déglutition gênée, avec élancements dans la gorge, ou avec pression dans les glandes sous-maxillaires. — **Déglutition empêchée*, quelquefois par sécheresse dans la gorge.

APPÉTIT. — Perte du sens du goût. — *Les aliments n'ont qu'un goût de sable ou de paille*. — Amertume continuelle dans la bouche, avec goût amer des aliments. — *Soif ardente*, généralement avec horreur de l'eau et de tous les liquides.

ESTOMAC. — Renvois avec goût aigre. — Vomissements aqueux, avec coliques et diarrhée. — *Vomissement de mucosités verdâtres* ou d'odeur aigre. — *Vomissement de bile verte*, après un léger exercice. — °Hoquet convulsif. — Douleur d'estomac, avec sensation cuisante ou pressive. — *Grande anxiété dans le creux de*

l'estomac, avec gêne de la respiration. — (Inflammation de l'estomac.)

VENTRE. — Ventre douloureux au toucher. — *Ventre ballonné*, dur, tendu. — Douleur de brisement dans le ventre pendant le mouvement. — Déchirements violents dans le ventre, comme si on arrachait l'ombilic. — *Crampes abdominales*, hystériques. — Gonflement des glandes de l'aîne. — Borborygmes et fermentation dans le ventre. — Expulsion abondante de flatuosités.

SELLES ET URINES. — **Constipation*. — Ténésme. — Selles fétides, d'odeur cadavéreuse. — Diarrhée avec douleurs et borborygmes dans le ventre. — Écoulement de sang coagulé par l'anus. — **Suppression de la sécrétion des urines*. — Émission d'urine goutte à goutte, avec besoin fréquent. — Émission involontaire des urines. — (Flux d'urines.)

PARTIES GÉNITALES. — Lasciveté. — Impuissance. — *Règles plus abondantes*, avec écoulement d'un sang noir, en grosses masses coagulées. — *Métrorrhagies*. — Pendant les règles, fétidité lascive du corps, grande loquacité, tiraillements dans le ventre et les cuisses. — Après les règles, sanglots et gémissements.

POITRINE. — Voix haute, criarde. — Manque d'haleine. — Respiration difficile, suspireuse. — Étouffement suffocant de la respiration. — Oppression constrictive de la poitrine. — Pression dans la poitrine provoquée par la parole. — Sensation comme si quelque chose se retournait dans la poitrine.

TRONC ET MEMBRES. — Douleur de brisement dans le dos, pendant le mouvement. — Traction et déchirement dans le dos et aux reins. — **Renversement du dos*. — **Mouvements convulsifs des bras*, par-dessus la tête. — Douleur contractive dans le bras, avec lancements aiguës dans l'avant-bras. — **Distorsion des mains*. — **Poings fermés*. — Crampes dans les mains. — **Tremblement des mains*. — Engourdissement des doigts. — *Tressaillement dans les jambes*, comme par une secousse, avec rétraction de ces parties. — Tractions dans les cuisses. — Fléchissement des jambes, en marchant. — **Tremblement des pieds*. — Crampes contractives dans les pieds.

214. — STRONTIANA.

STRONT. — Strontiane. — HARTLAUB ET TRINKS. — *Dose usitée*: 30. — *Durée d'action*:

40 jours environ dans des affections chroniques.

ANTIDOTE: Camph.

COMPARER AVEC: Merc. plat.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre un cas de *Gastralgie*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Déchirement* dans les membres et surtout *dans les articulations*, plus violent le soir et la nuit, au lit. — Immobilité des membres, d'un seul côté, comme par paralysie, le soir. — *Amaigrissement excessif*. — Tremblement des membres. — La plupart des douleurs, dont il est difficile de déterminer le siège, semblent être dans la moelle des os (?). — Les affections augmentent insensiblement jusqu'à une certaine intensité et diminuent de la même manière. — Prédominance des symptômes d'un seul côté du corps. — Au grand air, principalement à la chaleur du soleil, comme à la chaleur en général, on se trouve mieux. — Grande lassitude et abattement, le matin et le soir.

PEAU. — Tension de la peau à diverses parties, le soir, en étant au lit. — Éruption de petits boutons à diverses parties, avec prurit brûlant, surtout après avoir gratté.

SOMMEIL. — Sommeil tardif. — Tressaillement dans le corps et sursauts en s'endormant. — *Réveil fréquent la nuit*, surtout à cause d'une toux sèche. — Sommeil avec affluence de rêves fantasmatiques.

FIÈVRE. — Frissons, le matin et le soir. — Chaleur qui vient du nez et de la bouche, avec soif. — Chaleur sèche, la nuit. — *Sueur abondante la nuit*, et en découvrant un membre, douleur immédiate à cette partie. — Sueur des parties affectées.

MORAL. — Inquiétude et angoisse. — Humeur chagrine, avec disposition à s'emporter et à se mettre en colère. — Oubli excessif.

TÊTE. — Mal de tête avec nausées et vertige. — Pression pénible dans le front. — *Céphalalgie tensive*, comme si la peau était tirée vers le vertex, ou comme si tout se poussait vers le dehors. — *Mal de tête lancinant*. — Résonnement dans les tempes, le soir. — Sensation de chaleur ardente dans la tête et la face, l'après-

midi, en marchant, avec rougeur de la face, angoisse et envie de dormir.

YEUX. — Sensation brûlante dans les yeux. — Pression sur la partie supérieure du globe de l'œil. — Fort tressaillement et frémissement des paupières. — Cercles rouges et bleus devant les yeux, après les avoir frottés, avec pression comme par du sable. — Scintillement devant les yeux. — Taches vertes devant les yeux, dans l'obscurité.

OREILLES, NEZ ET FACE. — Déchirements dans les oreilles. — Bourdonnement dans les oreilles. — Frémissement d'un seul côté du nez. — Mouchement de croûtes sanguinolentes. — Rougeur de la face, avec chaleur brûlante. — Prurit à la face. — Tressaillement, déchirement et *térébration dans les pommettes*.

DENTS. — Odontalgie, avec douleur tressaillante. — Déchirement dans la racine des dents. — Arrachement dans les dents, précédé d'une accumulation abondante de salive. — Gencives gonflées, douloureuses au toucher.

BOUCHE ET GORGE. — *Sensation de torpeur* et de sécheresse de la bouche, le matin, sans absence de salive. — Apreté et sécheresse de la gorge. — Inflammation du palais, avec douleur pendant la déglutition.

APPÉTIT. — Goût de terre dans la bouche. — Forte soif, surtout de bière. — Appétence seulement pour le pain bis. — Faim après le dîner.

ESTOMAC. — Nausées, avec chaleur brûlante de la face. — Hoquet violent. — *Pression à l'estomac, avec sensation de plénitude dans le ventre, surtout après le repas.

VENTRE. — Ventre tendu et douloureusement ballonné. — Coliques dans la région ombilicale. — *Tranchées, avec diarrhée* et frissons. — Lancinations dans les flancs. — Grondement dans le ventre, avec expulsion abondante de vents très-fétides.

SELLES. — *Selles tardives, dures, noueuses*, s'évacuant seulement avec des efforts et de grandes douleurs. — *Diarrhée* d'une eau jaune, avec tranchées et pincements dans le ventre. — Sensation brûlante à l'anus, pendant et après la selle. — Douleurs des boutons hémorroïdaux du rectum.

URINES — RÈGLES. — Sécrétion d'urine diminuée. — Sécrétion plus abondante d'une urine jaune foncé. — Émission d'urine, la nuit. — *Urine pâle*, avec forte odeur d'ammoniaque. — Règles en retard, d'abord séreuses, puis en caillots.

POITRINE. — Enrouement et apreté dans la gorge, qui provoque la toux. — Toux sèche, provoquée par une irritation dans la trachée-artère, aggravée la nuit. — Dyspnée en marchant, avec ardeur

au visage. — Pression à la poitrine. — Douleur tractive dans les muscles de la poitrine. — Battement de cœur.

TRONC ET MEMBRES. — Douleur de brisement aux reins et dans le dos. — Douleur tractive dans le dos et la région lombaire. — Déchirements dans les bras, les mains et les doigts, surtout dans les articulations. — Torpeur presque paralytique des avant-bras et des mains. — Traction paralytique dans les jambes. — Tressaillement des jambes. — Tressaillements et déchirements dans les jambes, les pieds et les orteils, surtout dans les articulations. — Gonflement des pieds.

215.—SULFUR.

SULF. — Soufre. — **HAHNEMANN.** — *Dose usitée* : 0, 30. — *Durée d'action* : 35 à 40 jours (dans les maladies chroniques), et même plus longtemps.

ANTIDOTES : Acon. camph. cham. chin. merc. n-vom. puls. sep. — *On l'emploie comme antidote de* : chin. iod. merc. nitr-ac. rhus. sep.

COMPARER AVEC : Acon. amm. ant. ars. bar. bell. bry. calc. canth. caps. caus. cham. chin. coff. con. cupr. dulc. graph. ign. iod. ipec. lach. lyc. magn. magn-m. merc. natr. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos-ac. puls. rhus. sass. seneg. sep. sil. sulf-ac. veratr. — C'est surtout après : Acon. ars. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. et rhus., que le soufre est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le soufre conviennent quelquefois : Acon. bell. calc. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. sep. sil.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections principalement des personnes d'une constitution lymphatique, disposées à des éruptions, des dartres, des glandes engorgées, etc., etc., ou bien de constitution bilieuse, avec disposition aux hémorroïdes, à l'hypochondrie et à la mélancolie; ou bien encore de constitution faible et leucoslegmatique, ou épuisée, avec teint maladif, disposition aux blénorrhagies, à des refroidissements, des sueurs faciles et abondantes, des rhumes de cerveau et des diarrhées avec coliques; Souffrances par l'abus du vin, ou du mercure et d'autres poisons minéraux; Souffrances par suite d'un refroidissement au vent (courant d'air), ou dans l'eau; Souffrances périodiques et intermittentes; Arthrite et rhumatismes aigus et chroniques, avec ou sans gonflement; Arthrite vague; Arthrocace; Hydrarthre; Rhumatisme articulaire; Inflammations locales chroniques; Accès de spasme et de convulsions, même pendant la dentition; Epilepsie; Faiblesse nerveuse par suite d'onanisme, ou d'autres pertes débilitantes, ainsi que par l'excès de l'étude et des veilles prolongées; Faiblesse

musculaire, avec marche mal assurée, corps courbé, ou difficulté (pour les enfants) d'apprendre à marcher; Tremblement des membres, même chez les ivrognes; Paralytie, principalement par faiblesse; *Atrophie des enfants scrofuleux* et des personnes épuisées; Affections à la suite d'un tour de reins, ou d'autres lésions mécaniques; Ictère; *Chlorose*; Cachexie par l'abus du quinquina; *Affections hydropiques*; Suppurations; *Inflammation, engorgement et suppuration des glandes*, et autres souffrances scrofuleuses et rachitiques; Gonflement, inflammation et autres maladies des os; *Dartres miliaires et croûteuses*; *Eruptions chroniques*, éruptions après la vaccination; *Gale, et suites fâcheuses d'une gale ou de dartres répercutées*; Taches hépatiques; Sugillations et autres souffrances à la suite d'une contusion; *Taches de naissance*; Anévrismes; Verrues; Engelures; *Morbilles* et affections à la suite de cette maladie; Scarlatine (maligne) et affections provenant de la répercussion de l'éruption; Petite vérole (période d'éruption); *Inflammations érysipélateuses*; *Excoriations*; *Rhagades*; *Ulcères* (même ceux par l'abus du mercure); *Ulcères fistuleux*; Tumeurs enkystées; *Abcès*; *Somnambulisme nocturne*; Fièvres inflammatoires, avec affections gastriques et nerveuses; Fièvres typhoïdes; Fièvres intermittentes; Fièvres hectiques; Mélancolie; Exaltation religieuse et philosophique; Manie; Fatigue de la tête, ou même aliénation mentale, par excès d'étude; Hypochondrie; Hystérie; Imbécillité; Congestion cérébrale; Céphalalgies rhumatismales, catarrhales, nerveuses, etc.; *Migraine*; Céphalalgie des ouvriers en métaux; *Encéphalite?*; *Teigne*; *Chute des cheveux*, même après de graves maladies aiguës, chez les femmes en couche, par suite de fréquentes migraines, etc.; *Ophthalmies scrofuleuses, traumatiques, catarrhales, etc.*; Obscurcissement et ulcères de la cornée; *Blépharophthalmie*; Amblyopie amaurotique; Myopie; Presbyopie; Cataracte; Dureté de l'ouïe; Otorrhée purulente; Inflammation flegmoneuse du nez; *Coryza sec ou fluent, aigu ou chronique*; Hémorrhagie nasale; Érysipèle à la face; Croûte de lait et autres dartres faciales; *Éphélides?*; Cancer des lèvres?; Inflammation des gencives; Odontalgies rhumatismales ou congestives; Dentition difficile, avec disposition aux convulsions; *Aphthes dans la bouche*; Salivation par suite de l'abus du mercure; Angines catarrhales, chroniques; Souffrances gastriques; Dyspepsie avec *aigreurs, pyrosis* et vomissement des aliments; Blennorrhée gastrique; *Anorexie opiniâtre*; *Gastralgies*; *Penchant à l'ivrognerie*; Affections hépatiques chroniques; Gonflement et induration du foie; Ictère; Carreau; *Coliques spasmodiques, flatulentes et hémorrhoidales*; *Ascite*; Entérite?; Péritonite?; Hernies qui sortent facilement; *Hernies incarcérées* (après l'usage de l'aconit); *Bubons scrofuleux et mercuriels*; *Constipation opiniâtre* ou disposition à la

diarrhée; Diarrhées muqueuses; Dyssenteries; Lienteries?; Chute du rectum; affections vermineuses; *Hémorroïdes aveugles ou saignantes*; Suites fâcheuses de la suppression du flux hémorroïdal; Ischurie; Dysurie; Diabète?; Hématurie?; Incontinence d'urine chez les enfants (pissement au lit); Urétrite?; Gonorrhée secondaire; Blennorrhée de la vessie?; Fistule urinaire; Rétrécissement de l'urètre?; Inflammation et phymose du prépuce; Gonorrhée bâtarde; Induration des testicules?; Hydrocèle?; Impuissance; Faiblesse des parties génitales par suite d'onanisme; *Ménostasie*; *Dysménorrhée*; Coliques menstruelles; Métorrhagie?; Stérilité?; Abortus?; *Flueurs blanches*; Chlorose; Excoriation, inflammation et ulcération des mamelles; Induration (et cancer?) des mamelles; Excoriation, constipation, *aphthes*, et ophthalmie des nouveau-nés; *Catarrhe pulmonaire, avec enrouement*, même à la suite des morbilles; Catarrhes invétérés; Blennorrhée des poumons chez les vieillards; Grippe; Aphonie; Toux catarrhale, spasmodique, nerveuse, etc.; Coqueluche?; *Hémoptysie*, *Souffrances asthmatiques*; *Pneumonie chronique*; *Phthisie*; *Mal de poitrine à la suite d'efforts ou d'un tour de reins*; Affections du cœur; Maux de reins; Distorsion rachitique de la colonne vertébrale; *Tremblement des mains*, même chez les ivrognes; Rhagades aux mains; *Panaris*; Coxarthroscace?; Coxalgie; Luxation spontanée; *Gonite arthritique ou rhumatismale*; Tumeur blanche?; Goutte aux mains et aux pieds; Ulcères aux jambes; Inflammation érysipélateuse des pieds ou des jambes; etc., etc.

 Voy. la note, page 17.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs vives et tractives *ou *élan-
cements dans les membres*, principalement aux articulations,
et quelquefois avec manque de force, *roideur* et sensation de
torpeur dans les parties affectées. — *Douleurs de luxation, ten-
sion comme par raccourcissement des tendons, crampes et con-
traction dans plusieurs parties. — *Craquement dans les articu-
lations, principalement du coude et du genou. — *Gonflement
inflammatoire des articulations*, avec chaleur et rougeur. —
*Fourmillement dans les membres, principalement dans les mol-
lets et les bras. — **Disposition des membres à s'endormir fa-
cilement*. — *Palpitations musculaires. — *Tressaillements et
secousses dans certaines parties ou dans tout le corps, principa-
lement étant assis, ou couché. — **Accès de spasmes*. — **Con-
vulsions épileptiques*, provoquées par quelque frayeur ou en
courant, *et quelquefois avec cris, *enroissement des membres*,
serrement des dents et sensation comme si une souris parcourait

le dos ou les bras. — **Accès d'évanouissement*, ou de malaise hystérique ou hypochondriaque, quelquefois avec vertiges, vomissement et sueur. — **Tremblement des membres*, principalement des mains. — Sensation de tremblement dans l'intérieur du corps. — *Accès d'inquiétudes dans tout le corps*, qui ne permettent pas de rester assis, avec besoin d'étendre et de contracter alternativement les membres. — *Fort bouillonnement de sang*, quelquefois avec chaleur brûlante aux mains. — *Grand épuisement*, avec **grande fatigue après la moindre conversation* et la promenade la plus courte, besoin de rester toujours assis, et *sueurs abondantes*, même en étant assis, en lisant, en mangeant, en étant couché et en se promenant. — La sensation de fatigue se dissipe quelquefois par la marche. — Faiblesse musculaire, principalement dans les genoux et les bras, ainsi que dans les jambes, avec marche mal assurée. — **Marche courbé*. — *Amaigrissement extraordinaire*, quelquefois avec faiblesse, fatigue et sensation brûlante aux mains et aux pieds. — **Grande sensibilité au grand air et au vent*, avec douleurs dans les membres aux changements de temps, disposition à se refroidir facilement, et beaucoup de souffrances par l'effet du grand air. — Ce sont principalement les affections de la tête et de l'estomac qui s'aggravent au grand air. — La plupart des affections s'aggravent ou apparaissent la nuit ou le soir, ainsi que dans le repos, en restant debout, et en s'exposant au froid; elles disparaissent en marchant et en remuant la partie malade, ainsi qu'à la chaleur de la chambre; mais la chaleur du lit rend les douleurs nocturnes insupportables. — **Plusieurs souffrances apparaissant périodiquement*, ou par intermittence.

PEAU. — **Prurit à la peau*, même de tout le corps, plus violent la nuit, ou le matin, au lit, et souvent avec douleur d'excoriation, chaleur, démangeaison, ou saignement de la partie que l'on a grattée. — **Éruptions comme celles qui suivent quelquefois la vaccine*. — **Éruptions et dartres croûteuses*, de couleur jaune verdâtre, provenant de petites phlyctènes pruriteuses à auréole rouge. — *°Taches dartreuses*, rouges, irrégulières, furfuracées, ou couvertes de petites phlyctènes suintant une lymphé séreuse. — **Éruptions galeuses*. — **Éruptions miliaires*, principalement aux extrémités. — **Urticaire*. — **Prurit brûlant des éruptions*. — **Taches hépatiques*, de couleur jaune ou brunâtre. — **Inflammations érysipélateuses*, avec douleurs pulsatives et lancinantes. — *°Sugillations*, même par la plus légère contusion. — *°Rougeur vive écarlate sur tout le corps*. — Fourmillement dans la peau de tout le corps. — **Engelures rouges*, gonflées et ulcérées, avec prurit à la chaleur de la chambre. — **Verrues calleuses*, princi-

pâlement autour des doigts. — *La peau se gerce facilement, surtout au grand air; gerçures avec douleur d'excoriation. — *Desquamation et *excoriation de la peau* à plusieurs endroits. — Peau malade; les moindres lésions s'enflamment et s'ulcèrent. — **Ulcères avec bords élevés, boutons pruriteux aux environs, auréole rouge ou bleuâtre, douleurs vives, lancinantes et tensives, saignement facile et sécrétion d'un pus fétide et sanieux ou jaune et épais.* — *Chairs luxuriantes dans les ulcères. — Ulcères fistuleux. — Furoncles. — Tumeurs enkystées; ou tumeurs pâles, tendues et chaudes; abcès inflammatoires. — **Inflammation, gonflement et induration, ou suppuration des glandes.* — *Nodosités sur la peau de tout le corps, par gonflement des glandes sous-cutanées, principalement au sein. — *Inflammation, gonflement et sensibilité douloureuse des os. — *Répugnance pour les lotions.

SOMMEIL. — **Envie de dormir insurmontable, principalement après midi et le soir, aux lumières.* — *Bâillement fréquent. — *Sommeil nocturne tardif, ou insomnie, quelquefois à cause d'une grande affluence d'idées, ou comme par surexcitation.* — **Sommeil trop léger, ou agité, avec réveil fréquent, souvent en sursaut et avec effroi.* — Réveil de trop bonne heure et impossibilité de se rendormir. — **Sommeil du matin trop prolongé, quelquefois profond et comateux, avec difficulté de se lever le matin.* — **Sommeil qui ne délasse point.* — **La nuit, douleurs, inquiétudes et fourmillement dans les membres, anxiété et chaleur, coliques, gastralgie, vertiges, mal à la tête, visions et illusions des sens, battement de cœur, souffrances asthmatiques, soif et faim.* — Impossibilité de dormir autrement qu'étant couché sur le dos, la tête haute. — **En dormant, agitation et jactation, secousses dans le corps et tressaillement des membres, sursauts et effroi, paroles, cris, murmures, divagations, délires, lamentations et gémissements, ronflement, yeux à demi ouverts, coucher sur le dos, les bras sur la tête, cauchemar et somnambulisme.* — **En s'éveillant, illusion des sens, visions effrayantes et peur des revenants.* — **Rêves fréquents, fantastiques, anxieux, effrayants et horribles, fâcheux, dégoûtants et agités; rêves de feu, de chiens qui mordent, de beaux habits que l'on possède, de chutes, de périls, de morts; rêves avec pressentiment de ce qui aura lieu le lendemain.*

FIÈVRE. — **Frissonnement, froid, frisson et horripilations, principalement le soir ou la nuit, au lit, ainsi qu'après midi, et en se promenant au grand air.* — Frissons partiels, principalement au dos, à la poitrine, aux bras; froid aux mains, aux pieds et au nez. — Pendant les frissons, pâleur ou chaleur de la face, mal à

la tête, et quelquefois chaleur passagère. — *Accès fréquents de chaleur fugace. — *Chaleur, principalement la nuit ou le soir, ou le matin, ainsi qu'après midi, et souvent avec rougeur (circonscrite) des joues, soif ardente, sensation brûlante aux mains et aux pieds, frissons partiels, sueurs partielles, principalement à la tête; au visage et aux mains, fatigue et courbature dans les membres, enrouement et toux, anxiété, etc. — *Accès fébriles, tant avant qu'après midi, ou le soir, consistant en chaleur, qui est précédée de frissons et suivie ou mêlée de sueurs, ou bien en chaleur au visage, suivie de frissons. — *Pendant la fièvre, battement de cœur, délires, faiblesse, obturation et croûtes au nez, et forte soif, même avant les frissons. — *Pouls dur, accéléré et plein. — *Sueurs fréquentes et abondantes, le jour et la nuit, le soir et le matin au lit; sueur facile en travaillant; sueurs partielles, principalement à la tête, à la nuque, aux mains, etc.; sueurs acides.

MORAL. — *Mélancolie et tristesse, avec idées chagrines, inquiétude sur son sort et sur ses affaires, au point de se trouver excessivement malheureux, de se dégoûter de la vie et de désespérer même de son salut éternel. — *Grande disposition à pleurer, et pleurs fréquents, alternant quelquefois avec rires involontaires. — *Humeur inconsolable et scrupules de conscience, même pour les actions les plus innocentes. — *Accès d'angoisse, principalement le soir; caractère peureux et grande disposition à s'effrayer. — Précipitation, inquiétude et impatience. — *Mauvaise humeur, morosité, humeur querelleuse, envie de critiquer, et répugnance pour la conversation. — *Irritabilité, humeur colère, disposition à se fâcher et à s'emporter. — Grande paresse et répugnance pour tout travail de corps et d'esprit. — Indécision, maladresse, inadvertance, anthropophobie et état d'étourdissement. — Stupidité et imbécillité, avec difficulté de comprendre et de répondre juste. — *Grande faiblesse de mémoire, principalement pour les noms propres. — On oublie jusqu'à ce qu'on allait dire. — Grande affluence d'idées, pour la plupart tristes et pénibles; mais quelquefois aussi gaies et mêlées d'airs de musique. — *Grande disposition à des rêveries religieuses et philosophiques, avec idées fixes. — Divagations. — Manie, avec idée fixe d'avoir toutes choses en abondance, de posséder de beaux effets, etc. — Délires avec carpologie. — Erreurs sur les objets; on prend un chapeau pour un bonnet, un chiffon pour une belle robe, etc.

TÊTE. — *Embarras de la tête, avec méditation difficile, ou faiblesse et étourdissement et stupeur, quelquefois avec besoin de se coucher, et principalement le matin, ou le soir, ou en se pro-

menant au grand air, ou en montant. — **Vertiges et chancellement*, principalement *en étant assis*, ou après le repas, ou en se promenant au grand air, en se baissant, en marchant, *en montant*, en se levant de son siège, en étant couché sur le dos, en passant au-dessus d'une eau courante, ainsi que *le matin*, le soir ou la nuit, et souvent *avec nausées*, évanouissement, faiblesse et saignement du nez. — Mal à la tête comme par des flatuosités incarcérées, par enchifrènement, ou comme par suite de débauches. — **Sensibilité douloureuse de la tête*, et principalement du vertex, au moindre mouvement, avec douleur à chaque pas, en toussant, en se mouchant et en mâchant. — **Plénitude, pression et pesanteur à la tête*, principalement *au front* ou à l'occiput. — Tension et contraction douloureuse dans le cerveau, quelquefois avec sensation comme si la tête était serrée par un bandeau. — **Pression expansive*, comme si la tête allait éclater, principalement aux tempes. — *Douleurs vives* et tressaillantes, ou **tiraillements et élancements dans la tête*. — Sensation douloureuse, comme si le cerveau était blessé ou meurtri. — En remuant la tête, le cerveau frappe contre le crâne. — **Congestion de sang à la tête*, avec *douleurs pulsatives*, *gloussantes* et *sensation de chaleur au cerveau*. — **Fourmillement, bourdonnement, bruissement* et résonnement dans la tête. — **Les maux de tête* ne sont souvent que *semi-latéraux*, ou ils occupent le vertex, ou l'occiput, ou le *front au-dessus des yeux*, avec *besoin de froncer les sourcils*, ou de fermer les yeux, trouble de la vue, **inaptitude à la méditation*, bourdonnement des oreilles, et *nausées* avec envie de vomir. — **Maux de tête quotidiens*, périodiques et intermittents, apparaissant principalement *la nuit*, ou *le soir au lit*, ou *le matin*, ou après le repas. — **Le mouvement, la marche, le grand air et la méditation* provoquent ou aggravent souvent les maux de tête. — Prurit et boutons à la tête, principalement au front. — **Croûtes au cuir chevelu*, sèches, ou épaisses, *jaundres*, avec sécrétion d'un pus épais et fétide, mais toujours *avec fort prurit*. — **Froid à la tête*, quelquefois seulement à des parties circonscrites. — Sensibilité douloureuse *de la racine des cheveux et du cuir chevelu*, *au toucher*. — Mobilité du cuir chevelu. — **Chute des cheveux*. — **Tête penchée*, en marchant. — Prurit à la tête, avec impatience.

YEUX. — Pesanteur **et pression dans les yeux et les paupières*, avec sensation d'un frottement, comme par du sable. — Prurit, **démangeaison et sensation brûlante dans les yeux, les angles et les paupières*. — Douleurs de meurtrissure ou de plaie, et cuisson dans les yeux et les paupières. — **Les douleurs aux yeux répondent souvent jusque dans la tête*, et s'aggravent par le mouvement

des yeux, ainsi que *par la lumière du soleil*, qui les augmente quelquefois jusqu'à les rendre insupportables. — **Inflammation, rougeur et gonflement de la sclérotique, de la conjonctive et des paupières.* — **Ulcération du bord des paupières.* — *Pustules et ulcères autour des orbites, jusqu'aux joues.* — Rougeur inflammatoire de l'iris. — **Cornée trouble*, comme couverte de poussière, ou obscurcie, avec dépôt d'une lymphe grisâtre entre les larmelles. — **Taches, *vésicules et *ulcères à la cornée.* — Injection des vaisseaux de la conjonctive. — Pupille inégale, ou dilatée et immobile. — **Obscurcissement du cristallin.* — *Nodosité à la paupière, comme un orgelet.* — **Larmolement abondant, surtout au grand air; ou grande sécheresse des yeux*, principalement dans l'appartement. — Larmes huileuses. — **Sécrétion abondante de mucosités aux yeux, le jour et la nuit.* — Agglutination nocturne des paupières. — *Palpitation et frémissement des paupières.* — **Contraction matutinale des paupières.* — Tremblement des yeux. — **Trouble de la vue*, comme par un brouillard, du duvet ou *un voile devant les yeux.* — **Presbyopie.* — **Myopie.* — Obscurcissement de la vue en lisant. — Éblouissement des yeux, par la lumière du jour. — Scintillement et taches blanches, ou mouches volantes, points et taches noires devant les yeux. — Couleur jaune des objets. — **Grande sensibilité des yeux à la lumière*, principalement *du soleil*, et pendant un temps chaud et étouffant. — **Couleur jaunâtre de la sclérotique.*

OREILLES. — *Prurit aux oreilles.* — **Douleurs vives ou tractives, ou élancements dans les oreilles*, quelquefois jusque dans la tête ou dans la gorge. — Chaleur brûlante, qui sort par les oreilles. — Gargouillement dans les oreilles, comme s'il y avait de l'eau dedans. — **Écoulement de pus par les oreilles.* — Furoncle au tragus. — Sensibilité excessive de l'ouïe; le moindre bruit est insupportable, et en touchant le piano, on éprouve même des nausées. — **Dureté de l'ouïe*, principalement *pour la voix humaine.* — **Obturation et sensation d'occlusion des oreilles, d'un seul côté*, et souvent en mangeant et en se mouchant. — Tintement, **bourdonnement et bruissement dans les oreilles*, quelquefois avec congestion de sang à la tête. — Craquement dans l'oreille, comme si une vessie pleine d'eau éclatait. — **Écorchure derrière les oreilles.*

NEZ. — Térébration à la racine du nez. — Brûlement dans les narines. — **Gonflement inflammatoire du nez*, principalement au bout, ou aux ailes. — *Inflammation, ulcération et croûtes aux narines.* — Craquement dans le nez, comme si une vessie pleine d'air éclatait. — Éphélides et pores noirs sur le nez. — **Obturation du nez*, quelquefois d'un seul côté. — **Grande sécheresse du*

nez. — **Coryza seo*, ou **coryza fluent*, avec *secrétion abondante de mucosités*. — Écoulement de mucosités brûlantes, ou **secrétion d'un mucus épais, jaunâtre et puriforme*, par les narines. — **Mouchement de sang ou de mucosités sanguinolentes*. — **Saignement de nez*, principalement le matin, et quelquefois avec vertiges. — Éternument fréquent, même spasmodique, et précédé quelquefois de nausées. — Odorat exalté ou diminué, et même entièrement perdu. — Odeur d'un vieux coryza, de corne brûlée ou de fumée, dans le nez.

VISAGE. — **Face pâle* ou jaunâtre, avec *teint maladif* et yeux enfoncés, cernés de bleu. — **Chaleur et sensation brûlante au visage*, avec *rougeur foncée de toute la face*, ou *rougeur circonscrite des joues*, ou bien *taches rouges*, même au cou. — **Enflure pâle ou rouge du visage*. — Gonflement des joues, avec douleur lancinante. — Tiraillement, douleur vive, sensation de meurtrissure, *pression et sensation brûlante aux pommettes*. — **Érysipèle flegmoneux à la face*, principalement aux paupières, au nez et à l'oreille (gauche). — Rudesse et rougeur de la peau du visage. — **Éruptions boutonneuses au visage* et au front. — **Dartre pruriente et humide sur tout le visage*, principalement au-dessus du nez, autour des yeux et aux paupières; petites vésicules blanches en groupes, et formant des croûtes. — **Éphélides et pores noirs au visage*, principalement au nez, aux lèvres et au menton. — Lèvres sèches, rudes et gercées. — *Sensation brûlante et chaleur continuelle des lèvres*. — **Taches hépatiques à la lèvre supérieure*. — Tremblement et tressaillement des lèvres. — **Gonflement des lèvres*. — Ulcère croûteux sur la partie rouge de la lèvre. — Éruption dartreuse au coin de la bouche. — Éruption douloureuse autour du menton. — Douleurs vives, lancinantes et tractives, et **gonflement douloureux aux mâchoires*. — *Gonflement des glandes sous-maxillaires*, avec douleurs au toucher et élancements.

DENTS. — Grande sensibilité des dents. — Tressaillement, secousses, **douleurs vives ou tractives*, *élancements*, **douleurs pulsatives*, *térébration* et sensation brûlante, **tant dans les dents cariées que dans celles qui sont saines*. — **Les maux de dents s'étendent souvent jusqu'aux oreilles ou jusque dans la tête*, et sont quelquefois accompagnés de congestion de sang à la tête avec frissons et envie de dormir, ou de gonflement de la joue. — **Apparition ou aggravation des maux de dents, principalement le soir, la nuit, ou au grand air*, ainsi que par un courant d'air, *par l'eau froide*, en mangeant ou en mâchant, *et quelquefois aussi en prenant quelque chose de chaud. — Mucosités brunâtres aux dents. — **Vacillement douloureux*, *allongement*, *agacement*

et saignement facile des dents. — Saignement, *sensation de décollement et *gonflement des gencives*, quelquefois *avec douleurs pulsatives*. — °Tumeur dure, arrondie aux gencives, avec écoulement de pus et de sang.

BOUCHE. — Sécheresse, chaleur et sensation brûlante dans la bouche, quelquefois le matin avec langue humide. — *Accumulation de salive dans la bouche; salive sanguinolente, ou salée, ou acide ou amère.* — *Odeur fétide*, quelquefois acide, de la bouche, principalement *le matin*, ou le soir, ou *après le repas*. — Vésicules, ampoules et **aphthes dans la bouche et sur la langue*, quelquefois avec brûlement ou avec douleur d'excoriation en mangeant. — Exfoliation de la peau dans la bouche. — Sensation brûlante et démangeaison sur la langue. — *Langue sèche, rude et gercée, °couleur rouge de cinabre; ou *chargée d'un enduit blanc*, ou couverte de mucosités brunâtres, épaisses et visqueuses. — Bredouillement en parlant. — Accumulation de mucosités d'un goût salé, dans la bouche.

GORGE. — Grattement, âpreté et *sécheresse dans la gorge*. — **Pression comme par un tampon ou par une tumeur dans la gorge*, quelquefois avec difficulté d'avaler. — Sensation dans la gorge, comme si une boule y remontait. — **Contraction et sensation douloureuse de rétrécissement de la gorge*, en avalant. — Douleur d'excoriation, sensation brûlante et *élancements dans la gorge*, principalement en avalant à vide, comme si l'on avalait un morceau de viande. — Sensation comme s'il y avait un cheveu dans la gorge, avec goût empyreumatique. — Mal à la gorge, avec gonflement des glandes du cou.

APPÉTIT. — **Mauvais goût de la bouche*, le plus souvent *acide*, amer ou *putride et doucedtre*, ou fade, principalement *le matin*, en s'éveillant. — *Goût amer ou trop salé, ou insipidité des aliments. — *Absence complète d'appétit, et *dégoût des aliments*, principalement *de la viande, du pain de seigle*, de la graisse et du lait. — **Répugnance pour les choses sucrées et acides*, ou grand désir de ces choses, avec manque d'appétit. — Soif continue même la nuit, souvent avec désir de bière. — °Désir (chez les ivrognes) de boire du vin. — **Appétit excessif et accès de boulimie*, quelquefois avec mal à la tête, lassitude et besoin de se coucher. — Grande faiblesse de la digestion, principalement pour la viande, la graisse, *le lait, les acides* et les farineux, aliments qui quelquefois font beaucoup souffrir. — °Les aliments sucrés aggravent les douleurs de l'estomac et du ventre. — Le lait produit des renvois aigres, un goût acide dans la bouche et même des vomissements. — La bière a un arrière-goût très-prolongé et fait bouillonner le sang. — **Après le repas, oppression de poitrine, nau-*

sées, pression et crampes dans l'estomac, coliques, ballonnement du ventre et flatuosités, vomissement, grande fatigue, frissonnement, embarras et mal à la tête, chaleur du visage, sensation brûlante dans les mains, écoulement d'eau par la bouche et beaucoup d'autres souffrances.

ESTOMAC. — **Rapports continuels, principalement à vide, ou avec goût des aliments, *ou acides et brûlants, ou amers, ou fétides, avec goût d'œufs pourris, *principalement après le repas, ou la nuit. — *Renvois avortés. — *Régurgitation des aliments et des boissons, souvent avec goût acide. — *Pyrosis, souvent avec brûlement et fourmillement dans la poitrine. — *Hoquet. — *Nausées, quelquefois jusqu'à la défaillance, avec tremblement, faiblesse et rapports fréquents, principalement *après le repas, le matin, la nuit, ou *en allant en voiture. — *Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, principalement le matin ou après le repas, quelquefois avec pression et fouillement dans le ventre. — *Vomituration et vomissements, tant des aliments que de matières acides ou amères, ou noirâtres, ou sanguinolentes, etc., principalement le matin, le soir, *après le repas, ou la nuit, et quelquefois avec nausées, douleurs à l'estomac et sueur froide au visage. — Pesanteur et plénitude, ou pression et compression, ou bien douleurs contractives et crampoides, ou fouillement et élancements dans l'estomac et la région précordiale, *principalement après le repas, la nuit, ou le matin, *souvent avec nausées et vomissement, anxiété et ballonnement du ventre. — Sensation de froid, ou chaleur et sensation brûlante dans l'estomac. — Grande sensibilité de la région de l'estomac au toucher. — Gonflement de la région précordiale. — Pulsation dans le creux de l'estomac. — Gonflement du creux de l'estomac.*

VENTRE. — Sensibilité douloureuse des hypochondres, comme s'il y avait une plaie intérieure. — Tiraillement, *pression, tension et élancements dans la région du foie et de la rate, *gonflement et dureté de la région du foie, *et de celle de la rate. — Plénitude, *pesanteur, tension et pression comme par une pierre, dans le ventre, et principalement à l'épigastre et aux hypochondres. — Grosseur et dureté du ventre. — Tranchées, ou *sensation de déchirement, ou douleurs contractives et crampoides dans le ventre. — *Élancements dans le ventre, principalement du côté gauche, en marchant ou en respirant profondément. — Les maux de ventre affectent en général le côté gauche de préférence, ou ils s'étendent jusqu'à l'estomac et jusqu'à la poitrine et le dos, avec gêne de la respiration, nausées, anxiété et humeur hypochondriaque. — *Maux de ventre, principalement la nuit, ou après avoir bu ou mangé, *ou bien périodiques; aggravation par

des aliments sucrés; **soulagement en se tenant courbé.* — Mouvement et fouillement dans le ventre, ou sensation comme si quelque chose poussait en dehors. — Douleurs de contusion et de meurtrissure dans les téguments du ventre. — *Sensibilité douloureuse du ventre au toucher, comme si en dedans tout était à vif ou en une large plaie. — *Ballonnement du ventre avec *douleurs pressives par des flatuosités incarcérées*, principalement du côté gauche. — **Borborygmes et grondement dans le ventre.* — Sortie fréquente de vents d'une odeur très-fétide. — *Gonflement douloureux et même suppuration des glandes inguinales. — **Sortie violente des hernies, avec incarcération.*

SELLES. — *Constipation et selles dures, noueuses et insuffisantes.* — **Envie fréquente et souvent inutile, d'aller à la selle*, principalement la nuit, et quelquefois avec pression sur le rectum et la vessie, et douleur à l'anus. — Envie urgente d'aller à la selle. — **Diarrhées avec évacuations fréquentes*, principalement la nuit, et souvent avec coliques, ténésme, ballonnement du ventre, dyspnée, frissonnement et faiblesse au point de s'évanouir. — **Évacuations muqueuses ou aqueuses, ou écumeuses, ou acides, ou d'odeur putride, ou de matières non digérées.* — **Selles blanchâtres, verdâtres, décolorées, ou d'un rouge brunâtre.* — **Selles involontaires.* — **Selles avec mucosités, sang, et matières purulentes.* — Sortie de mucosités, même avec des selles dures. — Sortie de lombrics, d'ascarides, et même de morceaux de ténia, du rectum. — **Chute du rectum*, principalement pendant des selles. — Douleurs vives et pressives, *prurit, élancements et brûlement à l'anus et dans le rectum*, même hors le temps des selles. — **Hémorroïdes* qui sortent, suintent et saignent. — Écorchure et gonflement de l'anus.

URINES. — **Urines supprimées ou très-rares.* — **Envie d'uriner fréquente* et quelquefois très-urgente. — *Urines fréquentes, abondantes et aqueuses*, partant quelquefois avec beaucoup de force, même la nuit. — Émission involontaire des urines, principalement en toussant ou en expulsant des vents. — **Pissement au lit.* — **Urines rouges avec sédiment, ou bien blanchâtres, ou troubles, ou foncées.* — Pellicule huileuse sur les urines. — Urines fétides. — Sédiment farineux, blanchâtre, ou épais, ou rougeâtre, dans les urines. — **Évacuation douloureuse de quelques gouttes d'urine sanguinolentes avec beaucoup d'efforts.* — **Sortie de sang et de mucosités avec les urines.* — Prurit, douleurs vives, *élancements et sensation brûlante dans l'urèthre*, principalement en urinant. — Rougeur et inflammation de l'orifice de l'urèthre, et douleur comme au début d'une gonorrhée. — **Écoulement de mucosités par l'urèthre.* — *Élancements dans la vessie.* — Jet d'urine mince

[illegible]

ment le soir, ou la nuit, dans la position couchée, ou le matin, ou après le repas. — **Toux humide, avec expectoration abondante de mucosités épaisses, blanchâtres ou jaunâtres, comme celles d'un vieux coryza.* — **Crachats fétides, d'un jaune verdâtre, comme du pus, et d'un goût salé ou douceâtre, en toussant.* — **Toux fébrile, avec crachement de sang.* — **En toussant, douleur d'excoration ou élancements dans la poitrine, douleurs de meurtrissure ou élancements dans la tête, mal au ventre, obscurité devant les yeux, douleurs dans les hanches et aux reins.* — La respiration et la conversation provoquent quelquefois la toux.

POITRINE. — **Haleine courte, étouffements fréquents, gêne de la respiration, dyspnée et accès de suffocation, principalement la nuit en étant couché et même pendant le sommeil, ainsi que, quelquefois, en parlant ou en se promenant au grand air.* — Impossibilité de respirer profondément, avec sensation comme si la poitrine était contractée. — Respiration fréquente, courte, ou sibilante. — **Ronflement et râle muqueux dans la poitrine.* — En respirant, élancements dans le dos et le sacrum. — **Sensation douloureuse dans la poitrine, comme si quelque chose tombait contre les parois antérieures, en se retournant dans le lit.* — **Gêne douloureuse dans le côté gauche de la poitrine, avec angoisse et impossibilité de se coucher sur le côté affecté.* — **Pesanteur, plénitude, et pression comme par une pierre, dans la poitrine et le sternum, principalement le matin, ainsi qu'en toussant, en éternuant et en bâillant.* — Douleur en toussant et en éternuant, comme si la poitrine allait éclater. — **Spasmes périodiques de la poitrine, avec sensation de constriction, douleurs crampoïdes, haleine courte, couleur bleuâtre du visage et impossibilité de parler.* — Pulsations dans la poitrine et le sternum. — **Faiblesse de la poitrine, sensible surtout en parlant, avec grande fatigue des poumons après avoir parlé ou chanté.* — **Élancements dans la poitrine ou le sternum, ou jusque dans le dos, ou dans le côté gauche, principalement en toussant, en respirant profondément et en levant les bras.* — **Il semble que les douleurs de la poitrine affectent le côté gauche de préférence.* — Sensation de froid, ou **brûlement dans la poitrine, quelquefois jusqu'au visage.* — Élancements et coups dans la région du cœur. — **Forte congestion de sang vers la poitrine et le cœur, quelquefois avec bouillonnement dans la poitrine, malaise, défaillance, et tremblement des bras.* — Sensation de vide dans la région du cœur, ou pression et sensation comme si le cœur n'avait pas assez de place. — **Battement de cœur fréquent, quelquefois même visible et avec anxiété, principalement en montant.*

TRONC. — *Douleur de meurtrissure au thorax*, au toucher. — **Faiblesse et douleurs de luxation ou de meurtrissure aux reins* et dans le dos, principalement en marchant et en se levant de son siège. — **Douleur dans le dos après un travail manuel.* — *Élancements aux reins, dans le dos* et les omoplates, quelquefois avec gêne de la respiration. — **Douleurs vives et rhumatismales, tiraillement, tension, et roideur dans les reins*, le dos et la nuque. — Pincement et sensation brûlante entre les omoplates. — °*Distorsion de la colonne vertébrale.* — Dartre à la nuque. — Gonflement et inflammation des glandes de la nuque et de celles du cou. — Sueur fétide des aisselles. — Gonflement et suppuration des glandes axillaires.

BRAS. — Pression sur les épaules, comme par un poids. — **Tressaillement des épaules, des mains et des doigts.* — **Tiraillement, douleurs vives et élancements dans les articulations* et les muscles des bras, des mains et des doigts, ainsi que *dans les épaules*, et principalement *la nuit*, au lit. — Crampes nocturnes aux bras. — **Fourmillement aux bras, et aux doigts.* — **Gonflement des bras*, °quelquefois avec *chaleur*, dureté et douleurs lancinantes ou tensives. — Exostose au bras. — Verrues au bras, °ou miliaire pruriant, °ou taches rouges, brûlantes, apparaissant après les lotions. — Vésicules purulentes dans le pli du coude. — **Faiblesse paralytique des bras et des mains.* — Craquement au coude. — **Gonflement des mains et des pouces.* — Roideur et douleur de luxation dans les articulations des mains et des doigts. — **Tremblement des mains*, principalement en s'occupant de travaux fins. — Contraction involontaire des mains, comme pour saisir quelque chose. — Froid aux mains et aux doigts. — **Sueur aux mains*, et entre les doigts. — Éruption de petits boutons rouges aux mains et aux doigts, avec prurit. — °*Verrues aux doigts.* — Desquamation, sécheresse et *gerçure de la peau des mains.* — Crampes et tressaillement dans les doigts. — Raccourcissement des tendons des mains et des doigts. — **Gonflement volumineux et luisant des doigts.* — **Doigts morts.* — °*Nodosités aux doigts.* — Envies aux ongles. — Engelures aux doigts, avec prurit à la chaleur. — °*Gonflement et inflammation du bout des doigts*, avec ulcération sous-cutanée et douleurs nocturnes térébrantes et pulsatives.

JAMBES. — Douleur d'ulcération sous-cutanée aux fesses, et aux tubérosités sciatiques, principalement au toucher et en restant longtemps assis. — Tumeurs purulentes et douloureuses aux fesses. — Douleur de luxation et de meurtrissure à la hanche, au moindre mouvement, *avec élancements à chaque pas.* — °*Mal à la hanche*, avec raccourcissement de la jambe. — **Douleurs vives et tractives*

aux jambes, principalement la nuit, au lit. — **Pesanteur des jambes*, quelquefois, avec tension dans les cuisses et les genoux, principalement la nuit. — Taches rouges, suintantes et douloureuses à la face interne des cuisses. — **Tension dans les jarrets, comme par raccourcissement des tendons*. — °*Gonflement volumineux et luisant du genou*, avec roideur et courbure. — **Craquement, tiraillement, douleurs vives et élancements dans les genoux*. — Dartres aux jarrets. — **Agitation dans les jambes et les pieds*. — Torpeur et engourdissement des jambes. — Fatigue douloureuse et **faiblesse paralytique des jambes*, principalement des genoux, qui fléchissent fréquemment. — **Taches rouges et miliaire pruriantes aux jambes*. — °*Gonflement transparent des jambes*. — °*Érysipèle à la jambe et au pied*. — **Taches bleuâtres et veines gonflées ou variqueuses aux jambes*. — Douleur aux mollets en marchant. — *Crampes aux mollets et à la plante des pieds*, principalement la nuit. — Sensibilité douloureuse de la plante des pieds en marchant. — Luxation facile du pied en marchant. — Roideur et douleur de luxation au cou-de-pied. — **Fourmillement dans les jambes et les mollets*. — °*Ulcères brûlants et invétérés aux jambes ou aux pieds*. — Dartre à la malléole. — **Élancements dans les pieds*. — **Froid aux pieds*, principalement le soir au lit, ou sensation brûlante, principalement à la plante des pieds. — **Sueur des pieds, qui sont froids*. — Gonflement des pieds, surtout aux malléoles. — **Engelure aux pieds et aux orteils*. — Vésicules rongeantes à la plante des pieds. — Ulcère au cou-de-pied. — Crampes et contraction des orteils. — °*Froid et roideur des orteils*. — **Fourmillement au bout des orteils*. — **Gonflement volumineux et luisant des orteils*. — Vésicules ulcérées et rongeantes aux orteils. — Cors avec douleurs pressives ou lancinantes.

216.—SULFURIS ACIDUM.

SULF-AC. — Acide sulfurique. — HAHNEMANN. — Dose usitée : 3, 20, 30. — Durée d'action : 4 à 5 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Puls.°

COMPARER AVEC : Ammon. *arn.* con. *dig.* mur-ac. nitr-ac. phos-ac. *puls.* rut. sulf. — C'est surtout après *arn.*, que sulf-ac. est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après l'acide sulfurique, convient quelquefois : *Puls.*

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Écorchures ; Suites fâcheuses de lésions mécaniques, blessures, con-

tusions, etc.; Fièvres typhoïdes; Ophthalmies chroniques; Aphthes des enfants; Hémoptysie; etc., etc.

☞ Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement dans tout le corps, et même à la face. — Crampes dans les membres. — Douleurs sensibles pendant le sommeil. — *Douleurs qui augmentent, puis disparaissent subitement*, généralement comme par une pression sourde. — Souffrances icériques. — Soubresauts des tendons. — Apparition ou exacerbation des symptômes, le matin ou le soir. — On semble se trouver plus mal au grand air. — Le côté gauche semble être plus particulièrement affecté. — Lassitude dans tout le corps, avec sensation de tremblement.

PEAU. — Prurit sur tout le corps. — Taches rouges, pruriantes à la peau, *ou petites taches rouges, livides et bleuâtres, comme par ecchymose. — °Excoriation de la peau, même avec ulcération semblable à la gangrène. — Furoncles. — Rongement dans les ulcères. — Engelures. — Cors aux pieds, avec déchirements et élancements. — Verrues.

SOMMEIL. — *Sommeil tardif* et réveil de bonne heure. — Insomnie par surexcitation morale. — Tressaillements pendant le sommeil. — Rêves anxieux. — Tressaillement des doigts pendant le sommeil.

FIÈVRE. — Prédominance de la sensation de chaleur. — Pouls petit, faible. — Sueur au moindre mouvement. — Sueur matutinale, abondante.

MORAL. — Abattement mélancolique. — Besoin de pleurer. — Appréhensions anxieuses et méfiance. — Agitation, précipitation et impatience. — Humeur irritable, fatigue nerveuse, et disposition à s'effrayer. — *Morosité* chagrine et éloignement pour la conversation. — Dégoût de la vie. — Sérieux, alternant avec humeur par trop bouffonne. — Distraction excessive. — Esprit obtus.

TÊTE. — Tête entreprise d'un seul côté, comme si elle contenait de la fumée. — Vertige, en étant assis, se dissipant au grand air. — *Maux de tête, qui augmentent d'abord, puis disparaissent subitement.* — Sensation de faiblesse dans la tête. — Céphalalgie, comme si le cerveau était déchiré. — Maux de tête pressifs. — Sensation de pesanteur et de plénitude dans le cerveau, comme si la tête allait éclater. — Sensation de constriction dans la tête. — *Secousses et coups dans la tête.* — *Maux de tête, avec lancements sourdes ou tractions et déchirements.* — *Sensation de vacillement du cerveau.* — Sensation d'ulcération à l'extérieur de la tête. —

Prurit et éruption au cuir chevelu. — Grisonnement et chute des cheveux.

YEUX. — Pression brûlante dans les yeux, au grand air, ou en fixant les yeux sur un objet, dans l'appartement. — Tension dans les paupières, le matin. — Cuisson, sensation brûlante dans les yeux, et larmoiement, surtout en lisant. — Yeux rouges, avec photophobie. — **Inflammations chroniques des yeux.* — Difficulté d'ouvrir les paupières. — Myopie.

OREILLES. — Déchirement dans les oreilles. — Dureté de l'ouïe, comme s'il y avait un bandeau sur les oreilles. — Sonnerie devant les oreilles. — *Bourdonnement d'oreilles*, le soir.

NEZ. — Épistaxis, le soir. — *Coryza sec, avec perte de l'odorat.* — Écoulement d'eau par le nez, avec obturation d'une narine.

VISAGE. — Pâleur du visage. — Douleur de contusion dans les pommettes. — Déchirement dans les os de la face. — Sensation de gonflement du visage, et comme s'il était enduit de blanc d'œuf desséché. — Lèvres gercées et qui s'exfolient. — Douleur d'excoriation aux commissures des lèvres. — Inflammation et gonflement des glandes sous-maxillaires.

DENTS. — *Odontalgie*, plus violente le soir, au lit, aggravée par le froid, soulagée par la chaleur, généralement avec déchirement, creusement ou rongement. — *Dents émoussées.* — Gonflement et saignement facile des gencives. — Ulcères aux gencives.

BOUCHE ET GORGE. — **Aphthes dans la bouche.* — Sensation de sécheresse dans la bouche. — Langue sèche. — *Salivation abondante.* — Crachement de sang. — Mal de gorge, pendant la déglutition, avec douleur lancinante, surtout le soir. — *Aprété dans la gorge.*

APPÉTIT. — Goût putride. — Le pain a un goût amer, et pèse sur l'estomac. — Boulimie, avec grondement et borborygmes dans le ventre. — Appétence pour les fruits (les prunes). — Après le repas, agitation, tranchées et fouillement dans le ventre, ou fort ballonnement de l'estomac. — Immédiatement après des aliments chauds, sueur froide. — Lassitude et flatuosités, après avoir pris du lait. — Toutes les boissons refroidissent l'estomac, si l'on y ajoute des spiritueux.

ESTOMAC. — *Renvois à vide ou amers.* — Régurgitations acides, amères, ou salées, ou bien douceâtres. — *Pyrosis.* — Nausées dans l'estomac, avec frisson. — *Vomissements d'eau* d'abord, puis des aliments. — Sensibilité très-douloureuse de la région de l'estomac. — Plénitude et pression dans l'estomac. — *Serrement dans l'estomac, le soir*, comme par un refroidissement. — Contraction dans l'estomac et le scrobicule. — Tranchées autour de l'estomac. — Sensation de froid ou brûlement dans l'estomac.

VENTRE. — *Élancements à la rate.* — Élancements dans la région hépatique. — Élancement dans les lombes. — *Coliques abdominales, comme les douleurs d'enfantement*, jusque dans les hanches et les reins. — Mouvements, *tranchées et pincements dans le ventre*, quelquefois *la nuit*. — Sensation de chaleur dans la région ombilicale. — Tressaillement dans toute l'étendue du bas-ventre, surtout à la superficie. — Battement, déchirements et élancements dans les aines. — Cuisson dans la région de l'aine. — **Hernie inguinale très-saillante.* — Colique flatulente dans le bas-ventre, avec *grondement et borborygmes*, et sensation comme si une descente allait avoir lieu.

SELLES. — *Ténésme.* — Selles retardées, dures, noueuses et noires. — Selles d'un moule très-volumineux. — **Relâchement chronique du ventre.* — Selles diarrhéiques de la consistance de la bouillie, verdâtres, aqueuses. — Diarrhée, seulement de mucosités écumeuses, avec sensation brûlante dans le rectum. — Évacuations de mucosités striées de sang. — Selles hachées (chez les enfants). — *Selles d'odeur putride, très-fétides.* — Écoulement de sang pendant la selle. — Congestion sanguine au rectum. — Boutons hémorroïdaux de l'anüs avec élancements, sensation brûlante, prurit et suintement.

URINES. — *Diminution de la sécrétion des urines*, avec sensation brûlante, en urinant. — Émission d'urine, la nuit. — Urine aqueuse, comme si elle contenait de la terre. — Sédiment muqueux dans les urines. — Sédiment comme du sang dans les urines, qui sont recouvertes d'une pellicule fine. — Douleurs dans la vessie, quand le besoin d'uriner n'est pas immédiatement satisfait.

PARTIES GÉNITALES. — Forte chaleur des parties génitales et des testicules. — Écoulement de sperme, sans sensation voluptueuse. — Forte disposition au coït, par irritation des parties génitales externes (chez la femme). — **Règles trop hâtives et trop abondantes.* — **Règles de trop longue durée.* — Métorrhagie. — Avant les règles, cauchemar. — Pendant les règles, lancinations dans le ventre et le vagin. — *Stérilité*, avec règles trop hâtives et trop abondantes. — *Leucorrhée* âcre ou brûlante, ou comme du lait. — Écoulement de mucosités sanguinolentes par le vagin.

LARYNX. — *Enrouement*, avec sécheresse et **âpreté dans la gorge et le larynx.* — Douleur dans le larynx, avec parole embarrassée, comme si les parties étaient trop peu souples. — *Toux provoquée par le grand air.* — *Toux sèche*, courte, haletante, quelquefois le matin, après le lever. — *Toux grasse*, avec expectoration muqueuse. — **Toux, avec crachement de sang.* — Après la toux, renvois ou régurgitation des aliments.

POITRINE. — **Dyspnée.* — Grande faiblesse de la poitrine, avec parole difficile. — Pression dans le côté gauche de la poitrine et dans le scrobicule. — *Lancinations dans la poitrine.* — Battement de cœur. — Lancinations à travers le cœur.

TRONC. — Sensation d'excoriation et de brisement dans le dos et les reins. — Traction dans le dos et les reins. — Furoncles au dos. — Roideur du dos, le matin. — Sensibilité douloureuse et gonflement des glandes axillaires.

BRAS. — Pesanteur des bras. — Contractions crampoïdes, paralytiques, dans les bras. — Élançements dans l'articulation de l'épaule, en levant le bras. — Douleur tensive dans l'articulation des coudes. — Taches bleuâtres sur les avant-bras, comme par ecchymose. — Crampes dans les mains. — Secousses et coups dans les os de la main, en écrivant. — Éruption sur les mains et entre les doigts. — Lancinations dans les articulations des doigts. — Engelures aux doigts.

JAMBES. — Pesanteur des jambes. — Torpeur et engourdissement des jambes. — Besoin d'étendre et d'étirer les jambes. — Déchirement dans les varices des jambes. — Faiblesse douloureuse des genoux, avec lancinations sourdes, secousses et coups dans ces parties. — Taches rouges, pruriantes sur le tibia. — Roideur des malléoles. — Froid aux pieds. — Gonflement des pieds. — Déchirement et lancinations dans les cors aux pieds.

217. — TABACUM.

TAB. — Tabac. — **HARTLAUB ET TRINKS.** — *Dose usitée : 30.* — *Durée d'action ?*
ANTIDOTES : Camph. ipec. n-vom. — *On l'emploie comme antidote de :* Cic. stram.

COMPARER AVEC : Acon. ars. bell. cham. cin. coec. con. hell. hyos. ipec. n-vom. op. stram. veratr.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs pressives, avec agitation dans tout le corps, et sueur anxieuse. — *Crampes et fourmillement dans les membres.* — *Amaigrissement excessif.* — Faiblesse paralytique et douloureuse des membres. — *Tremblement des membres.* — Grande lassitude générale. — Tressaillements dans tout le corps, avec pulsation et battement de cœur. — On se trouve mieux au grand air.

PEAU. — Prurit à la peau, comme par des piqûres de puces. — Éruption de boutons pruriants, ou de vésicules, avec sérosités jaunâtres et auréole rouge.

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir, surtout après le repas et vers le*
 1^{re} Part. — T. II.

soir, avec bâillements fréquents. — Sommeil tardif le soir, et difficulté de se réveiller, le matin. — Sommeil agité la nuit, avec frayer. — Cauchemar, en dormant.

FIÈVRE. — *Froid et frisson*, quelquefois avec claquement des dents. — Accès fréquent d'horripilation, quelquefois avec chaleur fugace. — Horripilation permanente, depuis le matin jusqu'au soir. — Sueur nocturne.

MORAL. — Mélancolie sombre. — *Angoisse et inquiétude*, généralement après midi, soulagées par des pleurs. — *Agitation qui pousse de côté et d'autre*. — Éloignement pour le travail et la conversation. — Surexcitation et gaieté exaltée, avec chants, danse et grande loquacité. — Affluence d'idées confuses.

TÊTE. — *Vacuité et embarras dans la tête*. — Étourdissement. — *Vertige, souvent au point de faire perdre connaissance*, avec nausées et douleurs dans la tête et les yeux. — *Céphalalgie avec nausées et vertige*. — *Pesanteur excessive de la tête*. — Maux de tête pressifs, surtout au-dessus des yeux, au vertex et dans les tempes. — *Élancements dans la tête*. — *Congestion de sang à la tête*, avec *chaleur intérieure* et battement dans les tempes. — *Amélioration des maux de tête au grand air*. — Sensation brûlante et fourmillement à l'extérieur de la tête. — Tremblement de la tête.

YEUX. — Douleur dans les yeux, comme après avoir beaucoup pleuré. — *Pression dans les yeux*, jusque dans le fond des orbites. — Sensation comme si on avait un cheveu dans l'œil. — Cuisson dans les yeux. — *Chaleur et sensation brûlante dans les yeux*, avec rougeur. — *Contraction des paupières*. — Perte de la vue en regardant fixement quelque chose de blanc. — *Trouble de la vue, le soir, comme à travers un voile*. — Scintillement et points noirs devant les yeux. — Photophobie.

OREILLES ET NEZ. — *Élancements dans les oreilles*, surtout au grand air, et en entendant de la musique. — Chaleur brûlante et rougeur des oreilles. — Tumeur dure, rougeâtre, derrière l'oreille, avec élancements. — Sensation brûlante et fourmillement dans le nez. — *Diminution de l'odorat*, qui cependant est très-sensible à l'odeur du vin. — Éternument fréquent. — Sécheresse et obturation du nez.

VISAGE. — *Pâleur mortelle du visage* (pendant les nausées). — *Chaleur ardente de la face*, avec rougeur quelquefois d'une seule joue, et pâleur de l'autre. — Taches rouges à la face. — Déchirements dans les os du visage. — Tubérosités granuleuses sur les joues. — Amaigrissement du visage. — Lèvres sèches, brûlantes, âpres et gercées. — Éruption aux commissures des lèvres. — Lancinations dans l'articulation de la mâchoire, en riant.

DENTS. — *Odontalgie, avec douleurs tractives et déchirantes.* — Lancinations dans les dents cariées, en mâchant. — Douleur tractive dans les gencives.

BOUCHE ET GORGE. — Sécheresse de la bouche et de la langue, avec forte soif. — Gonflement des glandes sous la langue. — Parole faible, entrecoupée. — Lecture traînante, monotone. — Apreté, sécheresse et grattement dans la gorge, comme par un corps étranger. — *Accumulation de mucosités visqueuses dans la gorge.*

APPÉTIT. — Goût fade et pâteux, ou amer et aigre. — Goût acide de tous les aliments. — Goût acidulé de l'eau, comme si elle contenait du vin. — Absence de soif et *horreur de l'eau.* — Absence de faim et d'appétit. — Faim continuelle, avec nausées, si on ne la satisfait pas.

ESTOMAC. — *Renvois fréquents, à vide et bruyants.* — Renvois aigres, brûlants. — Pyrosis. — *Hoquet spasmodique.* — *Nausées fréquentes, surtout pendant le mouvement, souvent au point de s'évanouir, avec pâleur mortelle du visage, se dissipant généralement au grand air.* — Nausées, avec envie de vomir, sensation de froid dans l'estomac, ou pincements dans le ventre. — *Vomissement d'eau seulement, avec reflets jaunes et verdâtres devant les yeux.* — *Vomissements de sérosités acides, souvent mêlées de mucosités.* — Les vomissements sont renouvelés par le plus léger mouvement. — Pression à l'estomac. — *Crampes d'estomac, serrantes, contractives, quelquefois après le repas, accompagnées souvent de nausées et d'accumulation de salive dans la bouche.* — *Élancements dans le scrobicule, jusqu'au travers du dos.* — Laxité et sensation de froid ou de brûlement dans l'estomac.

VENTRE. — Douleur hépatique, en pressant sur la partie. — Pression dans la région hépatique, comme par un corps pesant. — *Élancements dans la région hépatique.* — Élancement dans l'hypochondre gauche. — Grande sensibilité du ventre au plus léger contact. — Ballonnement douloureux du ventre. — Maux de ventre pressifs, surtout dans la région ombilicale, avec rétraction crampoïde de cette partie. — Déchirements nocturnes dans le ventre. — Pincements et *borborygmes dans le ventre.*

SELLES. — Constipation. — Ténésme fréquent. — Selles molles de la consistance de la bouillie, même la nuit. — *Diarrhées violentes, fétides, ou vert jaunâtre, même la nuit, accompagnées et suivies de ténésme violent et de sensation brûlante à l'anus.*

URINES. — Urines rouge jaunâtre et plus abondantes. — Inflammation de l'orifice de l'urèthre.

PARTIES GÉNITALES. — Érections fréquentes. — Écoulement de liqueur prostatique. — Règles en retard et plus abondantes. — Leucorrhée comme de l'eau sanguinolente.

LARYNX. — *Toux sèche, provoquée par un chatouillement dans la gorge, le matin et vers le soir. — Toux avec hoquet, au point de suffoquer.*

POITRINE. — *Oppression de poitrine, avec angoisse. — Constriction de poitrine. — Pression sur la poitrine et le sternum. — Élançements dans la poitrine et les côtés de la poitrine, quelquefois en respirant. — Douleur d'excoriation dans la poitrine pendant le repas. — Battements de cœur, en étant couché du côté gauche. — Boutons pruriants sur la poitrine.*

TRONC. — *Douleurs contractives aux reins, surtout après la selle. — Amaigrissement du dos. — Éruption rouge, pruriente, au dos. — Roideur du cou.*

BRAS. — *Faiblesse douloureuse des mains et des bras, qui sont comme paralysés. — Besoin continuel de s'étirer les bras. — Élançements et tractions dans les épaules. — Taches rouges, brûlantes au toucher, sur l'épaule. — Tension dans le bras, surtout dans le coude. — Douleur et élançements dans le bras, qui ne permettent ni de s'en servir, ni de l'étendre. — Tremblement des mains. — Sueur froide aux mains. — Crampes et fourmillement dans les doigts. — Gonflement des doigts. — Boutons pruriants aux doigts.*

JAMBES. — *Douleur brûlante dans le genou et la plante des pieds. — Élançement dans le genou et le jarret. — Fléchissement des genoux, en marchant. — Crampe et fourmillement dans les yeux et jusque dans les orteils. — Tension dans la jambe, en marchant, depuis le genou jusque dans le pied. — Tremblement et faiblesse paralytique des pieds.*

218. — TANACETUM VULGARE.

TANAC. — Tanaisie commune. — Médicament encore très-peu connu.

SYMPTOMES. — *Mobilité excessive, avec mouvements extraordinaires, attitudes et gestes extravagants, et rétraction violente des pieds et des jambes, sans aucune douleur.*

249.—TARAXACUM.

TAR. — Pissenlit, Dent-de-lion. — HAHNEMANN. — Doses usitées : 0, 30. — Durée d'action : ?

ANTIDOTES : Camph.?

COMPARER AVEC : Con. kal. n-vom. puls. spig. valer.

CLINIQUE. — On a recommandé ce médicament contre des *Affections gastriques* et une sorte de *Céphalalgie*. Le médecin homœopathe, en étudiant les symptômes suivants, verra dans quels cas il pourra faire usage de ce médicament.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Sensibilité douloureuse de tous les membres, surtout au toucher et dans une fausse position. — Sensation de faiblesse et de malaise dans tout le corps, avec besoin continu d'être assis ou couché. — Presque tous les symptômes paraissent en étant assis et se dissipent par la marche. — *Forte envie de dormir, le jour*, avec bâillements fréquents. — Sommeil avec affluence de rêves, la nuit, réveil fréquent et jactation. — Frisson, avec maux de tête pressifs. — Chaleur générale, surtout à la face et aux mains, sans soif. — Sueur générale la nuit, au commencement du sommeil. — Irrésolution et répugnance pour le travail. — Loquacité et envie de rire.

TÊTE. — Vertige, avec étourdissement et chancellement, en marchant en plein air. — Mal de tête, comme par contraction ou expansion du cerveau. — Pesanteur et *pression dans la tête*. — Lancinations dans le front et les tempes. — *Douleurs de tête violentes, sensibles seulement en se tenant debout et en marchant*. — Tension du cuir chevelu.

YEUX ET OREILLES. — Douleur dans les yeux, comme si un grain de sable s'était introduit dans l'angle interne. — Sensation brûlante et élancements brûlants dans les yeux. — Inflammation des yeux, avec larmolement et photophobie. — Agglutination nocturne des paupières. — Élancements dans les oreilles. — Dureté de l'ouïe, le soir.

VISAGE ET DENTS. — Boutons purulents à la face, aux joues, aux ailes du nez et aux commissures des lèvres. — Sensation de chaleur et rougeur de la face. — Élancements et pression dans les joues. — Lèvre supérieure gercée. — Odontalgie, avec douleur tractive dans les dents cariées, jusque dans les sourcils. — Coups

pressifs dans les dents. — Il sort du sang acide par les dents cariées. — *Émoussement des dents.*

BOUCHE ET GORGE. — Accumulation de salive acidulée dans la bouche. — *Langue chargée d'un enduit blanc, avec exfoliation.* — Langue sèche, chargée d'un enduit brun, le matin, au réveil. — Mal de gorge, avec douleur pressive, comme par un gonflement intérieur. — Sécheresse, élancements et mucosités amères dans la gorge. — *Renâclement de mucosités acides.*

APPÉTIT. — *Goût amer dans la bouche,* avec goût normal des aliments. — *Goût salé, ou acide, des aliments,* principalement du beurre et de la viande. — Le tabac à fumer est désagréable, donne des pyrosis et coupe la respiration. — *Forte disposition frileuse après avoir bu ou mangé.*

ESTOMAC. — Renvois amers. — Renvois à vide, surtout après avoir bu. — *Nausées comme après des aliments trop gras,* avec anxiété et maux de tête pressifs, améliorées au grand air.

VENTRE. — Pincements dans le ventre. — *Élancements pressifs dans le ventre et les côtés du ventre, à gauche* principalement. — Grondements et mouvements dans le ventre, comme si des vessies y éclataient.

SELLES ET URINES. — Selles, plusieurs fois par jour, et cependant ne s'évacuant qu'avec effort. — Selles de la consistance de la bouillie, suivies de ténésie. — Prurit voluptueux au périnée. — *Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante.*

PARTIES GÉNITALES. — Douleur dans les testicules. — Érections permanentes. — Pollutions fréquentes.

POITRINE. — Pression à la poitrine. — *Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine.* — Tressaillement dans les muscles des côtes.

TRONC. — Douleurs pressives aux reins. — Élancements pressifs et tensifs dans le dos et les reins, en étant couché, avec étouffement de la respiration. — Gargouillement et gonflement dans les omoplates et les épaules, avec frisson général. — Tressaillements pressifs, et élancements dans les muscles du cou et de la nuque.

BRAS. — Battement pulsatif et tressaillement dans les épaules et le bras. — Tressaillement des muscles dans les bras. — Élancements dans les bras et les coudes. — Tractions et déchirements dans l'avant-bras et le poignet. — Éruption boutonneuse aux mains et aux doigts. — Froid glacial du bout des doigts.

JAMBES. — Élancements dans les cuisses, les genoux, les mollets, la plante des pieds et les orteils. — Sensation brûlante dans les genoux, les jambes et les orteils. — Sueur abondante entre les orteils.


220.—TARTARUS EMETICUS.

TART. — Tartre émétique. — ARCHIVES DE STAFF. — *Dose usitée* : 30. — *Durée d'action* : 3 à 5 semaines dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES : Cocc. ipec. puls. — On l'emploie comme antidote de : Sep.

COMPARER AVEC : Ant. asa. baryt. cham. cocc. ign. ipec. nitr-ac. n-vom. puls. sep. veratr. — C'est surtout après *puls.* ou *baryt.*, que le tartre émétique est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le tartre émétique, conviennent quelquefois : *Baryt. ipec. puls. sep.*

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Fièvres rhumatismales; Varioloïdes; Affections gastriques et bilieuses; Asphyxie des nouveau-nés; Coqueluche; Croup, etc., etc.

 *Voy. la note, page 47.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Déchirement et tractions* arthritiques et rhumatismales dans les membres, avec sensation de brisement. — Contraction des membres. — Tressaillement des muscles. — *Tressaillements convulsifs et crampes.* — Attaques d'épilepsie. — *Tremblement des membres.* — Élançements dans les varices. — *Exacerbation des symptômes en s'asseyant*, ou bien en étant assis et en se levant de son siège. — Pesanteur générale de tous les membres, et grande paresse. — Pulsations violentes dans tout le corps. — Grande débilité, faiblesse et lassitude excessive. — L'enfant veut constamment être porté. — *Accès d'évanouissement.* — Sensibilité excessive de tout le corps. — Dès qu'on touche l'enfant, il pousse des cris perçants.

PEAU. — Prurit à la peau. — Boutons pruriants et *éruption miliaire.* — Éruptions comme la gale. — *Éruption de pustules, semblables aux varioloïdes, avec auréole rouge, se recouvrant ensuite d'une croûte et laissant une cicatrice. — Prurit autour d'anciens ulcères.

SOMMEIL. — *Forte envie de dormir, le jour, avec pandiculations et bâillements fréquents. — *Somnolence invincible avec sommeil profond et engourdissement. — Le matin, il semble qu'on n'a pas assez dormi. — Sommeil tardif et insomnie nocturne. — Sommeil léger, avec affluence de rêves fantastiques. — Paroles fréquentes pendant le sommeil. — Cris pendant le sommeil, avec yeux fixes et tremblement des membres. — Secousses et coups pendant le sommeil, qui font tressaillir tantôt un seul membre, tantôt tout le

corps. — On est couché sur le dos, en dormant, la main gauche passée sous la tête.

FRISSON. — *Prédominance de frisson et de froid.* — Frisson avec pâleur excessive du visage, et tremblement de tout le corps. — *Chaleur ardente de tout le corps*, principalement dans la tête et le visage, augmentée par le moindre mouvement. — *Pouls accéléré*, faible ou plein. — *Fièvre avec absence de soif* et somnolence excessive. — *Sueurs abondantes, fréquentes*, et quelquefois froides. — Sueur des parties affectées. — Sueur nocturne, abondante.

MORAL. — Inquiétude et agitation, avec battement de cœur et tremblement. — Appréhensions anxieuses pour l'avenir (le soir). — *Découragement et désespoir.* — Manie du suicide. — *Gaieté douce*, le jour seulement.

TÊTE. — Hébétude, confusion et embarras dans la tête, qui est comme engourdie, avec envie de dormir. — Accès de vertige, avec scintillement devant les yeux, et étourdissement en marchant. — Émoussement de tous les sens. — Maux de tête, avec battement de cœur et vertige. — Pesanteur de la tête, surtout dans l'occiput. — Douleur de tête semi-latérale. — *Douleurs pressives dans la tête, avec tension compressive comme si le cerveau s'était contracté en une masse dure*, souvent avec étourdissement jusque dans la racine du nez, quelquefois le soir, et la nuit. — Traction, déchirement et fouillement dans la tête. — *Douleurs lancinantes dans la tête*, quelquefois s'étendant jusque dans les yeux, avec besoin de les fermer. — Térébration dans le front. — Battement dans une moitié du front. — *Tremblement chronique de la tête.*

YEUX. — *Yeux fatigués*, et qui ont besoin de sommeil et d'être fermés fortement. — Douleur de meurtrissure dans le globe de l'œil, au toucher. — *Pression sur les yeux.* — Élançements, sensation brûlante et cuisson dans les angles internes des yeux, avec rougeur de la conjonctive. — Yeux troubles, noyés. — *Amaurose commençante.* — Vue trouble, avec scintillement devant les yeux, surtout en se levant de son siège.

OREILLES ET NEZ. — Bourdonnement d'oreilles. — *Violent coryza fluent*, avec éternument fréquent, narines ulcérées, frissons et perte de l'odorat et du goût.

FACE ET DENTS. — *Visage pâle et hâve*, ou rouge et bouffi, avec expression anxieuse. — Pression sourde, tractive, à la pommette. — Tressaillement convulsif des muscles de la face. — Lèvres arides et qui s'exfolient. — Lèvres gercées. — Odontalgie avec douleurs très-violentes, le matin.

BOUCHE. — Accumulation abondante de salive dans la bouche. — Langue humide, nette, ou chargée d'un enduit brun. — Aphonie.

APPÉTIT. — Insipidité des aliments. — Goût salé dans la bouche. — *Goût amer dans la bouche. — Soif d'eau froide. — Appétit modéré, avec soif ardente. — *Appétit prononcé*, avec prompt dégoût dès qu'on a pris quelques aliments. — Boulimie, en se promenant au grand air. — *Désir excessif d'acides*, ou de fruits crus (des pommes). — *Dégoût pour tous les aliments*, surtout le lait. — Chaque bouchée produit une sensation douloureuse, jusque dans l'estomac.

ESTOMAC. — *Renvois à vide*. — Renvois sanglotants. — *Renvois avec goût d'œufs pourris*, la nuit. — Régurgitation de sérosités âcres, ou salées, ou bien acidulées. — Régurgitations du lait, après en avoir pris. — **Nausées, continuelles* quelquefois, *avec envie de vomir, angoisse*, pression dans le scrobicule et mal à la tête, soulagées en expulsant des flatuosités par le haut et le bas. — *Vomituration violente*, avec écoulement abondant de salive, sueur au front et lassitude dans les jambes, ou bien * avec diarrhée et débilité excessive. — *Vomissement abondant, avec efforts violents*, douleurs dans l'estomac et le ventre, tremblement du corps, besoin de se replier sur soi-même, frissons, et forte envie de dormir. — *Vomissement muqueux*, avec diarrhée muqueuse. — Vomissement aigre des aliments. — *Vomissement de matières aigres et amères, surtout la nuit. — Sensibilité excessive de l'estomac; la plus petite bouchée cause une sensation douloureuse. — *Mal à l'estomac, comme par surcharge*. — Malaise et vacuité dans l'estomac. — *Pression dans l'estomac et le scrobicule*, surtout après le repas. — Battements violents et pulsations dans la région de l'estomac. — Élançements dans le creux de l'estomac.

VENTRE. — *Douleurs abdominales, avec grande agitation morale* et physique et éloignement pour toute espèce de travail. — Malaise dans l'épigastre et l'hypogastre, qui oblige à se coucher et à s'étendre. — Plénitude et *pression dans le ventre, comme s'il contenait des pierres*, surtout *en se tenant courbé en étant assis*. — Coliques crampoïdes, dans le ventre, avec contraction violente des paupières, et besoin invincible de dormir. — Douleurs incisives dans le ventre, comme si les intestins étaient coupés. — Pulsations dans le ventre. — Production abondante de flatuosités, avec grondement, borborygmes et pincements dans le ventre.

SELLES. — Constipation, alternant avec diarrhée. — *Selles de la consistance de la bouillie*. — *Diarrhées muqueuses*, ou jaunes, brun clair, ou bien aqueuses, précédées souvent de tranchées et de mouvements dans le ventre. — *Selles sanguinolentes*. — Évacuations involontaires. — Pendant la selle, battement de cœur. — Chatouillement excessivement brûlant, depuis le rectum jusque dans le gland. — Lancinations dans le rectum.

URINES, RÈGLES. — *Émission d'urine, très-abondante et pénible, avec tension dans le périnée, sensation brûlante dans l'urèthre, et écoulement peu abondant, et sanguinolent vers la fin, avec douleurs violentes dans la vessie.* — Besoin d'uriner, la nuit, avec soif ardente et émission peu abondante. — Émission involontaire des urines. — *Urine rouge, enflammée, qui forme, en reposant, des filaments rouges de sang.* — *Urine brune foncée, âcre, trouble.* — Pression et tension sur la vessie. — Élançements dans l'urèthre et la partie inférieure de la vessie. — Menstruation d'un sang aqueux. — Éruption boutonneuse aux parties génitales.

LARYNX. — Catarrhe, avec irritation qui provoque la toux, *accumulation abondante de mucosités, et râle muqueux dans la poitrine.* — Enrouement. — Sensibilité douloureuse du larynx, au toucher. — Toux provoquée par un fort chatouillement dans la trachée-artère. — L'enfant tousse, lorsqu'il se fâche. — *Accès de toux, avec étouffement suffoquant de la respiration (toux suffocante).* — Toux, avec chaleur et moiteur des mains, et sueur à la tête, principalement au front. — *Toux, avec vomissement des aliments, après le repas.* — *Toux creuse, avec râle muqueux dans la poitrine.* — *Toux, avec expectoration de mucosités, quelquefois la nuit seulement, principalement après minuit.*

POITRINE. — *Étouffement de la respiration, fréquemment, surtout le soir ou le matin, au lit, au point de suffoquer.* — Haleine courte. — Respiration difficile. — ° *Paralyse des poumons.* — *Oppression de poitrine, anxieuse, avec sensation de chaleur qui remonte au cœur.* — *Râle muqueux dans la poitrine, en respirant.* — Douleur d'excoriation dans la poitrine, surtout au côté gauche, par accès. — Douleur rhumatismale dans le côté gauche de la poitrine. — Sensation brûlante dans la poitrine, qui remonte dans la gorge. — Inflammation des poumons. — *Battement de cœur, visible et anxieux, quelquefois pendant la selle.* — Fouillement tournoyant et coups dans la région du cœur, la nuit, ne cédant que lorsque la sueur commence à s'établir. — Éruption miliaire sur la poitrine.

TRONC. — *Douleur au dos et aux reins, en étant assis, comme par fatigue.* — Douleur rhumatismale dans le dos. — Faiblesse des muscles du cou, qui ne permet pas de tenir la tête droite. — Éruption miliaire à la nuque.

BRAS. — Craquement dans les articulations de l'épaule, avec *déchirement dans les bras et jusque dans les mains.* — Pesanteur excessive des bras. — Tressaillement des muscles dans les bras et les mains. — Éruption miliaire aux bras. — Boutons pruriants sur les bras et les poignets. — Taches rouges sur les mains, comme de piqures de puces. — *Tremblement des mains.* — Mains froides.

— Froid glacial du bout des doigts. — Bouts des doigts morts, secs et durs. — Taches jaune foncé, sur les doigts. — Distorsion des doigts.

JAMBES. — Pesanteur et douleurs rhumatismales dans les hanches et les jambes. — Faiblesse douloureuse dans l'articulation du genou, le matin, au lit. — Tension des tendons du jarret et du cou-de-pied, en marchant. — Crampe dans le mollet. — Froid aux pieds. — Engourdissement des pieds, chaque fois que l'on s'assied.

221.—TARTARI ACIDUM.

TART-AC. — Acide tartrique. — Médicament encore très-peu connu.

SYMPTOMES. — Courbature générale de tout le corps, surtout dans les membres inférieurs. — Au grand air, on se trouve mieux. — Pandiculations et bâillements fréquents. — Sensation de froid, le soir, après s'être couché. — *Lèvres sèches et brûlantes*, avec bords noirs ou bruns. — Dents émoussées. — Goût fade et pâteux dans la bouche. — Dégout. — Sensation de froid dans le ventre. — Pincements dans le bas-ventre, avec expulsion de flatuosités. — Après le repas, déchirements aigus dans la plante des pieds, qui ne permettent pas de s'appuyer dessus.

222.—TAXUS BACCATA.

TAX. — IF. — ARCHIVES DE STAFF et BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE. — *Durée d'action.*

ANTIDOTE?

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Relâchement de toutes les forces musculaires. — Malaise général. — Douleurs erratiques dans les genoux, les coudes et le dos. — *Peau* : éruption de boutons larges, un peu élevés, comme des taches rouges, sur la partie supérieure des deux bras. — Dartre sèche, à fond rouge et avec fort prurit, à l'angle externe de l'œil gauche. — *Insomnie* toute la nuit, bâillement sans envie de dormir. — *Fèvre* : d'abord frisson général, à deux heures du matin, puis chaleur sèche des mains et des pieds, avec malaise général, bouche sèche sans soif, et puis forte sueur au front; grelottement après le déjeuner, avec mal-

aise général et bouche sèche sans soif. — Au moindre effort, sueur, avec grand épuisement. — Fortes sueurs nocturnes. — *Impatience* qui ne permet pas la moindre contention d'esprit.

TÊTE. — Chancellement dans le repos, en étant assis, et en se tenant debout. — Céphalalgie au-dessus des sourcils, avec des raies brillantes et mobiles devant la vue. — Douleurs au front jusqu'à la face, avec tiraillement dans les yeux et larmoiement. — Douleur gravative dans la région de la tempe droite et du sourcil, avec sensation et larmoiement et aggravation par la moindre toux. — Serrement dans les deux côtés de la tête. — Pression, surtout dans l'os temporal. — Céphalalgie brûlante. — Élançement dans la région frontale. — Chaleur au front.

YEUX—DENTS. — *Aux yeux* : tiraillement, avec larmoiement et pression, et céphalalgie au-dessous des sourcils. — Prurit à l'angle externe de l'œil gauche. — *Prurit brûlant aux paupières*, disparaissant après s'être gratté. — *Larmoiement abondant* au moindre effort des yeux, et surtout chez les femmes. — Larmoiement de l'œil gauche. — Au bout du nez, tache ronde, brun rougeâtre, avec desquamation de la peau. — Dans les *dents*, sensation de froid.

BOUCHE—VENTRE. — A la *langue*, ardeur picotante. — *Goût amer*, comme de quinine. — *Forte faim*, bientôt après le déjeuner, avec malaise général et faiblesse dans la région stomacale. — *Besoin fréquent de manger*, et digestion activée. — *Nausée*, avec accumulation de salive. — Dans l'*estomac*, sensation de vacuité, sans faim. — Douleur dans le creux de l'estomac, au toucher. — *Pression dans la région stomacale*, brûlante et pinçante. — Dans le *ventre*, tension comme après avoir surchargé l'estomac. — Tension dans l'épigastre, avec douleur au toucher. — Serrement et tension à travers le ventre. — Pression dans la région ombilicale. — *Borborygmes*.

SELLES—PARTIES GÉNITALES. — *Selles dures, difficiles, sèches*. — Parfois selles isolées, molles ou naturelles (*diarrhées*, avec ténésme insupportable, et brûlement à chaque selle). — *Ténésme urinaire*. — Besoin fréquent avec sortie difficile des urines et jet mince. — Écoulement de sperme sans érection ni jouissance, pendant plusieurs nuits. — Grande excitation pendant le coït. — Après le coït, manque de force et forte oppression.

POITRINE ET TOUX. — *Toux* violente et fatigante. — Tussiculation après chaque repas, excitée par la respiration profonde, et avec oppression. — *Oppression*, surtout lorsque l'estomac est ou tout plein ou tout vide, ou bien avec douleur au-dessous du cartilage xiphoïde. — Élançement dans le côté gauche.

TRONC. — *Maux de reins*, ne laissant rester ni debout, ni assis, et

forçant de rester au lit. — Douleur incisive dans le sacrum. — Douleur continue au dos. — Douleur dans l'omoplate, qui va plus tard dans les reins. — Tiraillement dans les muscles du cou.

BRAS. — Douleur ostéocope, dans le coude vers l'humérus. — A l'avant-bras, d'abord prurit violent, puis *éruptions de boutons rouges et durs* autour du poignet, pruriteux surtout le soir et la nuit, et suivis de démangeaison. — Élançement dans la main. — Sécheresse brûlante de la paume des mains. — Douleurs sourdes dans les articulations des doigts. — Douleur rhumatismale à l'index droit, renouvelée par le moindre liquide.

EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES. — Douleur dans la hanche et le genou, avec déchirement et froid dans la cuisse. — Douleur à la hanche gauche, avec chaleur interne. — Aux cuisses, froideur pénible de la peau, surtout par devant. — Fourmillement dans la cuisse gauche. — Fourmillement douloureux autour de la rotule. — *Élançement au genou*, avec faiblesse dans l'articulation. — Douleur de brisure et sensation incisive, empêchant toute marche. — Douleur incisive surtout au genou gauche, réveillant la nuit. — Dans le mollet gauche, pincement violent avec prurit sur une petite place circonscrite. — Fourmillement dans le pied gauche.

223. — TEREBINTHINA.

TEREB. — Térébenthine. — HARTLAUB ET TRINKS. — Médicament qui n'est pas encore suffisamment connu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions dans les membres.* — Pesanteur des membres. — *Sensation de roideur dans tous les muscles*, avec marche pénible, lente, courbée, comme dans la vieillesse. — Hydropisie. — Éruption cutanée, comme la scarlatine. — Somnolence. — Sommeil tardif. — *Sommeil agité, la nuit*, avec jactation et réveil fréquent. — *Affluence des rêves.* — Cauchemar. — Chaleur naturelle augmentée. — Fièvre, avec soif violente. — Sueur abondante aux jambes, le soir, au lit. — Manie. — Conception facile.

TÊTE — DENTS. — Étourdissement avec nausées. — Accès de vertige, au point de tomber, avec obscurcissement devant les yeux. — *Maux de tête, avec douleur pressive*, et envie de dormir. — Pesanteur excessive et *plénitude pénible et pressive dans la tête.* — Céphalalgie déchirante. — Taches et points noirs devant les yeux. — Tintement d'oreilles. — Épistaxis. — Écoulement de sérosités

par le nez, sans coryza. — Odontalgie, avec douleur tractive. — *Gencives décollées, saignant facilement*, avec douleur de plaie brûlante, tous les matins.

ESTOMAC. — Diminution de l'appétit. — Dégout de la viande. — Après le repas, pression dans le scrobicule et ballonnement du ventre. — Vomiturition et vomissement de mucosités. — Sensibilité excessive de la région de l'estomac, au toucher. — Pression à l'estomac et dans le scrobicule. — *Sensation brûlante dans l'estomac.*

VENTRE. — *Sensation brûlante et pression dans les hypochondres.* — Pression, sensation brûlante et traction dans la région des reins. — Ventre très-sensible, au toucher. — Pesanteur, plénitude et pression dans le ventre. — Tranchées dans l'épigastre et l'hypogastre, souvent jusque dans les cuisses. — *Forte sensation de froid dans le ventre*, surtout à l'extérieur de la région ombilicale, qui est rétractée. — Inflammation des intestins. — Bruit, gargouillement et borborygmes dans le ventre. — Sensation de pression vers le dehors dans les aines, comme par une descente. — Gonflement douloureux des glandes inguinales.

SELLES. — Constipation, avec ballonnement du ventre. — Ténésme, — *Selles rares, dures.* — Évacuations sèches, brunes. — Selles de la consistance de la bouillie, avec pincements dans le ventre et sensation brûlante à l'anus. — *Selles diarrhéiques, liquides, d'un jaune verdâtre, avec expulsion de ténia et de lombrics.* — Sensation brûlante et fourmillement à l'anus, après et hors le temps des selles.

URINES. — *Suppression de la sécrétion des urines.* — Sécrétion d'urine diminuée. — Sécrétion d'urine considérablement augmentée. — *Forte odeur de violette de l'urine.* — Sédiment épais, muqueux, blanc jaunâtre, dans les urines. — Pissement de sang. — *Sensation brûlante dans l'urèthre*, sensible aussi en urinant. — Sensation brûlante, douleur incisive, et ténésme spasmodique de la vessie.

PARTIES GÉNITALES. — Tractions crampoïdes et incisives dans les testicules et les cordons spermatiques. — Règles en retard et peu abondantes.

POITRINE—MEMBRES. — Respiration gênée, comme par engorgement des poumons. — *Douleur tractive dans le dos et les reins*, surtout le soir, en étant assis. — Traction dans la nuque, jusque dans l'occiput. — Douleur de luxation et tiraillements dans le bras. — Tractions et déchirements dans les hanches et les cuisses.

224. — TEUCRIUM MARUM VERUM.

TEUCR. — Germandrée maritime. — ARCHIVES DE STAFF. — *Doses usitées* : 0, 30.
— *Durée d'action* : 2 à 3 semaines dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTE : Camphora.

COMPARER AVEC : Con. ign. magn-arct.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — *Polypes au nez* et quelques sortes d'affections par suite d'*Ascarides*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement dans les membres, mais surtout dans les articulations. — Tressaillement des muscles. — *Grande irritabilité et surexcitabilité nerveuse*, avec tremblement et étourdissement. — Chancellement en marchant; on met les pieds l'un sur l'autre. — Engourdissement et fourmillement dans les membres. — Besoin d'exercice en plein air. — Élançements pruriants à diverses parties.

SOMMEIL. — Sommeil tardif, le soir. — Sommeil non réparateur et difficulté de se réveiller, le matin. — *Sommeil agité la nuit*, par *surexcitation* excessive, avec rêves vifs et sursauts fréquents.

FIÈVRE. — Frissons et grelottement, souvent avec froid glacial, aux mains, et bâillement fréquent. — Chaleur augmentée, le soir.

MORAL. — *Irritabilité et disposition à se fâcher*, avec une telle impressionnabilité qu'on se sent beaucoup fatigué en ne faisant qu'entendre parler. — Morosité. — Paresse et éloignement excessif pour le travail. — *Forte surexcitation morale* et loquacité. — *Envie irrésistible de chanter*.

TÊTE. — Céphalalgie, avec douleur sourde, crampoïde. — *Douleurs pressives dans la tête*, principalement dans les yeux, dans le front et les tempes. — Déchirement par accès dans le côté droit de la tête.

YEUX. — Douleur dans les yeux, avec pression comme si un grain de sable s'y était introduit. — *Cuisson dans les yeux*, surtout dans les angles internes, avec rougeur de la conjonctive. — Yeux rouges, enflammés. — Yeux larmoyants avec aspect comme si on avait pleuré.

OREILLES. — Otalgie. — Élançements et déchirements dans les oreilles. — Sifflement dans les oreilles en parlant, ou en produi-

sant un son quelconque. — Éruption de dartres écailleuses au lobe de l'oreille.

NEZ. — Sensation d'obturation dans le nez. — Fourmillement dans le nez. — Éternument fréquent, avec fourmillement dans le nez. — *Obturation du nez.* — Coryza fluent au grand air.

VISAGE. — Teint maladif, pâle, avec yeux caves. — Chaleur fugace au visage, sans rougeur. — Déchirement pressif dans les os des joues, jusque dans les dents.

DENTS. — *Odontalgie, avec douleur déchirante*, dans les racines des dents et les gencives. — Douleur dans les dents et les gencives, pendant la mastication.

BOUCHE ET GORGE. — Bouche pâteuse. — *Cuisson et grattement au fond du gosier* et à la racine de la langue. — Mal de gorge, avec douleur lancinante et déglutition gênée. — Pression ou traction et déchirement dans la gorge. — Besoin fréquent de renâcler et *rendement abondant de mucosités* d'un goût de moisi.

APPÉTIT. — Goût amer dans le gosier, après le dîner. — Appétit plus prononcé. — *Sensation de faim*, comme si les aliments ne rassasiaient pas, empêchant de s'endormir. — Après avoir bu de l'eau, tranchées ou nausées avec envie de vomir.

ESTOMAC. — Régurgitation des aliments, avec goût amer. — Hoquet pénible en mangeant, avec coups violents dans le scrobicule. — *Mal d'estomac, comme par vacuité*, avec gargouillement. — Fadeur dans le creux de l'estomac. — Pression et oppression anxieuse dans le scrobicule.

VENTRE. — Coliques avec tractions déchirantes sous les hypochondres. — *Incarcération de flatuosités*, avec tiraillement, pincement et gargouillement dans le ventre. — Pression dans le ventre. — Pression vers l'anneau inguinal. — *Expulsion abondante de flatuosités*, avec odeur d'œufs pourris.

SELLES. — Selle abondante, de la consistance de la bouillie, et fétide. — *Expulsion d'ascarides.* — *Prurit et fourmillement fréquent à l'anus*, souvent après les selles.

URINES. — *Sécrétion d'urine plus abondante et aqueuse.* — Sensation pénible d'excoriation et de cuisson à la partie supérieure de l'urèthre. — Sensation brûlante pendant et après l'émission des urines. — Diminution de l'appétit vénérien.

POITRINE. — Poitrine chargée, avec sensation de sécheresse dans la trachée-artère. — Toux sèche, provoquée par un chatouillement dans la trachée-artère, comme si on avait respiré de la poussière. — Pression serrante dans la partie inférieure de la poitrine, avec malaise anxieux.

EXTRÉMITÉS. — Traction rhumatismale et tension dans le dos. — Pesanteur douloureuse dans les bras et les avant-bras. — Tres-

TEUCR. MAR. VER.—THEA CÆSAREA.—THERIDION CUR.

saillement des muscles des bras. — *Déchirement* tractif dans os et les articulations des bras, des mains et des doigts. — Insatiables douloureuses et tiraillement dans l'index. — Tressaillement des muscles dans les jambes. — *Déchirements* dans articulations et les os des jambes, des pieds et des orteils. Douleur dans le gros orteil, comme si l'ongle entraînait dans chairs.

225.—THEA CÆSAREA.

THÉ — Thé de Chine. — Médicament encore très-peu connu.

SYMPTOMES. — *Sensation de grande fatigue générale.* — Crainte du mouvement et *besoin d'être couché.* — *Insomnie.* — *Morose chagrine*, avec éloignement pour toutes choses et pour la moindre fatigue. — *Eloignement pour la conversation.* — Vertige et étourdissement, en se promenant au grand air. — Pesanteur et obscurcissement dans le front, principalement en marchant. Haleine fétide, le matin, au réveil. — Sensation de faim, avec cumulation abondante de salive aqueuse dans la bouche. — mangeant, promptement satiété, avec sensation pénible de sécheresse dans la bouche. — Répugnance pour tous les aliments. — *Nausée et fadéur* avec grande *laxité de l'estomac*, qui pend comme une bourse vide. — Pression et gargouillement dans la région de l'estomac.

226.—THERIDION CURASSAVICUM.

THER. — Thériidion de Curaçao. — HERING. — *Dose usitée : 30.* — *Durée d'usage :* ?

ANTIDOTE : ?

COMPARER AVEC : Calc. lyc., médicaments après lesquels le thériidion est principalement efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : *Mal de mer ; Affections gastriques, etc., etc.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Grande faiblesse générale*, avec tr

blement des membres. — Malaise excessif qui ne permet d'effectuer aucun travail. — *Forte envie de dormir*, et sommeil plein de rêves. — Sommeil profond, la nuit. — Frisson violent, avec pesanteur dans tous les membres. — Envie de dormir et besoin de se coucher après le déjeuner. — Découragement et manque de confiance en soi-même. — *Forte disposition à s'effrayer*. — Le temps passe trop vite. — *Crainte excessive du travail*. — Difficulté de méditer, et surtout de faire des comparaisons.

TÊTE. — Embarras de la tête, qui empêche de travailler. — Vertige fréquent, surtout en se baissant. — *Vertige avec nausées, au point de vomir*. — *Mal de tête dans le fond des orbites*. — Sensation comme s'il y avait un corps étranger dans la tête. — Céphalalgie frontale, violente, avec pulsation jusque dans l'occiput. — *Mal de tête à chaque mouvement que l'on fait*. — Pression tensive autour de la tête, comme par un cercle de fer, à la racine du nez, et au-dessus des oreilles. — Maux de tête le soir, avec grand accablement.

YEUX — FACE. — *Scintillement devant les yeux*, par accès fréquents. — Bourdonnement d'oreilles. — *Bruissement dans les oreilles comme par une chute d'eau*. — Sensibilité excessive de l'ouïe, *vertige et nausées à chaque son un peu fort*. — Prurit violent derrière les oreilles. — Éternement fréquent et écoulement d'eau par le nez, sans coryza. — Mâchoire inférieure quelquefois immobile, surtout le matin, au réveil.

BOUCHE — VENTRE. — Bouche pâteuse, et comme brûlée. — *Tous les sons et le froid produisent une sensation douloureuse, au travers des dents*. — Appétence pour les acides, le vin, l'eau-de-vie et le tabac. — *Désir continuel d'aliments ou de boissons, sans savoir lesquels*. — *Nausées et vomissements*, la nuit, précédés de vertiges et renouvelés par le plus léger mouvement ou en fermant les yeux. — *Nausées provoquées par tous les sons un peu forts*.

SELLES — PARTIES GÉNITALES. — Constipation. — Selle peu abondante, de la consistance de la bouillie, avec besoin pressant. — Chute de l'anus, douloureux en étant assis. — *Sécrétion d'urine plus abondante*. — *Exaltation immodérée de l'appétit vénérien*. — Racornissement du scrotum.

POITRINE ET TRONC. — *Lancinations violentes*, dans la partie supérieure de la poitrine. — Besoin de respirer profondément et de soupirer. — Prurit et nodosités aux fesses.



227. — THUIA OCCIDENTALIS.

THUI. — Thuia du Canada. — HAHNEMANN. — *Doses usitées* : 9, 30. — *Durée d'action* : jusqu'à 3 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES : Camph. puls. ? — On l'emploie comme antidote de : *Thea* et *merc.*

COMPARER AVEC : Asa. bry. cann. chin. cic. fer. led. lyc. mang. *merc. nitr-ac.* phos-ac. *puls.* sabin. selen. *staph.* — C'est surtout après *nitr-ac.*, que thuia est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après thuia, conviennent quelquefois : *Nitr-ac. puls. staph.*

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales et arthritiques; Dartres syphilitiques et chancres opiniâtres; Affections sycosiques (Condylomes); Verrues; Petite vérole; Fièvres intermittentes; Ozène??; Prosopalgie; Grenouillette; Coliques par étranglement des intestins; Gonorrhée; Cancer de la matrice?; Verrues aux mains chez les onanistes; etc., etc.

 Voy. la note, page 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Élancements dans les membres et les articulations.* — Craquement dans les articulations, en étendant la partie. — Gonflement des veines de la peau. — *Tressaillement de quelques membres et de quelques muscles. — *Douleurs déchirantes et pulsatives, comme si les parties souffrantes étaient ulcérées. — *Gonflements inflammatoires avec rougeur.* — Souffrances après s'être échauffé, avoir bu du thé, ou mangé des aliments gras ou des oignons. — Tremblement de quelques membres. — *Engourdissement facile des membres, surtout la nuit, en se réveillant.* — Les symptômes s'aggravent généralement après midi ou la nuit vers trois heures du matin; ils empêchent de s'endormir, le soir. — *Beaucoup de symptômes s'aggravent dans le repos, et par la chaleur, surtout celle du lit; ils s'améliorent par le mouvement, le froid et la transpiration. — Beaucoup de symptômes semblent se manifester principalement du côté gauche. — Roideur et pesanteur générale dans tout le corps, surtout dans les épaules et les cuisses. — Faiblesse physique, avec plénitude des facultés morales. — Tressaillement fréquent de la partie supérieure du corps. — Bouillonnement violent du sang, le soir, avec pulsation dans toutes les artères, aggravé par le mouvement, soulagé en étant assis. — Crainte du mouvement.

PEAU. — Sensibilité douloureuse de la peau. — *Élancements prurians à la peau*, surtout le soir et la nuit. — Boutons purulents, comme dans la variole. — Condylomes. — Furoncles. — Engélures. — Taches brunes ou rouges, marbrées sur la peau. — *La plupart des souffrances cutanées sont soulagées par le toucher.*

SOMMEIL. — Forte envie de dormir, le soir. — **Sommeil tardif*, à cause d'agitation et de chaleur sèche. — Insomnie nocturne, avec agitation et froid du corps. — *Sommeil non réparateur, la nuit.* — Dès qu'on s'endort, **rêves pénibles, anxieux*, de dangers et de mort, ou bien avec sursauts et cris, surtout *en étant couché du côté gauche.* — *Rêves lascifs, sans émission de sperme*, avec érections douloureuses au réveil.

FIÈVRE. — Frisson avec bâillement, après minuit. — Frisson tous les matins, sans soif. — Frisson grelottant avec froid intérieur et extérieur (et soif), suivi immédiatement de sueur. — Frisson tous les soirs (à 6 heures), avec chaleur extérieure, sécheresse de la bouche et soif. — *Chaleur, le soir, à la face* surtout. — Sueur au commencement du sommeil.

MORAL. — **Accablement moral.* — Appréhensions anxieuses sur l'avenir. — *Agitation* qui rend toute chose pénible et répugnante. — *On est très-pensif*, pour la moindre bagatelle. — Dégoût de la vie. — Humeur morose et maussade. — *Lenteur de la parole* et de la réflexion; *on cherche les mots en parlant.* — Incapacité de réfléchir.

TÊTE. — Vacuité de la tête, comme dans l'ivresse, surtout le matin, avec nausées. — Faiblesse et embarras de la tête, comme par *torpeur ou paralysie du cerveau.* — Vertige comme si on était balancé. — *Vertige en se levant de son siège et en étant couché*, ou bien en regardant en l'air. — *Maux de tête le matin*, comme après s'être baissé ou après un sommeil trop profond, avec rougeur de la face. — Céphalalgie sourde, étourdissante. — Céphalalgie aggravée en se baissant, soulagée en renversant la tête. — *Pesanteur de la tête*, surtout *le matin, au réveil, dans l'occiput*, avec mauvaise humeur et éloignement pour la conversation. — Céphalalgie comme si le front allait s'échapper, avec frisson intérieur, soulagée par la marche au grand air. — *Maux de tête pressifs*, avec secousses dans le front et les tempes. — *Maux de tête compressifs*, surtout dans les tempes. — *Douleur dans la tête, comme si un clou était enfoncé dans le vertex.* — Déchirement semi-latéral, dans le sinciput et la face, jusque dans les pommettes, principalement le matin et le soir. — Tressaillement déchirant dans l'occiput. — Lancinations à travers le cerveau. — *Congestion de sang à la tête.* — Pulsation dans les tempes. — *Sensibilité excessivement douloureuse du côté gauche de la tête*, et même des

cheveux, la nuit, en étant couché, et au toucher. — Traction pressive dans les muscles des tempes, surtout pendant la mastication. — Élançements dans les tempes. — *Gonflement des veines aux tempes.* — Prurit et rongement au cuir chevelu.

YEUX. — *Pression dans les yeux*, et cuisson, comme si un grain de sable s'y était introduit. — Déchirement dans les sourcils. — Élançements dans les yeux, à une vive clarté et à l'air vif. — *Sensation brûlante dans les yeux.* — *Sclérotique enflammée, rouge de sang.* — *Gonflement inflammatoire des paupières*, avec dureté — Nodosités rouges et douloureuses sur les bords des paupières — Boutons purulents et pruriants entre les sourcils. — *Condylomes dans les sourcils.* — Sensation de chaleur et de sécheresse dans les angles externes des yeux. — Larmolement, surtout de l'œil gauche, pendant la marche au grand air. — Agglutination nocturne des paupières. — *Obscurcissement de la vue en lisant* avec sensation de sommeil. — Vue trouble, comme à travers un voile. — *Myopie.* — Points noirs, voltigeants, devant les yeux.

OREILLES. — *Otalgie*, avec compression serrante et élançements vifs, surtout le soir. — *Douleur crampoïde à l'oreille extérieure* — Martellement et déchirement dans l'oreille, le soir, au lit, avec émission fréquente d'urine, et froid aux jambes et aux pieds. — Douleur pressive derrière les oreilles.

NEZ. — Gonflement des ailes du nez, avec dureté et tension. — Tension tractive dans les os du nez. — **Croûtes douloureuses dans le nez.* — Mouchement de sang. — *Épistaxis* fréquente surtout après s'être échauffé. — *Coryza sec*, qui devient fluent plein air, avec maux de tête continuels. — *Coryza fluent*, avec toux et enrrouement. — Écoulement verdâtre et fétide par le nez.

VISAGE. — *Chaleur du visage*, quelquefois seulement fugace, bien avec rougeur ardente. — Sueur à la face. — Éruption ciale, croûteuse, pruriante. — Nodosités rouges et douloureuses aux tempes. — *Douleur faciale térébrante et fouillante, dans les pommettes*, soulagée par le toucher. — *Tressaillement des lèvres* — Éruption boutonneuse aux lèvres et au menton. — Élançements dans la mâchoire inférieure, qui semblent ressortir par les oreilles. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

DENTS. — Odontalgie, après avoir bu du thé, avec douleur pressive jusque dans la mâchoire. — Odontalgie avec tiraillements aigus surtout pendant la mastication. — *Rongement dans les dents* (fissurées), avec sensibilité douloureuse de tout le côté de la tête, fortement aggravé par le contact des choses froides ou la mastication. — Gencives gonflées, avec douleur d'excoriation.

BOUCHE. — *Aphthes dans la bouche.* — Fort gonflement des glandes salivaires, avec salive plus abondante dans la bouche. — *Sal*

sanguinolente ou amère. — Douleur d'excoriation au bout de la langue, au toucher. — Gonflement de la langue, douloureux au toucher. — **Grenouillette* des deux côtés de la langue, transparente, rouge bleuâtre, grise et comme gélatineuse. — *Parole lente*.

GORGE. — Apreté et grattement dans la gorge. — Pression et *douleur d'excoriation dans la gorge et le palais, pendant la déglutition*. — Besoin d'avaler. — Élançements depuis le gosier jusque dans les oreilles. — Gonflement des amygdales et de la gorge. — **Ul-cères* dans la gorge et la bouche, comme des chancres. — *Renâ-clement de mucosités couleur rouge de sang*.

APPÉTIT. — *Goût fade* et douceâtre *dans la bouche*, le soir et après le repas. — Goût amer du pain. — Les aliments ne semblent jamais assez salés. — *Soif* seulement la nuit et le matin. — Appé-tence pour les boissons et les aliments froids. — *Satiété prompte* en mangeant. — Incommodités après avoir mangé des aliments gras ou des oignons. — Après le repas, grande paresse, ou abat-tement avec angoisse, et battement de cœur, ou fort ballonnement et souffrances par des flatuosités.

ESTOMAC. — *Renvois des aliments*, après le repas. — *Renvois amers*, ou putrides. — Renvois rances, surtout après les aliments gras. — Nausées et malaise dans la région de l'estomac. — Vomissement de sérosités acidulées et d'aliments. — Crampes d'estomac, avec exacerbation excessive vers le soir. — Pression dans le scrobicule après le repas, avec douleur au toucher. — Battement dans le scro-bicule. — Angoisse dans le creux de l'estomac qui monte jusque dans la tête.

VENTRE. — Pression douloureuse dans la région hépatique. — *Pres-sion dans la région des reins*. — *Ballonnement du ventre*, souvent avec douleurs contractives et crampoïdes. — Tension constrictive dans le ventre. — *Douleurs pressives dans le bas-ventre*, surtout vers le côté (avant la selle). — Sensation de quelque chose de vivant dans le bas-ventre. — **Douleur* dans le ventre comme par étranglement des intestins. — Grondement et borborygmes dans le ventre. — Douleur déprimante dans les aines. — Traction dans les aines en marchant et en étant debout, avec élançements le long des cuisses, en s'asseyant. — **Gonflement douloureux des glandes de l'aine*, quelquefois avec traction jusque dans le genou.

SELLES. — **Constipation qui dure plusieurs jours*, quelquefois après des pollutions. — **Ténésme* avec roideur de la verge. — **Eva-cuation difficile d'une selle dure*, volumineuse et enduite de sang. — Écoulement de sang pendant la selle. — *Contraction doulou-reuse de l'anus*, pendant la selle. — Sensation brûlante à l'anus et

entre les fesses. — **Condylomes à l'an.* — Déchirements le long du rectum.

URINES. — *Besoin fréquent d'uriner, avec émission abondante* d'une urine aqueuse, même la nuit. — *Sédiment nuageux* dans l'urine. — *Urine sanguinolente.* — *Suistement d'urine prolongé*, après avoir uriné. — *Sensation comme si une goutte coulait dans l'urèthre*, après et hors le temps de l'émission des urines. — *Sensation brûlante dans l'urèthre*, surtout le matin et dans la journée, comme aussi après et pendant l'émission des urines. — *Élancements dans l'urèthre*, pendant et hors le temps de l'émission des urines. — *Cuison dans les parties sexuelles de la femme*, pendant l'émission des urines. — *Prurit dans l'urèthre.* — **Écoulement jaunâtre par l'urèthre*, avec verge cordée.

PARTIES GÉNITALES. — *Sueur abondante aux parties génitales*, surtout au scrotum. — *Gonorrhée bâtarde.* — **Condylomes sur le gland et le prépuce, humides, pruriants*, et suppurant surtout à la lune croissante. — **Ulcères comme des chancres au prépuce.* — *Gonflement du prépuce.* — *Élancements dans le scrotum*, la verge et le long du cordon spermatique, jusqu'à l'ombilic. — *Traction dans les testicules*, avec rétraction de l'un d'eux (le gauche). — **Érections douloureuses*, continuelles, surtout la nuit et le matin, avec lancements dans l'urèthre. — *Pollutions*, avec sensation de rétrécissement de l'urèthre. — *Écoulement de liqueur prostatique.* — *Écoulement abondant et aqueux par la verge.*

RÈGLES. — *Prurit et cuisson brûlants*, comme par excoriation, aux parties génitales. — *Pression sur les parties génitales.* — *Douleur contractive et crampoïde dans les parties génitales*, jusque dans le bas-ventre. — *Gonflement et excoriation des lèvres.* — **Verrues à l'orifice de la matrice*, avec élancements et sensation brûlante en urinant. — *Menstruation trop peu abondante.* — *Leucorrhée.*

LARYNX. — *Enrouement*, comme par contraction du larynx. — *Élancements et fourmillement dans la trachée-artère.* — *Toux*, le matin, provoquée par un chatouillement dans la trachée-artère. — *Toux, provoquée par un échauffement.* — *Expectoration de petits globules gris, jaunes ou verts*, en toussant. — *Toux, avec expectoration de mucosités jaunes*, et douleurs dans le scrobicule, l'après-midi.

POITRINE. — *Gêne de la respiration*, avec forte soif d'eau et grande anxiété. — *Dyspnée*, avec besoin de respirer profondément. — *Oppression tantôt du côté gauche de la poitrine, tantôt dans l'hypochondre gauche*, avec irritation qui provoque la toux. — *Douleur de poitrine, comme par quelque adhérence intérieure.* — *Pres-*

sion sur la poitrine, quelquefois après le repas. — Agitation et sensation de gonflement dans la poitrine. — *Lancinations dans la poitrine*, surtout après avoir bu froid. — Bouillonnement de sang dans la poitrine, et *battements de cœur violents et sensibles à l'ouïe*, surtout en montant un escalier. — *Battement de cœur, avec nausées. — Sensibilité douloureuse de la région du cœur. — *Couleur bleue de la peau, autour des clavicules.*

TRONC. — Douleur de brisement et roideur aux reins, dans le dos et la nuque, surtout le matin, après s'être levé. — Traction dans le dos et aux reins, en étant assis. — Térébration dans le dos. — Pulsation dans l'épine dorsale. — *Furoncles au dos.* — Inquiétudes dans la nuque, le cou et la poitrine. — *Tension de la peau de la nuque, en remuant la tête.* — Gonflement des glandes du cou. — *Gonflement des veines du cou.* — *Sueur abondante sous les aisselles.* — Taches brunes sous les bras, comme des taches de naissance.

BRAS. — Battement dans l'articulation de l'épaule. — **Douleur d'ulcération, déchirante, pulsative, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts.* — Douleur de luxation dans l'épaule et le bras, avec craquement. — *Traction fouillante dans les bras, comme dans l'os ou le périoste.* — *Tressaillement involontaire des bras, le jour.* — La nuit, sensation de froid, aux bras. — *Lancinations dans les bras et les articulations.* — Craquement dans l'articulation du coude, en étendant les bras. — Taches rouge marbré à l'avant-bras. — Tremblement des bras et des mains, en écrivant. — Sensation de sécheresse de la peau des mains. — *Sueur aux mains.* — *Veines gonflées aux mains.* — °Verrues aux mains. — Froideur, torpeur et pâleur du bout des doigts et des doigts, s'étendant quelquefois jusqu'à l'avant-bras. — Fourmillement et élancements dans le bout des doigts. — *Gonflement rouge et douloureux du bout des doigts.* — *Les douleurs dans les bras s'aggravent en les laissant pendre ou à la chaleur; elles s'améliorent par le mouvement, le froid et après la transpiration.

JAMBES. — Traction dans les jambes. — *Élancements dans les jambes et les articulations.* — Grande faiblesse et lassitude dans les jambes, surtout en montant un escalier. — Pesanteur et roideur des jambes, en marchant. — Sueur abondante aux cuisses et aux parties génitales. — Prurit aux cuisses. — Éruption boutonneuse aux fesses, aux cuisses et aux genoux. — Ulcères aux cuisses. — Craquement dans les articulations des genoux et des pieds, en les étendant. — Pustules suppurantes aux genoux. — Nodosités blanches, avec prurit violent aux orteils. — *Gonflement inflammatoire et rouge du bout des orteils*, ou du cou-de-pied, avec douleur et tension en s'appuyant sur le pied et pendant le

mouvement. — Taches rouge marbré sur le cou-de-pied. — Sueur aux pieds, principalement aux orteils. — *Engelures* aux orteils.

228. — TONGO.

TONG. — Fève de Tonkin. — HARTLAUB ET TRINKS. — Médicament encore très-peu connu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirements dans les membres, soulagés par la pression extérieure et par le mouvement. — La plupart des symptômes se manifestent en étant assis et dans le repos. — Le vinaigre dissipe beaucoup de douleurs. — Maussaderie et mauvaise humeur. — Éloignement pour le travail et la conversation.

TÊTE. — Tête entreprise, surtout dans l'occiput, avec assoupissement. — *Pesanteur de la tête*, surtout en se relevant après s'être baissé. — Maux de tête tractifs. — Pression, *déchirement et élanagements dans la tête*, surtout en entrant dans l'appartement, avec déchirements d'un côté de la face et mauvaise humeur. — Élanagements dans la tête, en riant. — *Maux de tête pulsatifs*, surtout du côté gauche. — En prenant du vinaigre, les maux de tête se dissipent. — Sensibilité excessive de l'extérieur de la tête.

YEUX — DENTS. — *Sensation brûlante et sécheresse* des yeux, le soir, en lisant. — Traction, tension et frémissement dans les paupières. — Déchirement dans les oreilles. — Coryza, avec obturation du nez. — *Teint pâle*, avec joues rouges. — Déchirement dans les os des mâchoires. — Déchirement d'un seul côté de la face. — *Odontalgie, avec douleur déchirante*, surtout dans les dents molaires, aggravée en pesant dessus, se dissipant par l'usage du vinaigre. — *Sang acide*, par les dents et les gencives.

BOUCHE — RÈGLES. — *Accumulation abondante d'eau dans la bouche*. — Apreté et grattement dans la gorge. — Renvois, avec goût d'amandes amères. — Sensation brûlante et tranchées dans les hypochondres, comme si c'était extérieurement. — Mouvements et pincements dans le ventre. — Ténésme. — Selles dures, évacuées avec efforts. — Diarrhée, suivie de sensibilité excessive du ventre. — Urine rare, avec sédiment blanc. — Urine couleur de vin blanc, avec sédiment muqueux, abondant. — Urine rouge, avec sédiment abondant, couleur d'argile. — Rè-

166 TONGO.—URTICA URENS.—UVA URSI.—VALER. OFFICIN.

gles trop hâtives. — Leucorrhée en marchant. — Écoulement de mucosités épaisses par le vagin (en faisant des efforts pour aller à la selle).

POITRINE. — *Enrouement avec sensation brûlante dans le larynx.*
— Élançements et sensation brûlante sous les côtes de la poitrine. — Douleurs aux reins, avec sensibilité excessive, au toucher.

229.—URTICA URENS.

URT. — Ortie grêche. — Médicament encore entièrement inconnu, mais qui a été employé contre des *Brûlures*, quelques cas de *Dysenterie* et des *Éruptions urticaires*.

230.—UVA URSI.

UVA. — Raisin d'ours. — Médicament presque entièrement inconnu, mais qui a été employé contre des *Calculs urinaires*.

SYMPTOMES. — *Emission d'urine douloureuse*, avec sensation brûlante. — *Urine comme du pus*, muqueuse. — Pissement de sang.

231.—VALERIANA OFFICINALIS.

VALER. — Valériane officinale. — ARCHIVES DE STAFF. — *Doses usitées* : 12, 30. —
Durée d'action : 3 à 10 jours dans quelques cas.

ANTIDOTES : Camph. coff.

COMPARER AVEC : Arn. bell. cham. tocc. coff. con. ign. merc. n-vom. plat. puls. stann.

CLINIQUE. — On a employé ce médicament contre quelques cas de *Fièvre intermittente*, ainsi que contre des *Céphalalgies* et des *Coliques* chez des personnes *hystériques*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Déchirement rhumatismal dans les membres*, généralement en dehors des articulations, *principalement dans le repos*, après le mouvement, et le plus souvent *sou-*

lagé par le mouvement, ou transformé par la marche en d'autres sensations et à d'autres parties. — *Douleurs tressaillantes et ébranlantes, apparaissant subitement et par accès.* — Douleurs qui se manifestent lorsqu'on reste longtemps dans une position quelconque, et s'améliorent lorsqu'on en change. — Traction et tressaillement aux membres, comme si c'était dans les os. — Douleur de paralysie dans les membres, vers la fin d'une promenade. — Souffrances périodiques, réapparaissant après 2, 3 mois. — Attaques d'épilepsie. — Torpeur paralytique dans les membres. — La plupart des symptômes se manifestent le soir et après le dîner. — *Surexcitation et irritabilité malades*, générales, avec lassitude dans les membres, grande gaieté et apparence de vigueur. — Courbature, surtout dans les membres inférieurs, le matin, après s'être levé. — Éruptions de petites nodosités, d'abord rouges et confluentes, puis blanches et dures.

SOMMEIL. — *Insomnie.* — Sommeil agité, avec jactation et rêves anxieux et confus.

FIÈVRE. — *Fièvre, avec chaleur continue*, après un court frisson, accompagné d'embarras de la tête et de soif. — Pouls accéléré. — *Sueur fréquente*, surtout à la face et au front (souvent apparaissant subitement, et se dissipant promptement).

MORAL. — *Sensation anxieuse, hypochondriaque*, comme si tout ce qui environne était désert, déplaisant ou inconnu. — *Surexcitation joyeuse, tremblante.* — Peur, le soir. — Désespoir. — *Apparition alternative des symptômes moraux les plus opposés.* — *Mobilité excessive des idées.* — Hallucinations et erreurs du sentiment général.

TÊTE. — Tête embarrassée, comme par l'ivresse. — Ivresse et étourdissement, avec absence d'idées. — *Tournoiement dans la tête en se penchant en avant.* — *Céphalalgie apparaissant subitement ou par accès.* — *Céphalalgie pressive ou avec lancinations pressives, surtout dans le front, vers les orbites*, alternant souvent avec embarras et étourdissement dans la tête. — Douleur tractive d'un côté de la tête, par un courant d'air. — Contraction étourdissante dans la tête, comme par un coup violent sur le vertex. — Sensation de froid glacial, à la partie supérieure de la tête, par la pression du chapeau.

YEUX. — Yeux abattus, comme après une débauche nocturne, surtout après le repas. — Pression, sensation brûlante et cuisson dans les yeux. — Rougeur et douleur d'excoriation au bord des paupières. — Gonflement et sensibilité douloureuse des paupières. — *Myopie.* — Clarté et lueur devant les yeux, dans l'obscurité, de manière que les objets deviennent presque reconnaissables. — Étincelles devant les yeux.

OREILLES — DENTS. — Otalgie, avec traction crampoïde. — Tressaillement dans les oreilles. — Tintement et sonneries dans les oreilles. — Douleur faciale, avec traction crampoïde dans les os des joues. — Rougeur et chaleur des joues, au grand air. — Vésicules blanches sur la joue et la lèvre supérieure, douloureuses au toucher. — Odontalgie, avec douleur lancinante.

APPÉTIT. — *Goût dans la bouche* (et odeur devant le nez), *comme de suif fétide*. — Goût amer sur le bout de la langue, en la passant sur les lèvres, après le repas. — Goût fade et muqueux de la bouche, le matin, après le réveil. — Boulimie, avec nausées.

ESTOMAC. — *Renvois avec goût d'œufs pourris*, le matin au réveil. — Renvois fréquents, à vide, ou rances et brûlantes. — *Nausées, avec envie de dormir*, et sensation comme s'il y avait un fil depuis le gosier jusque dans le ventre, avec accumulation abondante de salive. — Nausées, avec évanouissement, lèvres blanches et froideur du corps. — *Vomissement* de bile et de mucosités, avec violent frisson grelottant. — Vomissement nocturne. — Faiblesse de l'estomac et de la digestion. — *Pression dans le scrobicule*, apparaissant subitement, et se dissipant promptement, par un gargouillement dans le ventre.

VENTRE. — Douleurs dans la région hépatique et l'épigastre, au toucher. — Secousses douloureuses dans l'hypochondre droit. — Lancinations dans la région des reins, en s'asseyant. — *Ventre ballonné* et dur. — Forte sensation d'expansion dans le ventre, comme s'il allait éclater. — Propension à rétracter le ventre. — *Crampes abdominales*, généralement le soir, au lit, ou après le dîner, ne se laissant soulager par aucune position. — Coliques par des hémorroïdes. — Tranchées et pincements douloureux dans le ventre, en le rétractant. — *Maux de ventre, le soir*, du côté gauche, comme par ulcération sous-cutanée. — Traction, pression et *douleurs de meurtrissure dans le bas-ventre*, les aines et les muscles abdominaux, comme après un refroidissement, ou un tour de reins. — Douleurs fouillantes dans le ventre.

SELLES — URINES. — *Selles diarrhéiques*. — Selles verdâtres, de la consistance de la bouillie, mêlées de sang. — Térébrations douloureuses dans le rectum. — Écoulement de sang par l'anus. — *Ascarides du rectum*. — *Émission d'urine, abondante et fréquente*.

POITRINE. — Gêne de la respiration et angoisse sur la poitrine. — Oppression de la respiration, avec pression sur la partie inférieure de la poitrine. — *Lancination dans la poitrine*, quelquefois du côté gauche (dans la région du cœur), en inspirant. — Éruption de petites nodosités dures sur la poitrine.

TRONC. — Douleur tractive aux reins et dans le dos. — *Douleur*

dans la région des lombes, comme après avoir pris un refroidissement ou s'être donné un tour de reins. — Douleurs rhumatismales dans les omoplates.

BRAS. — Tractions crampoïdes et tressaillements, ou bien déchirement dans les bras. — Douleur paralytique dans les articulations de l'épaule et du coude, vers la fin d'une promenade. — Éruption de petites nodosités dures sur les bras. — Tremblement des mains, en écrivant. — Secousses douloureuses à travers la main.

JAMBES. — Douleur brûlante dans les hanches, le soir, au lit. — Traction crampoïde et tressaillement dans les cuisses. — Grande pesanteur et lassitude dans les jambes, mais surtout dans les mollets. — Douleur de brisement dans les cuisses et le tibia. — Douleur paralytique dans les genoux, vers la fin d'une promenade. — Douleur tensive dans les mollets. — Déchirements dans les mollets, surtout en croisant les jambes. — Traction dans les articulations des pieds, en s'asseyant. — Douleur de luxation dans les articulations du pied et les malléoles. — *Douleurs et élancements dans les talons*, surtout en étant assis. — Déchirements dans la plante des pieds et sur les orteils.

232. — VERATRUM ALBUM.


VERAT. — Hellébore blanc. — **HAHNEMANN.** — Doses usitées : 12, 30. — Durée d'action : 2 à 3 semaines dans quelques affections chroniques.

ANTIDOTES : Acon. camph. chin. coff. — On l'emploie comme antidote de : Ars. chin. fer.

COMPAREZ AVEC : Acon. ars. arn. bry. camph. caps. caus. chin. cic. coff. coloc. cupr. dross. fer. hell. hyos. ign. ipec. laur. lyc. magn-m. merc. mez. op. phos. phos-ac. puls. rhus. rut. sabad. sec. sep. sil. spig. stram. sulf. tart. zinc. — C'est surtout après : Ars. chin. cupr. phos-ac., que veratrum est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après veratrum, conviennent quelquefois : Ars. arn. chin. cupr. ipec.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections chroniques par l'abus du quinquina; suites fâcheuses d'une peur, d'une frayeur ou d'une contrariété avec colère; Souffrances rhumatismales; Spasmes hystériques; Faiblesse physique et nerveuse, par suite de fortes maladies aiguës; Éruptions galeuses; Fièvres gastriques; Fièvres intermittentes; Manie; Migraine; Céphalalgie nerveuse, chez de jeunes filles hystériques et de jeunes femmes; Amblyopie amaurotique; Odontalgies rhumatismales et autres; Faim canine, même à la suite de maladies aiguës (dans la

convalescence); *Choléra sporadique ou asiatique*; Dyspepsie avec vomissement des aliments; Hématémèse; Diarrhées de différentes natures, même celles produites par des boissons froides, lorsqu'on s'est échauffé; Constipation opiniâtre; Dysménie des jeunes filles; Vomissement et autres souffrances gastriques des femmes enceintes; Nymphomanie des femmes en couche; Fièvre puerpérale; Hernies des enfants à force de crier; Coqueluche; Grippe; etc., etc.

 Voy. la note, page. 47.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — ° *Accès de douleurs, qui provoquent chaque fois, pendant un court espace de temps, le délire et la démence.* — Douleur tractive dans les membres, surtout en marchant beaucoup. — *Douleur pressive de brisement dans les membres*, les muscles et les os. — * *Douleur paralytique dans les membres*, comme après une grande fatigue ou un grand épuisement. — Déchirement dans les muscles extenseurs, en étant assis. — ° *Douleurs dans les membres, auxquels la chaleur du lit est insupportable*, qui se soulagent en se levant, et se dissipent complètement en se promenant, apparaissant généralement vers 4 à 5 heures du matin. — ° *Douleurs dans les membres, aggravées au printemps, en automne, par un mauvais temps, le froid et l'humidité.* — Douleurs aggravées en entendant parler. — Relâchement des muscles. — Engourdissement des membres. — Roideur des membres, principalement le matin et après une promenade. — *Tremblement des membres.* — Élançement dans les membres, comme par des étincelles électriques. — Accès de crampes et *mouvements convulsifs des membres.* — ° Accès de spasmes avec serrement des mâchoires, perte des sens et du mouvement, et tressaillement convulsif des yeux et des paupières; avant l'accès, angoisse, découragement et désespoir. — (Attaques d'épilepsie.) — Spasmes toniques, quelquefois avec contraction de la paume des mains et de la plante des pieds. — * Plusieurs symptômes sont renouvelés lorsqu'on se lève et apaisés lorsqu'on se couche. — * *Prostration des forces, subite, générale et paralytique.* — * *Faiblesse excessive, chronique*, qui ne permet ni d'être assis, ni de rester couché, ou bien provoquée par le moindre mouvement. — Marche chancelante. — * *Accès d'évanouissement*, quelquefois même au moindre mouvement. — *Amaigrissement général.* — Fourmillement dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts et des orteils. — On est affecté par le grand air.

PRAC. — Éruptions miliaires, qui démangent à la chaleur et brûlent après avoir gratté. — Éruptions urticaires. — * *Éruptions sèches, ressemblant à la gale*, avec prurit nocturne. — Dartres sèches. —

Desquamation de l'épiderme. — **Peau flasque et sans élasticité.*
 *Couleur blanchâtre de la peau.

SOMMEIL. — *Engourdissement somnolent, ou coma vigil*, avec connaissance incomplète, sursauts avec effroi et yeux à demi ouverts ou fermés d'un seul côté. — *Insomnie nocturne, avec forte angoisse.* — Sommeil par trop profond. — Sommeil, avec bras passés sur la tête. — *Rêves anxieux.* — Gémissement pendant le sommeil.

FIÈVRE. — **Froid général de tout le corps, et sueurs froides visqueuses*, surtout au front. — Horripilation et frisson, avec soif d'eau froide. — Horripilation et chair de poule, après avoir bu. — **Fièvre avec froid extérieur seulement.* — **Violent frisson grelottant* (suivi de chaleur et de soif peu forte), *puis sueur*, qui se transforme bientôt en froid. — **Frisson*, d'abord avec forte soif, suivi de frisson alternant avec chaleur, puis *chaleur permanente avec soif.* — **Fièvre*, avec chaleur intérieure seulement, et urine foncée; ou *avec vomissement et diarrhée, ou avec constipation; *pendant le frisson, vertige, nausées et douleurs aux reins et dans le dos. — **Pendant la chaleur*, assoupissement continu, ou délire *avec rougeur de la face. — **Fièvre avant minuit et le matin*, quotidienne, tierce ou quarte. — **Pouls lent et presque éteint*, ou petit, accéléré et intermittent. — *Sueur facile à provoquer le jour*, par le moindre mouvement.

MORAL. — Abattement mélancolique, tristesse et besoin de pleurer. — Affliction inconsolable, avec hurlements et cris pour des malheurs imaginaires. — **Angoisse excessive et inquiétude, avec appréhensions et trouble de conscience*, surtout la nuit ou le matin, souvent aussi chaque fois qu'on se lève de son siège ou du lit. — *Forte disposition à s'effrayer*, et caractère *peureux.* — **Angoisse mortelle.* — **Découragement et désespoir.* — *Agitation affairée; on se donne beaucoup de mouvement*, avec grande disposition au travail. — *Disposition à se fâcher*, pour la moindre chose, souvent suivie d'anxiété et de battement de cœur. — *Grande disposition au silence*, avec injures à la moindre provocation. — Disposition à s'entretenir des fautes d'autrui. — Gaieté immodérée et loquacité. — *Fureur*, avec envie de mordre, de tout déchirer et de s'enfuir. — Perte de la mémoire. — *Absence d'idées.* — Perte des sens. — **Aliénation mentale et démence*; avec chant, sifflement, rire, besoin de courir de côté et d'autre, idées et actions extravagantes et orgueilleuses, ou bien encore avec disposition à se dire atteint d'affections qui n'ont pas la moindre vraisemblance et sont tout à fait fictives. — **Accès d'aliénation érotique ou religieuse.* — **Délires violents.*

TÊTE. — Embarras dans la tête, comme si au dedans, tout était

mouvant, surtout le matin. — Émoussement de tous les sens. — *Vertige tournoyant*. — Ivresse et étourdissement. — **Accès de maux de tête, avec pâleur du visage, nausées et vomissements*. — Maux de tête, avec roideur douloureuse de la nuque. — Mal de tête avec flux d'urine. — Maux de tête par accès, comme si le cerveau était meurtri ou déchiré. — *Céphalalgie pressive*, souvent dans le vertex, ou bien semi-latérale, avec douleur d'estomac. — Douleur constrictive dans la tête (et le gosier). — Douleur incisive au vertex. — Ébranlement dans la tête, avec tressaillement dans les bras et pâleur des doigts. — Forte congestion de sang à la tête, en se baissant. — *Maux de tête pulsatifs*. — Douleur brûlante dans le cerveau. — Sensation de froid et de chaleur à l'extérieur de la tête, avec **sensibilité douloureuse des cheveux*. — **Froid au vertex, comme s'il y avait là un morceau de glace*. — **Sueur froide au front*.

YEUX. — Douleur dans les yeux, comme si le globe était meurtri. — *Déchirement douloureux*, ou *compression dans les yeux*. — Ardeur permanente dans les yeux. — Rougeur des yeux. — *Inflammation douloureuse des yeux*, surtout de l'œil droit, et parfois avec maux de tête violents, et insomnie nocturne. — Yeux ternes, troubles, jaunâtres. — Couleur bleue des yeux. — Yeux noyés et comme recouverts de blanc d'œuf. — *Sécheresse excessive des paupières*. — *Larmolement abondant*, souvent avec ardeur, douleurs incisives et sensation de sécheresse dans les yeux. — Agglutination des paupières, pendant le sommeil. — *Paralysie des paupières*. — Yeux convulsés, proéminents. — *Pupilles fortement contractées ou dilatées* d'une manière sensible. — Perte de la vue. — Diplopie. — **Cécité nocturne*. — Étincelles et taches noires devant les yeux, surtout en se levant de son siège ou du lit.

OREILLES. — Élancements dans les oreilles. — Pression et étreintes dans les oreilles. — Sensation de froid alternant avec chaleur dans les oreilles. — *Surdité*, comme par obturation des oreilles. — Bruissement dans les oreilles, surtout en se levant de son siège.

NEZ. — **Froid glacial du nez*. — Inflammation et douleur d'ulcération dans l'intérieur du nez. — Douleur contractive et déprimante dans l'os du nez. — Épistaxis nocturne, ou par une seule narine. — Odeur de fumier, devant le nez. — *Sensation de sécheresse pénible dans le nez*. — Éternument violent et fréquent. — Coryza.

VISAGE. — **Face pâle, froide, hippocratique, hâve, avec nez effilé*, et cercle bleu autour des yeux. — Visage bleuâtre. — **Couleur jaunâtre de la face*. — **Rougeur de l'une des joues, avec pâleur*

de l'autre. — *Rougeur et pâleur alternatives de la face. — Rougeur de la face lorsqu'on est couché, pâleur en se redressant. — *Chaleur brûlante, rougeur foncée et sueur du visage. — °Sueur froide à la face. — Douleurs faciales, tractives et tensives, d'un seul côté et s'étendant jusqu'à l'oreille. — Tressaillement et pincements dans les muscles de la face. — Pustules à la face, vers la fin avec douleur d'excoriation au toucher. — Couperose à la face. — Éruption miliaire sur les joues. — Bouffissure de la face. — *Lèvres sèches, noirâtres et gercées. — Éruption aux commissures des lèvres. — Couperose autour de la bouche et du menton. — *Crampe de la mâchoire. — Douleur et gonflement des glandes sous-maxillaires.

DENTS. — Odontalgie, avec maux de tête et face rouge, bouffie. — *Odontalgie (quelquefois pulsative) avec gonflement du visage, sueur froide au front; nausées et vomissements, courbature et froid de tout le corps, prostration des forces jusqu'à la défaillance, chaleur intérieure et soif inextinguible. — Pression et sensation de pesanteur excessive dans les dents, avec tiraillement pendant la mastication, même des aliments mous. — Grincement des dents. — Vacillement des dents.

BOUCHE. — Bouche sèche et pâteuse. — Salivation, avec nausées, ou avec goût âcre ou salé. — Écume à la bouche. — Sensation de froid ou brûlement dans la bouche et sur la langue. — Inflammation de l'intérieur de la bouche. — °Langue sèche noirâtre, fendillée, ou rouge et enflée. — °Langue chargée d'un enduit jaune. — Bégalement. — Perte de la parole. — Sensation de torpeur et grande sécheresse au palais.

GORGE. — Mal de gorge, avec douleur constrictive d'étranglement, surtout pendant la déglutition. — Rétrécissement du gosier comme par un gonflement pressif. — Gonflement du gosier avec péril de suffocation. — Sensation de froid ou brûlement dans l'arrière-bouche et le gosier. — Sécheresse dans la gorge, qui ne peut être apaisée par aucune boisson. — Apreté et grattement dans la gorge.

APPÉTIT. — Insipidité de la salive dans la bouche. — Goût amer, bilieux, dans la bouche. — Goût putride dans la bouche, comme du fumier, herbacé. — Goût frais ou piquant dans la bouche et la gorge. — *Soif inextinguible, avec désir de boissons froides principalement. — Appétit et désir d'aliments, même dans l'intervalles des vomissements et des évacuations alvines. — Faim ardente et voracité. — *Boulimie. — Désir ardent et continuels d'acides et de choses fraîches (des fruits). — Répugnance pour les aliments chauds. — °Pour peu qu'on ait mangé, vomissement immédiat et diarrhée. — °En mangeant, nausées avec faim et pres-

sion à l'estomac. — *Après le repas, hoquet, envie de vomir et régurgitation de sérosités amères.

ESTOMAC. — Renvois avec goût des aliments. — *Renvois violents, à vide*, même après le repas. — *Renvois amers* ou aigres. — Hoquet fréquent et violent. — *Nausées violentes, avec envie de vomir, souvent au point de s'évanouir* et généralement avec forte soif. — *Nausées fréquentes ou continuels, même le matin. — Écoulement d'eau par la bouche, comme par pituites. — **Vomissement violent, avec nausées continuels, grand épuisement et besoin de se coucher*, précédé de mains froides avec horripilation sur tout le corps, accompagné de chaleur générale et suivi de bouillonnement de sang et de chaleur aux mains. — **Vomissement des aliments.* — **Vomissement amer* ou aigre. — **Vomissement d'écume et de mucosités vert jaunâtre* ou blanches. — Vomissement de mucosités, la nuit. — *Vomissement de bile noire et de sang.* — **Vomissement continuels, avec diarrhée* et pression dans le scrobicule. — **La moindre goutte de liquide et le plus léger mouvement provoquent les vomissements.* — En vomissant, contraction douloureuse du ventre. — Douleur d'estomac, avec faim et soif ardente. — **Sensibilité excessive de la région de l'estomac et du scrobicule.* — **Angoisse excessive au creux de l'estomac.* — Vacuité et malaise dans l'estomac. — Crampe d'estomac. — *Pression dans le scrobicule*, s'étendant quelquefois jusque dans le sternum, les hypochondres et le bas-ventre, surtout après le repas. — **Sensation brûlante dans le creux de l'estomac.* — Inflammation de l'estomac.

VENTRE. — Coliques dans la région ombilicale. — **Grande sensibilité douloureuse du ventre, au toucher.* — Maux de ventre nocturnes, avec insomnie. — Gonflement du ventre. — **Ventre dur et ballonné.* — Tension dans les hypochondres et la région ombilicale. — **Crampes abdominales, et coliques.* — Maux de ventre pressifs, trectifs, le soir, en marchant. — *Tranchées comme avec des couteaux*, accompagnées de diarrhée et de soif avec diurèse. — **Sensation brûlante dans toute l'étendue du ventre*, comme par des charbons ardents. — Douleur de meurtrissure dans les entrailles. — Inflammation des intestins. — *Hernie inguinale.* — **Colique flatulente*, avec gargouillement bruyant et borborygmes dans le ventre. — Plus les flatuosités tardent à être expulsées, plus elles sortent difficilement. — Expulsion violente de vents par le haut et le bas.

SELLES. — **Constipation*, quelquefois opiniâtre, le plus souvent par inactivité du rectum, et souvent accompagnée de chaleur et de maux de tête. — Resserrement du ventre. — Selles dures et d'un moule trop volumineux. — **Diarrhées violentes et douloureuses,*

ou tout à fait indolores, souvent avec tension du ventre, précédées et suivies de tranchées. — Diarrhée de matières âcres, avec sensation brûlante à l'an. — Diarrhées nocturnes. — *Selles diarrhéiques, noirâtres, verdâtres, brunâtres. — Selles diarrhéiques sanguinolentes. — Évacuation inaperçue d'une selle liquide, en expulsant un vent. — *Pendant la selle, grande lassitude, frisson avec horripilation, pâleur du visage, sueur froide au front et anxiété, avec crainte d'apoplexie. — Sensation brûlante à l'an. — Douleur d'excoriation à l'an. — Pression vers l'an. — avec hémorroïdes aveugles. — Symptômes vermineux.

URINES. — Rétention d'urine. — Envie d'uriner, pendant que la vessie est vide, comme si l'urètre était étranglé derrière le gland. — Urine plus rare, jaune et déjà trouble lorsqu'on l'émet. — Flux d'urine, avec faim et soif ardentes, maux de tête, nausées avec envie de vomir, coliques, dureté des selles et coryza. — Écoulement involontaire des urines. — Urine âcre. — Urine foncée ou verdâtre. — Douleur pressive dans la vessie et sensation brûlante en urinant.

PARTIES GÉNITALES. — Sensibilité excessive des parties génitales. — Excoriation du prépuce. — Tractions dans les testicules. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Suppression des règles. — Avant les règles, maux de tête, vertige, épistaxis et sueur nocturne. — *Au début des règles, diarrhée, nausées et frissons. — Pendant les règles, maux de tête, le matin, avec nausées et envie de vomir, bourdonnement d'oreilles, soif ardente et douleurs dans tous les membres. — Vers la fin des règles, grincement des dents et visage bleuâtre. — *Règles supprimées, avec délire.

LARYNX. — Poitrine chargée de mucosités, avec âpreté et grattement dans la gorge. — Toux provoquée par un chatouillement, profondément dans les bronches, avec expectoration facile, ou bien sèche. — Toux violente, avec rapports continuels, comme si on allait vomir. — Toux, le soir, avec salivation. — Toux sèche, ardente, généralement le soir et le matin. — Toux, avec douleur dans le côté, faiblesse et gêne de la respiration. — Toux, creuse, profonde, comme venant du ventre, avec douleurs incisives dans l'abdomen. — En toussant, lancinations vers l'anneau inguinal. — *Toux, semblable à la coqueluche, avec vomissement. — En entrant dans un appartement chaud, toux avec expectoration jaunâtre, suivie de douleur de meurtrissure dans la poitrine. — Toux, avec expectoration abondante.

POITRINE. — Etouffement de la respiration, fréquemment, au point de suffoquer, produite généralement par une constriction spas-

modique de la gorge ou de la poitrine. — Haleine courte, au moindre mouvement. — *Dyspnée et gêne de la respiration*, même en étant assis. — *Poitrine très-oppressée*, avec douleur dans le côté, en respirant. — *Pression à la poitrine*, surtout dans la région du sternum, et principalement après avoir bu ou mangé. — Sensation de plénitude dans la poitrine, qui force à des renvois continuels. — Serrement dans la poitrine, surtout après avoir bu. — *Crampe de poitrine, avec constriction douloureuse*. — Contraction spasmodique des muscles de la poitrine. — Douleur incisive dans la poitrine. — Élançements par accès dans la poitrine, avec étouffement de la respiration. — *Battement de cœur violent, qui soulève les côtes*, avec étouffement, et accès d'angoisse de cœur excessive.

TRONC. — **Douleur de brisement aux reins et dans le dos*, avec pression tractive, surtout en se baissant et en se redressant. — Serrement entre les omoplates. — Roideur rhumatismale de la nuque, avec vertige, lorsqu'on la bouge. — *Faiblesse paralytique des muscles du cou*; ils ne peuvent plus supporter la tête.

BRAS. — *Douleur de brisement paralytique dans les bras*, depuis l'articulation de l'épaule jusque dans le poignet. — Tressaillement dans les bras. — Froideur ou sensation de plénitude et de gonflement dans les bras. — Sensation continuelle d'engourdissement des bras. — Tremblement des bras, en saisissant un objet. — Ébranlements dans le coude, comme par des étincelles électriques. — Dartre sèche à la main. — Fourmillement dans les mains et les doigts. — Engourdissement et pâlisement des doigts. — **Froid glacial aux mains*. — Tiraillement et crampes dans les doigts.

JAMBES. — Paralyisie dans l'articulation coxo-fémorale, avec gêne, en marchant. — *Douleur de brisement paralytique dans les jambes*. — Déchirement arthritique, et tractions dans les jambes et les pieds. — Sensation continuelle d'engourdissement des jambes. — Tension des tendons du jarret, comme s'ils étaient trop courts. — Douleur de brisement dans les genoux, en descendant les escaliers. — Ébranlements dans le genou, comme par des étincelles électriques. — Pesanteur excessive et douloureuse dans les genoux, les jambes et les pieds, avec marche difficile. — **Crampes violentes dans les mollets et les pieds*. — Gonflement rapide des pieds. — **Froid glacial aux pieds*. — Tremblement des pieds, avec froid, comme s'il y circulait de l'eau froide. — *Élançements dans les (gros) orteils*. — Goutte douloureuse aux pieds. — Lancinations et douleur d'excoriation dans les cors aux pieds.

233. — VERBASCUM.

VERB. — Bouillon-blanc. — HAHNEMANN. — *Dosé usité*. 30. — *Durée d'action* : 4 à 5 jours.

ANTIDOTES : Camph.

COMPARER AVEC : Plat. stann.

CLINIQUE. — On verra les cas où ce médicament pourra être consulté contre des *Toux catarrhales*, surtout chez les *enfants*, seule affection dans laquelle on l'ait jusqu'ici employé.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Paresse générale et envie de dormir, le matin, après le lever. — *Pandiculation* et bâillements fréquents. — *Déchirements*, quelquefois lancinants, à diverses parties. — Chancellement en marchant. — *Forte envie de dormir après le repas*. — Sommeil agité, la nuit, avec jactation. — Sommeil peu prolongé, la nuit, seulement jusqu'à 4 heures du matin, avec rêves anxieux, épouvantables, de guerres et de cadavres. — *Froid de tout le corps*, sensible même à l'extérieur, aux mains et aux pieds. — Horripilation, surtout d'un côté du corps, comme si on était inondé d'eau froide. — Apathie. — Morosité, mauvaise humeur et caractère irascible. — Gaieté, avec rire. — Surexcitation morale, avec images voluptueuses. — Faiblesse de la mémoire. — Distraction. — Affluence d'idées et d'imaginations.

TÊTE. — Hébéture et embarras dans la tête. — *Accès de vertige*, comme par une pression dans la tête, ou bien en pressant sur une joue. — Mal de tête, comme si tout allait sortir par le front. — *Maux de tête pressifs, étourdissants*, principalement dans le front, ou semi-latéraux, et principalement en passant de la chaleur au froid. — Pesanteur de la tête, avec douleur sourde. — Pincement dans les tempes. — Élançement étourdissant dans les tempes. — Résonnement dans la tête, en marchant.

YEUX — OREILLES. — Douleurs dans les yeux, comme par contraction des oreilles, avec ardeur dans les yeux. — Vue trouble, comme à travers un voile. — *Déchirement dans les oreilles*, quelquefois en mangeant, avec lancinations. — Sensation comme si l'oreille se rétractait. — *Surdité*, comme si quelque chose obstruait l'oreille. — Sensation d'obturation des oreilles, en lisant à haute voix.

FACE ET DENTS. — *Néuralgie faciale*, généralement avec douleurs

étourdissantes, pressives ou tensives, principalement dans les pommettes et partant de l'articulation de la mâchoire, aggravée en serrant les dents et par la pression extérieure. — Élançements dans les pommettes, avec pression sourde. — Forte tension dans les téguments du menton et des muscles masticateurs. — Odontalgie avec douleur déchirante, dans les dents molaires.

BOUCHE — **APPÉTIT.** — Accumulation abondante de salive salée dans la bouche. — Langue jaune brunâtre, chargée de mucosités visqueuses, le matin et après le dîner. — Goût fade, avec haleine fétide. — Faim sans appétence pour les aliments, qui répugnent. — Soif inextinguible.

ESTOMAC. — Régurgitation de sérosités insipides. — *Renvois à vide*, ou bien amers, avec envie de vomir. — Hoquet fréquent. — Pression à l'estomac. — Sensation de vacuité dans le creux de l'estomac, qui se dissipe par des gargouillements. — Gargouillements fréquents, sous les côtes du côté gauche. — Tranchées et élancements dans l'hypochondre gauche.

VENTRE. — Ballonnement du ventre. — *Pression forte et douloureuse, sur l'ombilic, comme par une pierre*, soulagée en se courbant. — Constriction crampoïde du bas-ventre, vers la région ombilicale. — Maux de ventre qui s'étendent profondément vers le bas, avec envie d'aller à la selle et contraction spasmodique de l'anus. — Pincements et tranchées dans le ventre. — *Élançements dans le ventre*, principalement dans la région ombilicale, quelquefois déchirants, et se dirigeant vers le bas. — Sensation comme si les intestins étaient adhérents à la région ombilicale et qu'on les arrachât.

SELLES ET URINES. — Selles supprimées. — Selles dures, comme des crottes de mouton, avec efforts. — *Besoin fréquent d'uriner, avec émission abondante.* — Pollutions.

LARYNX. — *Sensation d'obturation du larynx et du nez, avec *enrouement en lisant à haute voix. — °Catarrhe, avec enrouement et poitrine chargée. — °Toux, surtout le soir et la nuit, en dormant, généralement âpre et sèche, où creuse et sourde.*

POITRINE ET TRONC. — *Élançements dans la poitrine*, quelquefois avec oppression et étouffement de la respiration. — Tension dans la poitrine, avec lancinations dans la région du cœur, le soir, après s'être couché. — Lancinations dans le dos et les omoplates. — *Nodosité rouge près du cartilage xiphoïde, douloureuse en pressant dessus.*

EXTRÉMITÉS. — Déchirement à l'épaule, dans le dos de la main et le coude. — Pression crampoïde dans l'avant-bras, la main et le pouce. — *Élançements déchirants dans la main et les doigts.* — Douleur tensive dans le poignet. — Douleur de luxation dans

l'articulation de la main. — Douleur paralytique dans les articulations des doigts. — Pesanteur excessive et lassitude dans les jambes et les pieds, surtout en montant les escaliers. — Pression crampoïde dans les cuisses, les jambes et la plante des pieds. — Tremblement des genoux. — Lancinations sourdes dans la rotule, les os du pied et les orteils. — Déchirements le long des jambes.

234.—VINCA MINOR.

VINC. — Méon. — Médicament encore entièrement inconnu, mais qui a été employé contre des *Cruelles au cuir chevelu et à la face*, et recommandé contre la *Plaque polonoise*.

235.—VIOLA ODORATA.

VIOL-OD. — Violette de mars. — ARCHIVES DE STAFF. — *Doses usitées* : 9, 30? — *Durée d'action* : 2 à 4 jours.
ANTIDOTE : Camph.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre des souffrances *hystériques*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Relâchement de tous les muscles. — Douleurs tractives dans les membres. — Douleur de brisement dans toutes les articulations, le matin, au réveil. — Tremblement des membres. — Brûlement et chaleur fugace à diverses parties. — Les souffrances sont douces, mais cependant très-distinctes et les mêmes dans toutes les positions. — Bâillement tous les matins, avec larmolement. — On est couché sur le dos, la nuit pendant le sommeil, la main gauche passée sous la tête et les genoux pliés. — Horripilation fébrile. — Sueur nocturne. — Mélancolie sombre et tristesse. — *Humeur hystérique, avec pleurs continuels*, sans qu'on sache pourquoi. — Éloignement pour la conversation. — *Faiblesse excessive de la mémoire*, et oubli. — *Grande affluence d'idées mobiles et incomplètes*. — Perspicacité remarquable et forte activité du cerveau. — *Prédominance de l'intelligence sur le sentiment et le cœur*.

TÊTE. — Embarras sourd et douloureux dans la tête. — *Vertige tournoyant*, même en étant assis. — Céphalalgie, parfois avec crampes dans les yeux, et cercles lumineux devant la vue. — Pesanteur de la tête avec sensation de faiblesse dans les muscles de la nuque. — Congestion de sang à la tête, avec picotements dans le sinciput. — *Tension dans les téguments de la tête*, s'étendant jusque dans la face, le nez et les oreilles, forçant souvent à froncer les sourcils. — Ardeur dans le front.

YEUX. — Crampe des paupières. — *Les yeux se ferment*, comme par une sensation de sommeil dans les yeux et les paupières. — Pesanteur des paupières. — Sensation comme si le globe de l'œil était comprimé. — Ardeur et sensation brûlante dans les yeux. — Myopie. — Flamme devant les yeux.

OREILLES. — *Elancements dans les oreilles*. — Aversion pour toute espèce de musique, principalement pour le violon. — Bruissement et tintement devant les oreilles.

NEZ — SELLES. — Torpeur au bout du nez, comme s'il avait reçu un coup. — Douleur faciale, avec pression tractive aux pommettes. — *Tension dans les téguments de la face*, surtout au-dessous des yeux. — Déchirements dans la mâchoire inférieure, se dirigeant vers l'oreille. — Odontalgie, avec douleur déchirante dans les dents inférieures. — Constipation avec envie inutile d'aller à la selle. — Pollutions, suivies de maux de tête.

LARYNX — EXTRÉMITÉS. — Respiration difficile et à peine sensible, avec expiration douloureuse, angoisse excessive et battement de cœur violent. — Haleine courte. — *Forte oppression de poitrine et dyspnée*, avec pression sur la poitrine, comme par une pierre. — Tension dans les muscles du cou. — Douleur tractive dans l'articulation du coude et le dos de la main. — Douleur pressive dans le poignet.

236. — VIOLA TRICOLOR.

VIOL-TR. — Pensée. — ARCHIVES DE STAFF. — *Doses usitées* : 9, 30. — *Durée d'action* : 8 à 15 jours.

ANTIDOTE : Camph.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a employé ce médicament que contre quelques cas de *Crottes de lait*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Accablement, quelquefois comme si

on n'avait pas assez dormi. — Douleurs lancinantes dans les membres. — Éruption miliaire sur tout le corps, avec sensation lancinante, rongeante. — *Envie de dormir l'après-midi.* — Sommeil agité, avec réveil fréquent. — Sommeil tardif par affluence d'idées, avec difficulté de se réveiller, le matin. — *Rêves vifs et érotiques.* — Tressaillement des mains et rétraction des pouces, en dormant, avec rougeur de la face et chaleur sèche générale. — Disposition frileuse et froid au grand air. — Sueurs nocturnes. — Tristesse sur ses affaires domestiques. — Précipitation, comme par une angoisse interne, avec sensation de grande faiblesse. — Envie de pleurer, *mauvaise humeur, morosité*, avec éloignement pour la conversation. — Forte susceptibilité, et humeur querelleuse. — Désobéissance. — Éloignement pour le travail.

TÊTE. — Tête entreprise et embarrassée. — Vertige et étourdissement en marchant. — Céphalalgie, depuis la racine du nez jusque dans le cerveau, se dissipant en plein air. — Pesanteur de la tête, qui la tire en arrière, principalement en se redressant, soulagée en se baissant. — *Céphalalgie pressive*, surtout dans le front et les tempes. — Élançements dans l'occiput, jour et nuit. — Ébranlement du cerveau, en marchant.

YEUX. — Douleur dans les yeux, comme si un corps dur se trouvait entre la paupière supérieure et le globe de l'œil. — Cuisson et élancements incisifs et pruriants dans l'œil. — *Contraction et occlusion des paupières*, avec envie de dormir. — (Myopie.)

FACE. — Chaleur de la face, la nuit, au lit, quelquefois semi-latérale, à la joue sur laquelle on n'est pas couché. — Peau épaisse et dure à la face. — *Croutes à la face, avec prurit brûlant, surtout la nuit, et suintement d'un pus jaune et visqueux. — *Tension dans les téguments de la face et du front.* — Mal de gorge, le soir. — Langue chargée de mucosités blanchâtres, avec goût amer. — Accumulation de salive dans la bouche, avec sensation de sécheresse.

ESTOMAC. — Perte de l'appétit et insipidité des aliments. — Après le repas, chaleur générale, surtout à la face (avec sueur), oppression de poitrine et forte angoisse qui ne permet pas de rester en place. — Nausées et vomiturations.

VENTRE. — *Maux de ventre*, avec douleurs incisives, au point de pousser des cris, avec besoin d'aller à la selle et expulsion abondante de vents et de grosses masses de mucosités. — Élançements dans le ventre. — Élançements pressifs dans le diaphragme.

SELLES. — Selles avec évacuation de mucosités et abondance de vents. — *Selles molles*, comme hachées. — Selle dure. — Besoin très-pressant d'aller à la selle.

URINES ET PARTIES GÉNITALES. — *Besoin d'uriner, avec émission abondante.* — Ténésme de la vessie. — Urine brûlante. — *Urine fétide*; comme celle des chats. — Urine très-trouble. — Lancinations dans l'urèthre. — Élançements et pression dans la verge, se dirigeant vers le gland. — Sensation brûlante dans le gland. — Prurit et gonflement du prépuce. — Érections. — Pollutions. — Leucorrhée.

POITRINE — EXTRÉMITÉS. — Élançements dans la poitrine. — Oppression et lancinations dans la région du cœur, en se tenant courbé lorsqu'on est assis. — Angoisse au cœur, en étant couché, avec palpitations de cœur. — Douleur crampoïde et contraction, avec pincement dans les omoplates. — Gonflement des glandes du cou. — Lancinations dans les articulations de l'épaule, les coudes, les avant-bras et les doigts. — Douleur de brisement dans les cuisses, le matin, au réveil. — Fléchissement des genoux en marchant, avec traction dans les mollets et les cuisses. — Tressaillement des muscles dans les mollets. — Élançements dans les rotules, le tibia et les pieds.


237.—ZINCUM.

ZINC. — Zinc. — **HANNEMANN.** — *Dose usitée*: 30. — *Durée d'action*: 30 à 40 jours dans des affections chroniques.

ANTIDOTE: Camph. hep. ign. — Le zinc est l'antidote de bar-c. — Le vin, ainsi que chom. et n-vom., aggrave les souffrances.

COMPARER AVEC: Ant. arn. bell. canth. carb-veg. hep. ign. plumb. puls. sep. stram. sulf.

CLINIQUE. — Étant indiqué par l'ensemble des symptômes, ce médicament pourra quelquefois être utile dans l'un ou l'autre cas des affections suivantes : — Luxations spontanées; Paralysies; Dartres; Amblyopie amaurotique; Gonflement inflammatoire du nez; Coliques venteuses; Gravelle et calculs rénaux??; Orchite??; Disposition à l'avortement, avec varices aux parties??; Nymphomanie des femmes en couche??; etc., etc.

 *Voy. la note, page 47.*

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Déchirement dans les membres, aggravé toutes les fois que l'on s'échauffe ou qu'on se donne de l'exercice.* — Déchirement tractif dans la cavité des os, avec douleur tellement forte que les membres n'ont aucun soutien. —

Douleur d'excoriation. — Douleur crampoïde et crampe dans les membres. — Frémissement visible et tressaillement à diverses parties des muscles. — Fourmillement dans les membres. — Varices. — Douleurs qui semblent quelquefois être entre cuir et chair. — *Les symptômes sont aggravés* extraordinairement par la camomille, la noix vomique et le vin, substances qui les provoquent aussi, particulièrement l'agitation nocturne et la constipation. — *La plupart des symptômes se manifestent après le dîner et vers le soir.* — Insensibilité générale du corps. — *Sensation de froid dans les os. — Pulsation violente dans tout le corps. — *Tremblement violent de tout le corps*, particulièrement après toute émotion morale. — *Pesanteur, lassitude et faiblesse excessive*, principalement *en marchant ou le matin au réveil.* — *Répugnance pour le mouvement.

PEAU. — Prurit dans les articulations. — Prurit avec lancinations violentes, surtout le soir, au lit, se dissipant immédiatement au toucher. — Fourmillement entre cuir et chair. — Éruptions chroniques. — *Dartres et ulcères dartreux.* — *Ganglions, engelures et disposition des parties externes à se geler. — Rhagades. — Petits furoncles.

SOMMEIL. — *Sommeil le jour et envie continuelle de dormir*, surtout **le matin*, ou après le repas, *avec besoin de bâiller.* — Sommeil tardif. — Sommeil agité, avec réveil fréquent. — **Sommeil non réparateur.* — **Rêves fantastiques*, effrayants, agités, ou dégoûtants et épouvantables, avec paroles et cris pendant le sommeil. — Froid excessif aux pieds, la nuit. — Secousses dans le corps, pendant le sommeil, et sursauts fréquents.

FIÈVRE. — Horripilation fébrile le long du dos. — Frissonnement continu, avec accroissement de chaleur intérieure. — *Horripilation fébrile*, avec chaleur fugace; *tremblement violent des membres*, haleine courte et chaude, et pulsation dans tout le corps. — *Besoin de transpirer le jour. — *Sueurs nocturnes.

MORAL. — Humeur hypochondriaque. — *Pensées de mort, comme si la fin était prochaine. — Peur de voleurs ou de spectres effrayants. — *Humeur chagrine, maussade*, avec *éloignement pour la conversation*, surtout le soir. — On est fortement affecté par la conversation ou un bruit quelconque. — Irascibilité et impatience. — *Disposition à l'emportement*, et grand malaise lorsqu'on s'y abandonne. — **Aversion pour le travail.* — *Humeur variable*, avec tristesse vers midi et joie le soir, et *vice versa.* — Faiblesse de la mémoire. — Oubli. — Absence d'idées. — Conception difficile. — Idées incohérentes.

TÊTE. — Embarras et obnubilation continuelle dans la tête. — *Vertige*, dans la profondeur du cerveau, principalement *dans l'occi-*

put, au point de faire tomber de côté. — Vertige, comme si le siège chancelait, le matin, en se redressant au lit. — Vertige étourdissant, avec obscurcissement de la vue et faiblesse générale. — Céphalalgie, la nuit ou le soir après s'être couché. — Maux de tête après avoir bu du vin. — Accès de céphalalgie, avec nausées et vomissement. — *Céphalalgie pressive*, principalement *le matin et dans le front*, avec embarras, ou bien dans les tempes et l'occiput. — Térébration compressive ou pression expansive dans la tête. — *Traction dans l'occiput et le front*. — Élançements et *déchirement dans la tête*, surtout *dans les côtés*, les tempes, le front et l'occiput, *aggravés après le dîner*. — Douleur d'excoriation dans la tête. — Douleurs pulsatives dans la tête. — Bourdonnement dans la tête. — Les maux de tête sont soulagés au grand air et aggravés dans l'appartement. — Prurit, et *sensation d'excoriation au cuir chevelu*, ou bien *douleur d'ulcération. — Sensation comme si les cheveux se hérissaient. — *Calvitie.

YEUX. — Douleur dans les yeux, le soir, après s'être couché ou avoir bu du vin. — *Pression sur les yeux*, ou sensation, comme s'ils étaient enfoncés dans la tête. — Déchirement pressif et lancinant dans les yeux. — Prurit, cuisson et *sensation d'excoriation dans les yeux*, les paupières et les angles internes. — Brûlement et inflammation des yeux et des paupières. — Rougeur et inflammation de l'angle interne des yeux, avec suppuration. — *Sécheresse des yeux. — Chute et *paralysie* des paupières supérieures. — Pupilles contractées. — Flocons lumineux devant les yeux, en regardant en l'air.

OREILLES. — **Otalgie*, avec *lancinations déchirantes*, et gonflement extérieur, surtout chez les enfants. — Écoulement de pus fétide par les oreilles. — Bourdonnement d'oreilles.

NEZ. — *Douleur d'excoriation* dans l'intérieur du nez. — Pression pénible à la racine du nez, comme un serrement. — **Gonflement du nez*, intérieur et extérieur, quelquefois aussi d'un seul côté, avec perte de l'odorat. — Obturation du nez. — Coryza fluent, avec enrouement et sensation brûlante dans la poitrine.

FACE. — Teint pâle, terreux. — Air sombre, égaré. — Déchirement et *douleur de brisement dans les os de la face*. — Gerçure des lèvres et des commissures des lèvres, avec ulcération intérieure. — Mucosités épaisses, visqueuses sur les lèvres. — Éruption pruriente et rougeur au menton.

DENTS. — Odontalgie pendant la mastication. — *Odontalgie déchirante*, lancinante ou tractive, surtout dans les dents molaires. — **Douleur d'excoriation aux dents*. — Vacillement des dents. — Saignement abondant des dents et *des gencives. — Gencives

blanches, gonflées, avec douleur d'excoriation. — Ulcères aux gencives.

BOUCHE. — Ulcères dans la bouche, petits, jaunes, à la face interne des joues. — Fourmillement à la face interne des joues et *sécrétion abondante de salive*, avec goût métallique. — Vésicules sur la langue.

GORGE. — Déchirements tractifs dans le fond du gosier, plus souvent hors que pendant le temps de la déglutition à vide. — Sensation de rétrécissement et *crampe dans l'œsophage*, dans la région de la fossette du cou. — Sécheresse et âpreté dans le palais et la gorge, avec cuisson et grattement. — *Douleur d'excoriation dans la gorge.* — *Accumulation abondante de mucosités dans la gorge.*

APPÉTIT. — Goût de sang dans la bouche. — **Goût salé dans la bouche.* — Forte soif. — Diminution de l'appétit. — Faim vive et *voracité insatiable.* — Répugnance pour la viande (le veau), les douceurs, le poisson et les aliments cuits et chauds. — Après avoir mangé du pain, pression de l'estomac, avec nausées. — Après le repas, humeur hypochondriaque, avec pression sous les fausses côtes, étouffement, griffement dans le ventre, et plénitude, pression, ou brûlement dans l'estomac.

ESTOMAC. — Renvois avec douleur pressive dans la poitrine. — *Renvois aigres*, après le repas, surtout *après avoir pris du lait.* — *Pyrosis, après des choses sucrées.* — Hoquet, surtout après le déjeuner. — Nausées, avec vomiturition et vomissements de mucosités amères, renouvelés par le plus léger mouvement. — Vomissement de sang. — Pression à l'estomac. — Sensation pénible au cardia et le long de l'œsophage. — Serrement et pression dans le scrobicule. — Déchirement et élancements dans le scrobicule. — *Sensation brûlante dans l'estomac.*

VENTRE. — *Douleurs crampoïdes dans les hypochondres*, alternant avec oppression de poitrine. — *Forte pression dans les hypochondres* et les côtés du ventre, aggravée par le mouvement et la marche. — Serrement, pression et élancement dans la région hépatique. — *Élancements dans la région de la rate.* — Pression, *élancements et douleur d'excoriation dans la région des reins.* — Maux de ventre, le soir, après s'être couché. — *Forte pression et tension dans le ventre* (et les côtés), avec ballonnement. — Sensation de malaise produite par une pression sur les parois intérieures du tronc, comme provenant des nerfs, sans flatuosités. — Douleur crampoïde dans la région ombilicale. — Serrement dans le ventre. — Tranchées et pincements dans le ventre, avec diarrhée. — Déchirements et élancements dans le ventre. — **Accumulation abondante de flatuosités*, avec grondement et borbo-

rygmes dans le ventre, surtout après le repas. — *Colique flatulente*, surtout le soir. — Expulsion fréquente de vents chauds et putrides. — *Hernie inguinale*.

SELLES. — **Constipation*. — Selles dures, sèches, insuffisantes, évacuées souvent avec efforts violents. — **Selles diarrhéiques*, molles, de la consistance de la bouillie, ou liquides, et souvent avec écoulement d'un sang rouge vif. — *Évacuation involontaire. — Pendant et après la selle, maux de ventre. — Déchirements, élançements, brûlement, *sensation d'excoriation et prurit violent à l'anus*. — *Fourmillement à l'anus*, comme par des vers.

URINES. — **Rétention d'urine*, en commençant à uriner. — Forte pression de l'urine sur la vessie. — Émission d'urine douloureuse. — **Émission d'urine involontaire*, **surtout en marchant*, en toussant ou en éternuant. — Émission fréquente d'une urine jaune clair, qui dépose ensuite un sédiment blanc, floconneux. — En reposant, l'urine devient trouble, bourbeuse. — Urine sanguinolente. — Sensation brûlante pendant et après l'émission de l'urine. — *Douleurs incisives à l'orifice de l'urètre*. — *Écoulement de sang par l'urètre*.

PARTIES GÉNITALES. — **Testicules rétractés*, gonflés et douloureux. — Traction dans les testicules et le long du cordon spermatique. — *Douleur d'excoriation au scrotum*. — Racornissement du scrotum et horripilation à cette partie. — Forte excitation au coït, avec *éjaculation difficile ou trop prompte*. — Érections permanentes, la nuit. — Écoulement de liqueur prostatique.

RÈGLES. — *Sensibilité excessive des parties génitales*. — Sensation comme si tout se portait vers les parties génitales. — Suppression des lochies. — **Règles trop hâtives ou supprimées*. — Retard des règles. — **À l'apparition des règles*, coliques spasmodiques. — **Pendant les règles*, ballonnement du ventre, tranchées et pression vers le ventre et les reins, avec grande pesanteur et lassitude dans les jambes. — *Leucorrhées d'un mucus épais*, quelquefois précédée de maux de ventre. — Douleur d'excoriation aux mamelons. — Suppression du lait.

LARYNX. — *Apreté et sécheresse dans la gorge* et la poitrine, surtout le matin et après le dîner. — Expulsion d'un sang noir, en renâclant. — *Toux sèche*, même la nuit, avec lancements et douleur dans la poitrine, comme si elle allait se briser. — Toux avec expectoration de mucosités visqueuses, suivie d'une sensation de froid et d'excoriation dans la poitrine, comme si elle était à vif. — *Toux, avec expectoration de sang*, sensation brûlante et douleur d'excoriation dans la poitrine.

POITRINE. — Gêne de la respiration et oppression, avec douleur

pressive dans la poitrine, surtout le soir. — *Dyspnée spasmodique*. — Haleine courte, par des flatuosités, après le repas. — *Poitrine chargée de mucosités*. — *Pression à la poitrine*. — °Douleur tensile au sternum. — Déchirements dans la poitrine. — *Élancements dans la poitrine*, surtout *dans la région du cœur*. — Sensation brûlante dans la poitrine. — **Battement de cœur*, avec et sans angoisse. — °Mouvements irréguliers du cœur. — °Secousses au cœur et intermittence des battements *avec étouffement*.

TRONC. — **Douleurs aux reins*, surtout en marchant et en s'asseyant. — Sensation de faiblesse paralytique dans le dos et aux reins. — **Douleurs rhumatismales dans le dos*. — Dartre pruriente au dos. — Tension et élancements dans et entre les omoplates. — *Déchirements* lancinants, roideur et tension dans la nuque et le cou.

BRAS. — **Traction rhumatismale et déchirement lancinant dans les épaules, les bras*, les coudes, les articulations de la main, les mains et les doigts. — °Sensation douloureuse de paralysie dans les bras. — Furoncles au bras. — *Pâlisement et paralysie des mains*. — Faiblesse et *tremblement des mains*, en écrivant. — °Taches dartreuses, râpeuses et pruriantes aux mains. — *Peau sèche, avec rhagades aux mains. — Gerçures entre les doigts. — °Engourdissement des doigts, le matin en se levant.

JAMBES. — Tractions rhumatismales et *déchirements dans les jambes*, les genoux, les articulations du pied et les pieds. — Varices aux cuisses et aux jambes. — Douleur tensile dans les genoux. — Douleurs nocturnes dans les genoux. — Sensation comme si le sang ne circulait pas dans les jambes. — Traction et roideur tensile dans les mollets, en marchant. — Fourmillement dans les mollets. — Inflammation érysipélateuse et gonflement du tendon d'Achille. — °Roideur de l'articulation du pied, après avoir été assis. — Douleur de luxation dans les articulations du pied et des orteils. — Sensation brûlante dans les pieds. — Gonflement inflammatoire des pieds. — Faiblesse et tremblement des pieds. — Paralysie des pieds. — *Engelures douloureuses aux pieds. — Prurit, chaleur, rougeur et gonflement des orteils, comme s'ils étaient gelés. — Lancinations pulsatives dans les orteils.

238.—ZINCUM OXYDATUM.

ZINC-OX. — Oxyde de zinc. — Hyggée XIV. — *Durée d'action?*
 ANTIDOTES?

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tension dans les muscles, et sensation douloureuse au mouvement; tout le corps est douloureux, mais moins dans le repos; douleurs dans tous les membres. — *Tiraillement dans les membres*, quelquefois avec maux de reins. — *Déchirements dans les membres.* — Fourmillement parcourant tous les membres. — Mouvement d'ondulation dans quelques muscles. — *Tremblement des membres*, quelquefois avec tressaillement des muscles des jambes. — *Faiblesse* et lassitude dans les membres. — *Accablement* de tout le corps, quelquefois avec lassitude. — *Affaissement sensible des forces*, quelquefois avec malaise général intérieur. — Parler et entendre parler fatigues. — Turgor vital sensiblement diminué.

SOMMEIL. — Nuit très-agitée. — *Sommeil agité*, avec affluence de rêves de toutes natures; avec rêves de feu, de chute et de fausse monnaie; avec imaginations, et vers le matin moiteur générale.

FIÈVRE. — *Sensation de froid*: aux extrémités; continue, avec malaise général; suivi de mouvement fébrile par tout le corps, avec horripilation et tiraillements dans le dos; avec frisson sur tout le corps. — Frisson parcourant tout le corps. — Froid aux mains et aux pieds. — *Horripilation sur tout le ventre*, avec vomiturition. — *Pouls*: petit et dur, quelquefois à un haut degré; *spasmodique*, et quelquefois en même temps petit; tendu, accéléré, irrégulier, dur et sourd. — *Transpiration*, surtout vers le matin, quelquefois en dormant.

MORAL. — Angoisse, agitation, comme si on avait commis un crime. — *Mauvaise humeur*, quelquefois extrême. — Incapacité de s'occuper sérieusement. — Rire spasmodique (sardonique).

TÊTE. — Embarras de la tête: en se réveillant, avec vertige; avec pression dans le front; dans l'occiput, avec pesanteur; vertigineux; fort, avec chaleur fugace. — *Vertige*, quelquefois avec chaleur fugace. — *Céphalalgie*: avec léger vertige; *tension dans le front*, quelquefois avec pression; la nuit, élancements et déchirements dans le côté droit de la tête, au-dessus de la tempe.

OREILLES — NEZ. — Dans les oreilles, pulsation et bruit, surtout dans la gauche, avec augmentation d'un cérumen liquide et ouïe

dure. — Dans le nez, chatouillement et besoin d'éternuer. — *On ne peut pas respirer par le nez* (nez bouché), avec anxiété et oppression, ou bien comme dans un fort coryza. — *Coryza*, aggravé après le repas, avec manque de respiration, et sécrétion nasale.

FACE — DENTS. — *Teint pâle; tressaillement convulsif des muscles de la face*, quelquefois avec nausées continuelles; ou bien surtout des sardonien, avec envie de rire continuelle. — *Lèvres sèches*. — *Dents* comme émoussées, en les serrant, les incisives semblent être molles et collées ensemble.

BOUCHE — GORGE. — Dans la *bouche*, affluence d'une eau acide et amère; fréquent afflux de salive avec envie de vomir; salivation plus abondante. — Dans la *gorge*, pression; accumulation de mucosités, avec chatouillement dans le larynx.

APPÉTIT — GOUT — SYMPTÔMES GASTRIQUES. — *Anorexie*: totale, avec forte soif; au déjeuner, avec dégoût, améliorée après le repas. — Dégoût que l'on peut surmonter. — *Soif ardente*. — Grand désir d'eau froide, qui soulage beaucoup. — *Renvois fréquents*: à vide; amers; après avoir pris du bouillon, avec hoquet. — *Régurgitations*: d'une eau jaune, amère, bilieuse, après le repas; d'une eau acidulée, avec renvois et nausées. — *Hoquet violent*, cessant après une régurgitation de bile. — *Nausées*: après le souper; venant de l'estomac, avec goût acidulé dans la bouche, et afflux d'eau acide; avec chaleur, suivies de vertige, avec chaleur fugace, pouls spasmodique et abattement général. — *Envie de vomir, avec dégoût et nausées*. — Vomiturition, avec renvois et besoin d'aller à la selle. — *Vomissement*: souvent subits et inattendus, chez des enfants; d'une eau muqueuse, à la suite de nausées, puis de nouveau envie de vomir et enfin les maux de tête se dissipent; *vomissements bilieux*, quelquefois très-forts, jaunes et amers; vomissements et diarrhée.

ESTOMAC. — *Pression à l'estomac*: après le souper, avec renvois; *spasmodique, quelquefois surtout au creux de l'estomac*, ou bien avec tension et sensibilité de l'estomac; *brûlement dans la région stomacale*, quelquefois avec dégoût. — *Plénitude d'estomac*, quelquefois avec sueur aux mains et à la tête, suivie de vomissement léger du contenu de l'estomac, un peu âcre et provoquant un brûlement des parties au contact; la gorge aussi conserve encore longtemps après de la rudesse et enfin fort appétit. — Élançements dans le *diaphragme*.

VENTRE, SELLES. — *Coliques* au-dessous de l'ombilic, déchirantes, d'un côté à l'autre, jusqu'au soir; douleur sourde dans la région ombilicale; tiraillement crampoïde dans le ventre, avec douleur sourde. — Élançements dans la région hépatique. — Pincements

dans le ventre. — *Ballonnement* du ventre. — *Borborygmes* dans le ventre, quelquefois avec pression. — *A l'extérieur, furoncle* au-dessus des parties génitales, d'abord rouge, puis bleu foncé, avec auréole dure, et plus tard jetant un pus jaune, sale, sur quoi l'auréole reste encore longtemps rouge et dure. — *Selles liquides*: avec ténésme et pincements dans le ventre; *biliéuses*, quelquefois précédées de pincements dans le ventre et suivies d'une amélioration notable de tous les symptômes.

LARYNX, POITRINE. — Dans le *larynx*, accumulation de mucosités abondantes, avec sécheresse de la gorge et besoin continu de rênâcler avec salive visqueuse et muqueuse. — *Respiration* gênée, surtout au poumon gauche; gênée, difficile. — Forte oppression de poitrine. — Constriction de tout le thorax. — *Sensation spasmodique*, dans les poumons et le cœur. — Pression spasmodique dans la poitrine et le creux de l'estomac. — *Élancements dans le côté gauche de la poitrine*, quelquefois avec pression, ou bien avec mamelon gauche douloureux. — L'aile gauche du poumon est affectée. — *Palpitations de cœur*, fréquentes, avec angoisse, quelquefois surtout le soir et avec pouls spasmodique; *pulsations* du cœur plus nombreuses. — Sensation de pression; pesanteur et tension spasmodique au cœur même. — *A l'extérieur*, les côtes sont douloureuses au toucher.

EXTRÉMITÉS. — *Mauv de reins*: la nuit en se retournant dans le lit; en se baissant, jusque dans les lombes. — Sensation de paralysie jusque dans les hanches. — *Entre les épaules*, déchirements, élancements, ou bien douleurs jusque dans les reins et le sacrum. — Battement au-dessous de l'omoplate gauche. — Pression sur les deux épaules, au réveil, avec embarras de la tête. — *Bras: comme brisés*, quelquefois surtout dans le deltoïde, ou bien dans le pli du coude gauche; *dans le pli du coude gauche*, pesanteur et pression paralytique. — *Aux extrémités inférieures*: faiblesse permanente, *douleur de brisement*, quelquefois surtout dans la jambe gauche, ou bien dans les articulations de la hanche et du genou; pulsations dans la *fesse gauche*; tension dans la jambe gauche; dans l'articulation du *genou gauche*; fourmillement fréquent, *dans le pied gauche*; tiraillements dans les os; tremblement des pieds.

239.—ZINCUM SULFURICUM.

ZINC-S. — Sulfate de zinc. — Médicament entièrement inconnu, mais qui a été employé contre une espèce de *Danse de Saint-Gui*.

240.—ZINGIBER.

ZINC. — Gingembre. — ARCHIVES DE STAFF. — Médicament encore très-peu connu.

SYMPTOMES. — Douleurs tractives et pressives dans la tête, surtout au sinciput. — Pression dans les yeux, comme par du sable. — Obturation du nez, avec grande sécheresse du nez et des fosses nasales. — Fourmillement pruriant, insupportable, dans les narines. — Sensibilité douloureuse des dents, avec douleur pressive, tractive, dans les racines. — Le pain cause des douleurs à l'estomac et à la tête. — Maux de ventre contractifs, avec envie d'aller à la selle. — Toux excitée par une cuisson brûlante dans le larynx, et parfois avec expectoration de matières épaisses. — Douleur de meurtrissure aux reins. — Fourmillement brûlant et picotant aux pieds. — Tiraillement rhumatismal sur le dos des mains. — Chaleur dans la paume des mains et au visage. — Endolorissement des talons en restant longtemps debout.

241.—MAGNES ARTIFICIALIS.

MGS. — Aimant artificiel. — HARNEWANN. — *Emploi* : Le malade touche le pôle Nord ou le pôle Sud pendant une minute, du bout d'un doigt. — *Durée d'action* : 10 à 14 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES : Ign. zinc. et le pôle opposé.

A. — MAGNETIS POLI AMBO.

MCS. — Les deux pôles de l'aimant, sans distinction.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Sensation brûlante dans les membres et les articulations. — Lancinations brûlantes dans les parties charnues. — Douleur de luxation dans les membres. — *Douleurs de brisement dans les articulations*, surtout le soir et le matin au lit, et principalement pendant le mouvement. — *Lancinations brûlantes à travers* toutes les parties du corps, dans différentes directions. — Horripilation qui traverse tout le corps. — *Ébranlement dans le corps*, avec frayer ou secousses qui le font fléchir et se redresser violemment, quelquefois avec perte de connaissance. — Tendance de toutes les anciennes plaies à saigner de nouveau. — Ulcères douloureux, comme de nouvelles plaies. — Petits furoncles. — Petites pustules, avec douleur lancinante, tractive.

SOMMEIL. — Sommeil agité, avec paroles, ronflement et jactation continue. — Veilles depuis 3 heures du matin; on tombe dans une *somnolence engourdissante vers le lever du soleil*. — On est couché sur le dos, la main sur l'occiput, les jambes écartées et la bouche à moitié ouverte, avec respiration ronflante. — Rêves érotiques, lascifs. — Tressaillement du corps, avant de s'endormir. — Après le réveil, le matin, maux de tête, avec douleur de brisement dans toutes les articulations, qui force à changer constamment la position des membres. — La nuit et le matin au lit, chaleur sèche, avec besoin de se découvrir.

MORAL. — Précipitation affairée. — Distraction. — Irrésolution. — Inadvertance. — Disposition à la colère et à l'emportement.

TÊTE. — Vertige, surtout le soir, après s'être couché, comme si on allait tomber, ou bien comme une secousse dans la tête. — Vertige avec chancellement en marchant; il semble que les objets se balancent devant les yeux. — Maux de tête par tension de la mémoire et de la réflexion. — Douleur de meurtrissure dans la tête, le matin, au réveil. — Maux de tête fouillants, étourdissants, se dissipant immédiatement par des mouvements de flatuosités. — *Céphalalgie, comme si on enfonçait un clou*, ou comme par une plaie, surtout après s'être fâché. — Déchirement tressaillant dans la tête, apparaissant par intervalles. — Bourdonnement dans la tête.

YEUX — NEZ. — *Prurit aux yeux*, surtout aux paupières. — Pupilles dilatées. — Scintillement de lueurs blanchâtres, en dehors du rayon visuel, au crépuscule. — Étincelles devant les yeux. — Bourdonnement d'oreilles. — Diminution de l'ouïe. — Aberration de l'odorat; on sent une odeur de fumée ou de moisi.

FACE. — Sueur à la face, sans chaleur, le matin. — Déchirement tressaillant dans la mâchoire supérieure. — Forte lancination brûlante dans les muscles de la face, le soir. — Gonflement des lèvres, le soir, avec salivation. — Petits boutons, avec douleur de plaie sur les lèvres.

DENTS. — Odontalgie, après avoir bu froid, ou par le contact de l'air froid. — Odontalgie pressive, tressaillante, par secousses isolées. — Odontalgie dans les dents cariées, avec gonflement des gencives.

APPÉTIT. — Haleine fétide. — Goût métallique dans la bouche. — Insipidité du tabac et de la bière. — Goût de moisi de diverses choses. — Satiété prompte. — Faim prononcée, le soir.

ESTOMAC. — Renvois avortés. — Renvois avec odeur et goût de râclure de corne. — Régurgitation d'aigreur, en se baissant. — *Pression à l'estomac*, avec crampes se dirigeant vers les parties supérieures, agitation qui ne permet de rester nulle part, pesant de la langue, pâleur du visage et froid du corps.

VENTRE. — Pression et plénitude anxieuse dans le ventre, surtout pendant une tension d'esprit. — Grondements bruyants et borborrygmes dans le ventre. — Production abondante de flatuosités. — Colique flatulente. — Expulsion de flatuosités, avec pression douloureuse.

SELLES. — Constipation, comme par rétrécissement du rectum. — Diarrhée sans douleur, avec flatuosités. — Douleur hémorrhoidale, cuisante à l'anus, après la selle, avec constriction dans le rectum. — Hémorroïdes aveugles. — *Chute du rectum.

PARTIES GÉNITALES. — Sensation brûlante dans la région des vésicules spermatiques, qui excite au coït. — Défaut d'intensité de l'appétit vénérien et répugnance pour le coït. — Érection, sans pensées érotiques. — Rétraction du prépuce derrière le gland. — Gonflement de l'épididyme, avec douleur pendant le mouvement et au toucher. — Règles trop hâtives, trop abondantes et de trop longue durée.

POITRINE. — Quintes de *toux sèche*, la nuit. — Toux crampoïde, surtout après minuit, en veillant ou en réfléchissant. — Dyspnée nocturne, provoquée par des mucosités dans la trachée-artère, qui, le matin, se détachent facilement. — Lancinations brûlantes, insupportables, dans les muscles de la poitrine.

TRONC ET EXTRÉMITÉS. — Tressaillement dans l'épine dorsale,

comme par quelque chose de vivant. — Sensibilité douloureuse de l'articulation du sacrum, le matin, au lit, en étant couché sur le côté, ou le jour, en se courbant. — Douleur de luxation dans l'articulation de l'épaule, ou comme le soubresaut d'un tendon, au poignet. — Douleurs tractives dans les articulations et les muscles des bras, souvent depuis la tête jusque dans les doigts. — Tressaillement déchirant dans les muscles du bras, après avoir séjourné au froid. — Taches rouges dans la paume des mains, comme des vésicules. — Accès de crampes dans les mollets et les orteils, le matin, après le réveil. — Lancinations brûlantes dans les talons et les cors aux pieds.

B.—MAGNETIS POLUS ARCTICUS.

MGS-ARC. — Pôle Nord de l'aimant.

ANTIDOTES : Mgs-aus. ign. zinc.

CLINIQUE. — On a jusqu'ici employé ce remède contre : — *Surexcitation nerveuse*; *Odontalgie nerveuse*; et Prodromes d'une hernie inguinale.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande lassitude et courbature dans tout le corps, avec abattement, surtout le matin et en plein air, comme quand il fait un temps étouffant. — Sensation tractive dans le périoste de tous les os, comme au début d'une fièvre intermittente. — Lancinations fouillantes qui sont d'autant plus douloureuses qu'elles sont plus profondes, à diverses parties du corps. — Secousses lancinantes, battement, tremblement, froid et sensation comme si le sang se portait vers les parties touchées par l'aimant. — *Surexcitation, avec tremblement, agitation inquiète dans les membres, et grande faiblesse nerveuse.* — Fourmillement et prurit lancinant à la peau. — Sensation brûlante ou déchirement brûlant dans les dartres. — *Panaris.*

SOMMEIL. — Bâillements violents, spasmodiques, avec douleur dans l'articulation maxillaire, comme si elle allait se luxer. — **Forte envie de dormir le jour.* — *Somnolence.* — Sommeil profond, la nuit, pendant lequel on est généralement couché sur le dos. — Affluence de rêves vifs (quelquefois lascifs) et chants, pendant le sommeil. — Réveil, le soir, après qu'on s'est endormi, par une secousse violente dans la tête et les muscles du cou. — Jactation

pendant le sommeil, avec chaleur pénible et besoin de se découvrir, sans soif. — Le matin, réveil incomplet, avec pleine conscience de soi-même, mémoire vive, grande affluence d'idées et réflexions sur un sujet important.

FIÈVRE. — Sensation de froid ou fraîcheur sur tout le corps. — *Disposition frileuse.* — Fraîcheur dans les mains, avec sueur fraîche à ces parties et sur tout le corps. — Horripilation suivie de chaleur de courte durée et de gonflement des veines des mains. — Sensation de chaleur sur tout le corps avec mains froides et froid aux extrémités inférieures.

MORAL. — Maussaderie et envie de pleurer, *avec frisson.* — *Caractère doux, soumis.* — Paresse, comme si on avait perdu la faculté de se mouvoir, en étant assis. — Irrésolution, suivie d'une prompte exécution de ce qu'on a enfin résolu. — On parle haut, tout seul, pendant ses occupations. — Humeur changeante. — *Hésitation anxieuse et caractère inquiet.* — Perte des sens. — Perte des idées. — Faiblesse de la mémoire. — On se trompe facilement en écrivant.

TÊTE. — Vertige, comme par ivresse, avec chancellement en se promenant en plein air et manque de solidité en se tenant debout. — Tiraillement semi-latéral avec vertige, depuis le milieu de la tête jusque vers les oreilles, comme le balancier d'une pendule. — Céphalalgie en levant et en remuant les yeux. — Céphalalgie déprimante, comme par un fardeau. — Céphalalgie comme si le cerveau allait éclater. — Tension des téguments de la tête, comme s'ils étaient trop adhérents au crâne.

YEUX. — Yeux proéminents et fixes. — *Froid glacial des yeux* (faibles). — Mouvements inquiets des yeux. — Lancinations, prurit et traction tressaillante dans les paupières, avec larmoiement. — Sensation de sécheresse douloureuse des paupières, le matin, au réveil.

OREILLES ET NEZ. — Bruissement dans les oreilles, et chaleur intérieure, comme par de l'eau bouillante. — Surdité comme si on avait un bandeau sur l'oreille. — Aberration de l'odorat, comme si l'on sentait des œufs pourris, ou du plâtre frais et de la poussière. — Épistaxis, précédée de céphalalgie pressive dans le front. — Rougeur et chaleur du bout du nez, suivie de taches rouges, chaudes et fortement circonscrites, sur les joues.

FACE. — Pâleur du visage. — Tension à la face. — Serrement douloureux dans l'articulation des mâchoires, avec sensation pendant le mouvement, comme si elles étaient luxées. — **Gonflement d'une seule joue.* — Trismus.

DENTS. — **Odontalgie dans les dents cariées*, par intervalle, comme si on les arrachait. — **Douleurs dans les dents cariées avec gen-*

cives gonflées et douloureuses au toucher. — *Douleurs dans les dents (cariées), augmentées après le repas, et à la chaleur, soulagées au grand air et en marchant. — *Odontalgie, avec joues rouges, chaudes, gonflées. — *Odontalgie avec secousses qui traversent le périoste de la mâchoire, ou avec douleurs tractives, pressives, ou bien déchirantes, fouillantes, ou brûlantes, lancinantes. — Dents incisives agacées, en respirant par la bouche. — Torpeur et insensibilité des gencives après la cessation des maux de dents.

ESTOMAC. — Perte du goût. — Goût acidulé dans la bouche. — Goût amer du tabac. — Renvois à vide, fréquents. — *Pyrosis* continue, surtout après le souper. — Voracité le soir.

VENTRE. — Production abondante et incarceration de flatuosités. — Colique flatulente, pressive. — Secousses dans l'abdomen, comme si quelque chose y tombait, ou coups partant du ventre et remontant dans la poitrine et jusque dans la gorge. — *Ballonnement du ventre.* — *Pression et térébration vers l'anneau inguinal, comme pour une descente, avec relâchement de l'anneau inguinal.

SELLES — RÈGLES. — **Resserrement opiniâtre du ventre* et constipation. — Selle dure, d'un moule volumineux, difficile à évacuer, souvent précédée de douleurs tractives, dysentériques, dans le bas-ventre. — Sécrétion plus abondante d'urine. — Urine forcée. — *Érections immodérées*, avec *pollutions fréquentes.* — Excitation au coït. — *Règles trop faibles.* — Suppression des règles.

LARYNX. — Toux suffocante, sèche, asthmatique, aggravée par la marche en plein air. — *Toux spasmodique, ébranlante, le soir, en s'endormant*, empêchant de dormir. — Toux spasmodique, suffocante, vers minuit, produite par une irritation dans les bronches, ébranlant la tête et tout le corps, et provoquant la chaleur jusqu'à ce qu'il s'ensuive une sueur générale, avec cessation de la toux. — Besoin continuel de tousser, le soir, qui ne se peut dissiper qu'en retenant la toux.

TRONC — EXTRÉMITÉS. — Douleurs de brisement dans le dos, en le renversant. — Craquement dans les vertèbres cervicales pendant le mouvement. — Inflammation du dos de la main, avec douleur pulsative. — Pesanteur dans les bras, les mains et les doigts. — Douleur de brisement dans l'articulation coxo-fémorale et les membres inférieurs. — Grande lassitude dans les membres inférieurs; on dirait qu'ils vont se briser, en marchant. — Douleur d'excoriation dans les orteils et les cors aux pieds.



C. — MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.

MGS-AUS. — Pôle Sud de l'aimant.

ANTIDOTES : Mgs-arc. ign. zinc.

CLINIQUE. — On a jusqu'ici employé ce remède contre : État paralytique du col de la vessie; Impuissance; Varices des femmes enceintes et Panaris.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tractions dans les doigts, les articulations des doigts et des pieds et les malléoles. — Douleurs lancinantes, pulsatives dans les racines des ongles, comme si elles allaient entrer en suppuration. — Douleurs avec pincements ou lancements brûlantes, à diverses parties du corps. — Douleur de brisement dans les membres et leurs articulations, comme si on était couché sur des cailloux. — Disposition à prendre des refroidissements. — Disposition du nez, des oreilles, des mains et des pieds à se geler par un froid peu intense. — Lassitude subite en se promenant, avec anxiété et chaleur, ou besoin subit de dormir.

SOMMEIL. — Forte envie de dormir, le soir et le matin; on ferme les yeux, sans pouvoir s'endormir. — Insomnie, avec surexcitation avant minuit. — Rêves confus, effrayants. — Rêves prolongés sur un même sujet, avec fatigue de la méditation. — Expiration lente, bruyante, ronflante, avant minuit; après minuit, il en est de même de l'inspiration. — On est couché sur le dos pendant la nuit. — Le matin, congestion sanguine à la tête, qui force à être couché la tête haute.

FIÈVRE. — Horreur excessive du grand air, lequel pénètre jusqu'à la moelle des os, lors même qu'il fait chaud, avec mauvaise humeur et envie de pleurer. — Horripilation, avec obscurcissement devant les yeux, tremblement et jactation des membres, sans frisson, suivi de chaleur à la tête et à la face.

MORAL. — *Morosité et mauvaise humeur, avec éloignement pour la conversation. — Éloignement pour la société et les visages riants. — *Emportement et colère.* — Instabilité des idées.

TÊTE ET GORGE. — Vertige, comme par ivresse, avec chancellement en marchant. — Pesanteur, fourmillement et fouillement dans la tête. — Secousses dans la tête, quelquefois avec déchirement. — Sécheresse et cuisson aux paupières, surtout en les

remuant, et principalement le soir et le matin. — Larmolement. — Amblyopie. — Odontalgie déchirante, tressaillante, aggravée par les choses chaudes. — Accumulation de salive aqueuse dans la bouche. — Parole embarrassée, comme par gonflement de la langue. — Sensation brûlante dans le gosier.

ESTOMAC. — Goût métallique, tantôt douceâtre, tantôt acidulé, sur et sous la langue. — Goût trop peu prononcé de tous les aliments. — Indifférence excessive pour les aliments, les boissons et le tabac à fumer. — Boulimie à midi et le soir, quelquefois pendant les frissons fébriles. — Pression dans le scrobicule pendant une tension d'esprit.

VENTRE. — Pincement dans le ventre par un courant d'air. — Borborygmes bruyants et grondement dans le ventre. — Colique flatulente, pressive, avec pincements et ballonnement du ventre. — Sensation de dilatation de l'anneau inguinal, comme pour une descente, avec sensibilité douloureuse de cette partie, chaque fois que l'on tousse.

SELLES. — *Selles molles*, diarrhéiques, précédées de tranchées. — Évacuation d'une selle liquide, avec sensation comme si on allait expulser un vent. — Rétrécissement et constriction douloureuse du rectum et de l'anus, qui ne permettent pas d'expulser un vent.

URINES. — **Émission involontaire des urines par paralysie du sphincter de la vessie*, surtout la nuit. — Émission d'urine goutte à goutte, avec torpeur de l'urèthre. — Jet d'urine très-faible. — *Émission fréquente d'urine, la nuit.

PARTIES GÉNITALES. — Forte disposition des parties génitales à l'éjaculation. — **Impuissance, avec disparition subite de toute jouissance au moment de la plus forte exaltation*. — Douleur dans la verge, comme si quelques fibres se déchiraient ou étaient arrachées. — Rétraction douloureuse des testicules, la nuit. — Gonflement des testicules, avec secousses déchirantes et sensation d'étranglement dans ces parties. — *Règles trop hâtives et trop abondantes*. — Métrorrhagie.

POITRINE. — Toux et coryza, avec expectoration de mucosités verdâtres et haleine courte. — Quintes de toux fétide, la nuit, en dormant. — Besoin de respirer profondément, comme des soupirs, avec déglutition involontaire. — Oppression de poitrine, comme si la respiration était tremblante et qu'elle produisit une impression de fraîcheur. — Pression tractive des deux côtés du sternum, avec angoisse de conscience qui ne permet de rester nulle part. — *Battement de cœur violent*. — Battements au cœur; il semble que ce ne soit pas le cœur même qui batte.

TRONC. — Douleur pressive, brûlante dans les reins, pendant le

repos et le mouvement. — Douleur de brisement et de luxation dans les jointures du sacrum et des vertèbres lombaires.

BRAS. — Fourmillement le long du bras, comme de légères secousses. — Tressaillement douloureux et prompt le long du bras. — Pesanteur et lassitude dans les bras. — Gargouillement le long des bras et des veines du bras. — Fourmillement et battement dans le bout des doigts. — **Panaris*.

JAMBES. — Battement tressaillant dans les tendons du jarret, avec contraction des jambes, surtout pendant le mouvement. — Déchirement pressif dans les rotules. — Battement dans les muscles des pieds, après avoir marché. — Fléchissement des genoux pendant le mouvement. — Luxation facile de l'articulation du pied, en faisant un faux pas. — Sensibilité et douleur de plaie, à l'ongle du gros orteil. — *Les ongles des orteils entrent dans les chairs. — °*Varices*.

TABLE DES MATIÈRES.

AVERTISSEMENT SUR CETTE CINQUIÈME ÉDITION.	I
TABLES ET EXPLICATIONS.	VI
I. TABLE DES MÉDICAMENTS.	VI
II. ORDRE DANS LEQUEL ON POURRA ÉTUDIER LES MÉDICAMENTS	IX
III. DISTRIBUTION DES MATIÈRES DANS L'EXPOSITION DE LA PATHOGÉNÉSIE DES MÉDICAMENTS.	X
IV. EXPLICATION DE QUELQUES EXPRESSIONS.	XII
V. EXPLICATION DES SIGNES.	XV
INTRODUCTION.	4
I. BUT ET COMPOSITION DE L'OUVRAGE.	4
II. SUR LES SYMPTÔMES QUI S'Y TROUVENT.	2
III. SUR LES AVIS CLINIQUES EN TÊTE DES MÉDICAMENTS.	4
IV. SUR LES DOSES USITÉES.	6
V. DE LA RÉPÉTITION DES DOSES.	7
VI. DE LA DURÉE DE L'ACTION DES MÉDICAMENTS.	40
VII. DES MÉDICAMENTS ANALOGUES.	42
VIII. SUR LE CONTENU DE CET OUVRAGE EN GÉNÉRAL.	43
IX. SUR LA MANIÈRE DE SE SERVIR DE CE MANUEL.	45

A) — MÉDICAMENTS SUIVANT LES NOMS LATINS.

1. <i>Aconitum napellus</i> , Aconit napel.	47
2. <i>Æthusa cynapium</i> , Ciguë des jardins, petite Ciguë.	24
3. <i>Actæa spicata</i> , Christophoriane.	25
4. <i>Agaricus muscarius</i> , Agaric, Oronge fausse, Champignon rouge.	25

5. <i>Agnus castus</i> , Gatilier commun.	29
6. <i>Aloes gummi</i> , Aloès.	34
7. <i>Alumina</i> ; <i>Argilla</i> , Alumine, Argile.	34
8. <i>Ambra grisea</i> , Ambre gris.	37
9. <i>Ammoniacum</i> , <i>Gummi ammoniacum</i> , Ammoniaque. . .	42
10. <i>Ammonium carbonicum</i> , Sous-carbonate d'ammoniaque, Sel volatil d'Angleterre.	44
11. <i>Ammonium causticum</i> , Ammoniaque caustique. . . .	50
12. <i>Ammonium muriaticum</i> , Muriate d'ammoniaque, Sel ammoniac.	54
13. <i>Anacardium orientale</i> , Fève de Malac.	54
* <i>Anemone pratensis</i> , Voy. <i>Pulsatilla</i> .	
14. <i>Angustura</i> , Angusture vraie, Écorce du <i>Cusparia febrifuga</i> ou <i>Bonplandia trifoliata</i>	58
15. <i>Angustura spuria</i> , Fausse angusture.	64
16. <i>Anisum stellatum</i> , Anis.	62
17. <i>Anihrokokali</i>	62
18. <i>Antimonium crudum</i> , Antimoine cru, Sulfure d'antimoine.	63
* <i>Antimonium tartaricum</i> , Voy. <i>Tartarus emeticus</i> .	
19. <i>Argentum</i> , Argent.	67
* <i>Argilla</i> , Voy. <i>Alumina</i> .	
20. <i>Argentum nitricum</i> , Nitrate d'argent.	70
21. <i>Arnica montana</i> , Arnica des montagnes.	74
22. <i>Arsenicum album</i> , Arsenic.	76
23. <i>Arsenicum citrinum</i> , Arsenic jaune de citron, Or pigment.	86
* <i>Artemisia judaica</i> , Voy. <i>Cina</i> .	
24. <i>Artemisia vulgaris</i> , Armoise commune.	87
25. <i>Arum maculatum</i> , Pied-de-veau.	87
26. <i>Asa fœtida</i> , Gomme-résine de fêrula.	87
27. <i>Asarum europæum</i> , Asaret d'Europe, Oreille-d'homme.	90
28. <i>Asparagus</i> , Asperge.	93
29. <i>Athamantia</i> , <i>Oreoselinum</i>	95
* <i>Atropa Belladonna</i> , Voy. <i>Belladonna</i> .	
30. <i>Aurum foliatum</i> , Or métallique.	96
31. <i>Aurum fulminans</i> , Or fulminant.	104
32. <i>Aurum muriaticum</i> , Muriate d'or.	104
33. <i>Aurum sulfuricum</i> , Sulfate d'or.	104
34. <i>Baryta carbonica</i> , Carbonate de baryte.	106
35. <i>Baryta muriatica</i> , Muriate de baryte.	111
36. <i>Belladonna</i> , <i>Atropa belladonna</i> , Belladonne, Morelle furieuse.	112
37. <i>Berberis vulgaris</i> , Épine-vinette.	124
38. <i>Bismuthum</i> , <i>Bismuthi magisterium</i> , Bismuth. . . .	130

39. <i>Borax veneta</i> , Sous-borate de soude.	434
40. <i>Bovista</i> , Boviste, Vesce-de-loup des bouviers.	436
41. <i>Bromum</i> , Brome.	439
42. <i>Brucea antidysenterica</i> , Fausse angusture.	446
43. <i>Bryonia alba</i> , Bryone.	447
44. <i>Caladium seguinum</i> , Pédiveau vénéneux.	456
45. <i>Calcarea carbonica</i> , Carbonate de chaux, Écaille d'huitre.	458
46. <i>Calcarea phosphorata</i> , Phosphate de chaux.	469
47. <i>Camphora</i> , Camphre.	472
48. <i>Cannabis sativa</i> , Chanvre cultivé.	475
49. <i>Cantharis</i> , Cantharide.	479
50. <i>Capiscum annuum</i> , Poivre de Cayenne.	483
51. <i>Carbo animalis</i> , Charbon animal.	486
52. <i>Carbo vegetabilis</i> , Charbon végétal.	489
53. <i>Cascarilla</i> , <i>Croton cascarilla</i> , Cascarille.	496
54. <i>Castoreum</i> , Castoréum.	497
55. <i>Causticum</i> , Causticum.	498
56. <i>Chamomilla vulgaris</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , Camomille commune, Matricaire camomille.	205
57. <i>Chelidonium majus</i> , Grande Chélidoine.	244
58. <i>Chenopodium glaucum</i>	243
59. <i>China</i> , <i>Cinchona officinalis</i> , Quinquina.	245
60. <i>Chininum sulfuricum</i> , Sulfate de Quinine.	223
61. <i>Chlorum</i> , Chlore.	234
62. <i>Cicuta virosa</i> , <i>Cicutaria aquatica</i> , Ciguë d'eau.	234
63. <i>Cimex lectularius</i> , Punaise de lit.	237
64. <i>Cina</i> , <i>Artemisia judaica</i> , <i>Semen-contra</i> , Armoise de Judée.	240
65. <i>Cinnabaris</i> , Sulfure rouge de mercure.	243
66. <i>Cinnamomum</i> , Cannelle.	244
67. <i>Cistus canadensis</i> , Ciste hélanthème.	244
68. <i>Citricum acidum</i> , Acide citrique.	246
69. <i>Clematis erecta</i> , Clématite droite.	246
70. <i>Coccinella septempunctata</i>	249
71. <i>Cocculus</i> , Coque du Levant.	249
72. <i>Cochlearia amoracia</i>	254
73. <i>Coffea cruda</i> , Café cru.	255
74. <i>Colchicum autumnale</i> , Colchique d'automne.	257
75. <i>Colocynthis</i> , Coloquinte.	260
76. <i>Conium maculatum</i> , Grande ciguë.	263
77. <i>Convolvulus arvensis</i> , Liseron des champs.	270
78. <i>Copaiva Balsamum</i> , Baume de Copahu.	270
79. <i>Corallia rubra</i> , Corail rouge.	274
80. <i>Crocus sativus</i> , Safran cultivé.	272

* <i>Croton cascarella</i> , Voy. <i>Cascarilla</i> .	
81.	<i>Croton tiglium</i> , Huile de croton. 275
82.	<i>Cubebæ</i> , Cubèbes. 284
83.	<i>Cuprum metallicum</i> , Cuivre. 284
84.	<i>Cuprum aceticum</i> , Acétate de cuivre. 288
85.	<i>Cuprum carbonicum</i> , Carbonate de cuivre. 289
86.	<i>Cuprum sulfuricum</i> , Sulfate de cuivre. 290
87.	<i>Cyclamen europæum</i> , Cyclame d'Europe, Pain de Pour- ceaux. 290
88.	<i>Daphne indica</i> , Daphné des Indes. 290
* <i>Daphne mezereum</i> , Voy. <i>Mezereum</i> .	
* <i>Datura stramonium</i> , Voy. <i>Stramonium</i> .	
89.	<i>Diadema aranea</i> , Araignée à croix papale. 295
90.	<i>Digitalis purpurea</i> , Digitale pourprée. 296
91.	<i>Drosera rotundifolia</i> , Drosère à feuilles rondes, Rosée du soleil. 300
92.	<i>Dulcamara</i> , Douce-amère. 303
93.	<i>Electricitas</i> , Électricité. 306
94.	<i>Eugenia iambos</i> , Eugénie jame-rose, Jame-rosade. 344
95.	<i>Euphorbium officinalis</i> , Euphorbe officinal. 342
96.	<i>Euphrasia officinalis</i> , Euphrase officinale. 344
97.	<i>Evonymus europæus</i> , Bonnet-de-Prêtre. 347
98.	<i>Ferrum metallicum</i> , Fer métallique. 349
* <i>Ferrum chloricum</i> , Voy. <i>Ferrum muriaticum</i> .	
99.	<i>Ferrum magneticum</i> , Deutoxyde de fer, Pierre magné- tique. 322
100.	<i>Ferrum muriaticum</i> , Hydrochlorate de fer. 325
101.	<i>Filix mas</i> , Fougère mâle. 325
102.	<i>Fluoris Acidum</i> , Acide fluorique. 326
103.	<i>Fragaria vesca</i> , Fraisier. 334
104.	<i>Galvanismus</i> , Galvanisme. 334
105.	<i>Gentiana lutea</i> , Gentiane jaune. 337
106.	<i>Ginseng</i> , Ginseng. 339
107.	<i>Granatum</i> , Écorce de la racine du grenadier. 342
108.	<i>Graphites</i> , Mine de plomb, Graphite. 346
109.	<i>Gratiola officinalis</i> , Gratiolle. 352
110.	<i>Guaiacum officinale</i> , Résine de Gaïac. 354
111.	<i>Hæmatoxyllum campechianum</i> , Bois de Campêche. 356
112.	<i>Helleborus niger</i> , Ellébore noir. 358
113.	<i>Hepar sulfuris calcareum</i> , Foie de soufre. 364
114.	<i>Heracleum spondilium</i> , Branche-ursine. 366
115.	<i>Hydrocyani acidum</i> , Acide prussique. 367
116.	<i>Hyoscyamus niger</i> , Jusquiame. 370
117.	<i>Ialappa</i> , Jalap. 374

418.	<i>Iatropa curcas</i> , Figue infernale.	374
419.	<i>Ignatia amara</i> , Fève de Saint-Ignace.	375
420.	<i>Indigo</i> , Indigo.	384
421.	<i>Iodium</i> , Iode.	382
422.	<i>Ipecacuanha</i> , Ipécacuanha.	386
423.	<i>Kali carbonicum</i> , Sous-carbonate de potasse, Sel de tartre.	389
424.	<i>Kali chloricum</i> , Chlorure de potasse.	396
425.	<i>Kali hydriodicum</i> , Hydriodate de potasse.	398
	* <i>Kali nitricum</i> , Voy. <i>Nitrum</i> .	
	* <i>Krameria triandra</i> , Voy. <i>Ratanhia</i> .	
426.	<i>Kreosotum</i> , Kréosote.	399
427.	<i>Lachesis</i> , Trigonocéphale à losanges.	405
428.	<i>Lactuca virosa</i> , Laitue vireuse.	417
429.	<i>Lamium album</i> , Ortie blanche.	428
430.	<i>Laurocerasus</i> , Laurier-cerise.	429
431.	<i>Ledum palustre</i> , Romarin sauvage.	434
432.	<i>Lobelia inflata</i> , Lobélie inflata.	435
433.	<i>Lycopodium clavatum</i> , Lycopode, Pied-de-loup.	438
434.	<i>Magnesia carbonica</i> , Magnésie.	448
435.	<i>Magnesia muriatica</i> , Muriate de Magnésie.	452
436.	<i>Magnesia sulfurica</i> , Sulfate de Magnésie, Sel d'Epsom.	456
437.	<i>Manganum</i> , Manganèse.	458
438.	<i>Menyanthes trifoliata</i> , Trèfle d'eau.	462
439.	<i>Mephitis putorius</i> , Suc fétide du putois.	463
440.	<i>Mercurius</i> , Mercure.	466
441.	<i>Mercurius acetatus</i> , Acétate de mercure.	477
442.	<i>Mercurius sublimatus s. corrosivus</i> , Sublimé corrosif, Deuto-chlorure de mercure.	478
443.	<i>Mercurius dulcis</i> , Calomel.	479
444.	<i>Mercurialis perennis</i> , Mercuriale vivace.	479
445.	<i>Mezereum</i> , Mézéréon, Bois-gentil.	484
446.	<i>Millefolium</i> , Millefeuille.	488
447.	<i>Morphium acidum</i> , Acétate de morphine.	489
448.	<i>Moschus</i> , Musc.	492
449.	<i>Murex purpureus</i> , Murex à pourpre.	495
	* <i>Murias magnesiae</i> , Voy. <i>Magnesia muriatica</i> .	
450.	<i>Muriatis acidum</i> , Acide muriatique.	497
451.	<i>Natrum carbonicum</i> , Sous-carbonate de soude.	500
452.	<i>Natrum muriaticum</i> , Muriate de soude, Sel commun.	505
453.	<i>Natrum nitricum</i> , Nitrate de soude.	513
454.	<i>Natrum sulfuricum</i> , Sulfate de soude, Sel de Glauber.	513
455.	<i>Niccolum carbonicum</i> , Nickel.	516
456.	<i>Nitrum</i> , <i>Kali nitricum</i> , Nitre, Nitrate de potasse.	518

457.	<i>Nitri acidum</i> , Acide nitrique.	524
458.	<i>Nitri spiritus dulcis</i> , Ether nitrique.	528
459.	<i>Nux juglans</i> , Noix du noyer.	529
460.	<i>Nux moschata</i> , Noix muscade.	532
464.	<i>Nux vomica</i> , Noix vomique.	536
462.	<i>Oleander</i> , Laurier-rose.	554
463.	<i>Oleum animale</i> , Huile animale de Dippel.	554
464.	<i>Oleum jecoris morrhuae</i> , Huile de foie de morue.	557
465.	<i>Oniscus asellus</i> , Cloporte.	557
466.	<i>Opium</i> , Opium.	558
467.	<i>Pæonia</i> , Pivoine.	562
468.	<i>Paris quadrifolia</i> , Parisette à quatre feuilles, Raisin de renard.	562
469.	<i>Petroleum</i> , Huile de pétrole.	565
470.	<i>Petroselinum</i> , Persil.	570
474.	<i>Phellandrium aquaticum</i> , Phellandre aquatique, Fe- nouil d'eau, Ciguë aquatique.	570
472.	<i>Phosphorus</i> , Phosphore.	572
473.	<i>Phosphori acidum</i> , Acide phosphorique.	582
474.	<i>Pinus silvestris</i> , Pin sauvage.	587
475.	<i>Platina</i> , Platine.	587
476.	<i>Plumbum</i> , Plomb.	593
477.	<i>Pothos fætida</i> , Pothos.	597
478.	<i>Prunus spinosa</i> , Prunier épineux, Prunellier, Épine noire.	598
479.	<i>Pulsatilla nigricans</i> , <i>Anemone pratensis</i> , Anémone des prés, Pulsatille noirâtre, Coquelourde.	600
480.	<i>Ranunculus acris</i> , Renoncule âcre.	613
484.	<i>Ranunculus bulbosus</i> , Renoncule bulbeuse.	613
482.	<i>Ranunculus flammula</i> , Fétide douce.	616
483.	<i>Ranunculus repens</i> , Renoncule rampante.	617
484.	<i>Ranunculus sceleratus</i> , Renoncule scélérate.	617
485.	<i>Raphanus sativus</i> , Rave.	620
486.	<i>Ratanhia</i> , <i>Krameria triandria</i> , <i>Krameria</i> à trois éta- mines.	623
487.	<i>Rhabarbarum</i> , <i>Rheum</i> , Rhubarbe.	625
	* <i>Rheum</i> , Voy. <i>Rhabarbarum</i> .	
488.	<i>Rhododendron chrysanthum</i> , Rosage à fleurs blanches.	627
489.	<i>Rhus toxicodendron</i> , Arbre à poison, Sumac vénéneux.	634
490.	<i>Rhus vernia</i> , Vernis de Chine.	640
494.	<i>Ruta graveolens</i> , Rue des jardins.	641
492.	<i>Sabadilla</i> , Sévadille.	645
493.	<i>Sabina</i> , Sabine.	649
494.	<i>Sambucus nigra</i> , Sureau.	652

495. <i>Sanguinaria canadensis</i> , Salicaire du Canada.	655
496. <i>Sapo domesticus</i> , Savon de ménage.	660
497. <i>Sassaparilla</i> , Salsepareille.	660
498. <i>Scrophularia nodosa</i> , Grande scrofulaire.	664
499. <i>Secale cornutum</i> , Seigle ergoté.	665
200. <i>Selenium</i> , Sélénium.	668
201. <i>Senega</i> , <i>Polygala Senega</i> , Polygale de Virginie.	674
202. <i>Senna</i> , Séné.	674
203. <i>Sepia</i> , Sépia.	675
204. <i>Silicea</i> , Silice.	684
205. <i>Solanum lycopersicum</i> , Pomme d'amour.	693
206. <i>Solanum mammosum</i> , <i>Solanum mammiforme</i>	694
207. <i>Solanum nigrum</i> , Morelle noire.	694
208. <i>Spigelia</i> , Spigélie anthelmintique, Poudre aux vers.	694
209. <i>Spongia tosta</i> , Éponge brûlée.	699
210. <i>Squilla maritima</i> , Scille maritime.	703
211. <i>Stannum</i> , Étain.	705
212. <i>Staphysagria</i> , Staphysaigre.	740
213. <i>Stramonium</i> , <i>Datura Stramonium</i> , Pomme épineuse.	746
214. <i>Strontiana</i> , Strontiane.	720
215. <i>Sulfur</i> , Soufre.	722
216. <i>Sulfuris acidum</i> , Acide sulfurique.	737
217. <i>Tabacum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , Tabac.	744
218. <i>Tanacetum vulgare</i> , Tanaisie commune.	744
219. <i>Taraxacum</i> , <i>Leontodon Taraxacum</i> , Pissenlit, Dent-de-lion.	745
220. <i>Tartarus emeticus</i> , <i>Antimonium</i> , <i>Tartaricum</i> , <i>Tartarus stibiatus</i> , Tartre émétique ou stibié.	747
221. <i>Tartari acidum</i> , Acide tartrique.	754
222. <i>Taxus baccata</i> , If.	754
223. <i>Terebinthina</i> , Térébenthine.	753
224. <i>Teucrium marum verum</i> , Germandrée maritime.	755
225. <i>Thea cæsarea</i> , Thé de Chine.	757
226. <i>Theridion curassavicum</i> , Thérédion.	757
227. <i>Thuia occidentalis</i> , Thuia du Canada.	759
228. <i>Tongo</i> , Fève de Tonkin.	765
229. <i>Urtica urens</i> , Ortie grièche.	766
230. <i>Uva ursi</i> , <i>Arbutus uva ursi</i> , Raisin d'ours.	766
231. <i>Valeriana officinalis</i> , Valériane officinale.	766
232. <i>Veratrum album</i> , Ellébore blanc.	769
233. <i>Verbascum thapsus</i> , Bouillon-blanc.	777
234. <i>Vinca minor</i> , Méon.	779
235. <i>Viola odorata</i> , Violette de Mars.	779
236. <i>Viola tricolor</i> , Pensée.	780

Vitex agnus castus, Voy. *Agnus castus*.

237. <i>Zincum</i> , Zinc.	782
238. <i>Zincum oxydatum</i> , Oxyde de zinc.	788
239. <i>Zincum sulfuricum</i> , Sulfate de zinc.	794
240. <i>Zingiber</i> , Gingembre.	794
244. <i>Magnes artificialis</i> , Aimant artificiel, Barre aimantée.	794
A. — <i>Magnetis Poli ambo</i>	792
B. — <i>Magnetis Polus arcticus</i>	794
C. — <i>Magnetis Polus australis</i>	797

B) — MÉDICAMENTS SUIVANT LES NOMS FRANÇAIS.

Acétate de cuivre, <i>Cuprum aceticum</i>	288
Acétate de morphine, <i>Morphium aceticum</i>	489
Acétate de mercure, <i>Mercurius acetatus</i>	477
Acide citrique, <i>Citri acidum</i>	246
Acide fluorique, <i>Fluoris acidum</i>	326
Acide muriatique, <i>Muriatis acidum</i>	497
Acide nitrique, <i>Nitri acidum</i>	524
Acide phosphorique, <i>Phosphori acidum</i>	582
Acide sulfurique, <i>Sulfuris acidum</i>	737
Acide tartrique, <i>Tartari acidum</i>	754
Aconit napel, <i>Aconitum napellus</i>	47
Agaric, Orange fausse, <i>Agaricus muscarius</i>	25
Aimant, <i>Magnes artificialis</i>	794
Aloès, <i>Aloes gummi</i>	34
Alumine, Argile, <i>Alumina</i> , <i>Argilla</i>	34
Ambre gris, <i>Ambra grisea</i>	37
Ammoniaque, <i>Ammoniacum</i> , <i>Gummi ammoniacum</i>	42
Ammoniaque caustique, <i>Ammoniacum causticum</i>	50
Anémone des prés, Pulsatille noirâtre, Coquelourde, <i>Anemone pratensis</i> , <i>Pulsatilla nigricans</i>	600
Angusture (fausse), <i>Angustura spuria</i>	64
Angusture (fausse), <i>Brucea antidiysenterica</i>	446
Angusture vraie, Écorce du <i>Cusparia febrifuga</i> , ou du <i>Bonplandia trifoliata</i> , <i>Angusturæ cortex</i>	58
Anis, <i>Anisum stellatum</i>	62
Antimoine cru, Sulfure d'antimoine, <i>Antimonium crudum</i>	63
Araignée diadème, ou à croix papale, <i>Diadema Aranea</i>	295
Arbre à poison, Sumac vénéneux, <i>Rhus toxicodendron</i>	634
Argent, <i>Argentum foliatum</i>	67
Argile, Alumine, <i>Argilla</i> , <i>Alumina</i>	34
Armoise de Judée, <i>Artemisia judaica</i> , <i>Cina</i> , <i>Semen-contra</i>	240

Arnica des montagnes, <i>Arnica montana</i>	74
Arsenic, <i>Arsenicum album</i>	76
Arsenic jaune de citron, Or pigment, <i>Arsenicum citrinum</i>	86
Asaret d'Europe, Oreille-d'homme, <i>Asarum europæum</i>	90
Asperge, <i>Asparagus</i>	93
Baume de Copahu, <i>Copaivæ Balsamum</i>	270
Belladonne, Morelle furieuse, <i>Belladonna</i> , <i>Atropa belladonna</i>	412
Bismuth, <i>Bismuthum</i> , <i>Bismuthi magisterium</i>	430
Bois de Campêche, <i>Hæmatoxylum campechianum</i>	356
Bois-gentil, Mézéréon, <i>Daphne Mezereum</i>	484
Bonnet-de-prêtre, <i>Evonymus europæus</i>	347
Borate de soude, <i>Borax veneta</i>	434
Bouillon-blanc, <i>Verbascum thapsus</i>	777
Boviste, Vesce-de-loup des bouviers, <i>Bovista lycoperdon</i>	436
Branche-ursine, <i>Heracleum spondylium</i>	366
Brome, <i>Bromum</i>	439
Bryone, <i>Bryonia alba</i>	447
Café cru, <i>Coffea cruda</i>	255
Calomel, <i>Mercurius dulcis</i>	479
Camomille commune, Matricaire Camomille, <i>Chamomilla vul-</i> <i>garis</i>	205
Campêche (bois de), <i>Hæmatoxylum campechianum</i>	356
Camphre, <i>Camphora</i>	472
Cannelle, <i>Cinnamomum</i>	244
Cantharide, <i>Cantharis</i> , <i>Meloe vesicatorius</i>	479
Carbonate (sous-) d'ammoniaque, Sel volatil d'Angleterre, <i>Ammonium carbonicum</i>	44
Carbonate de baryte, <i>Baryta carbonica</i>	406
Carbonate de chaux, <i>Calcarea carbonica</i>	458
Carbonate de cuivre, <i>Cuprum carbonicum</i>	289
Carbonate (sous-) de potasse, Sel de tartre, <i>Kali carbonicum</i>	389
Carbonate (Sous-) de soude, <i>Natrum carbonicum</i>	500
Cascarille, <i>Cascarilla</i> , <i>Croton cascarilla</i>	496
Castoréum, <i>Castoreum</i>	497
Causticum, <i>Causticum</i>	498
Champignon rouge, Oronge fausse, <i>Agaricus muscarius</i>	25
Chanvre cultivé, <i>Cannabis sativa</i>	475
Charbon animal, <i>Carbo animalis</i>	486
Charbon végétal, <i>Carbo vegetabilis</i>	489
Chélidoine (grande), <i>Chelidonium majus</i>	204
Chlorure de fer, Muriate de fer, <i>Ferrum muriaticum s. chlo-</i> <i>raturum</i>	325
Chlorure (deuto-) de mercure, Sublimé corrosif, <i>Mercurius su-</i> <i>blimatus corrosivus</i>	478

Chlorure de potasse, <i>Kali chloricum</i>	396
Christophoriane, <i>Actæa spicata</i>	396
Ciguë aquatique, Fenouil d'eau, Phellandre aquatique, <i>Phellandrium aquaticum</i>	570
Ciguë d'eau, <i>Cicuta virosa</i> , <i>Cicuta aquatica</i>	234
Ciguë (grande), <i>Conium maculatum</i>	263
Ciguë des jardins, Petite Ciguë, <i>Æthusa Cynopium</i>	24
Ciste hélianthème, <i>Cistus canadensis</i>	244
Clématite droite, <i>Clematis erecta</i>	246
Cloporte, <i>Oniscus asellus</i>	557
Colchique d'automne, <i>Colchicum autumnale</i>	257
Coloquinte, <i>Colocynthis</i>	260
Copahu (baume de), <i>Copaiva balsamum</i>	270
Coque du Levant, <i>Cocculus</i>	249
Coquelourde, Pulsatille noirâtre, Anémone des prés, <i>Pulsatilla nigricans</i> , <i>Anemone pratensis</i>	600
Corail rouge, <i>Corallia rubra</i>	274
Croton (huile de), <i>Croton tiglium</i>	275
Cubèbes, <i>Cubebæ</i>	284
Cuivre, <i>Cuprum metallicum</i>	284
Cyclame d'Europe, Pain de pourceaux, <i>Cyclamen europæum</i>	290
Daphné des Indes, <i>Daphne indica</i>	292
Datura, Pomme épineuse, <i>Stramonium datura</i>	716
Dent-de-lion, Pissenlit, <i>Taraxacum leontodon</i>	745
Deuto-chlorure de Mercure, Sublimé corrosif, <i>Mercurius (sublimatus) corrosivus</i>	478
Deutoxyde de fer, Pierre magnétique, <i>Ferrum magneticum</i>	322
Digitale pourprée, <i>Digitalis purpurea</i>	296
Douce-amère, <i>Dulcamara</i>	303
Drosère à feuilles rondes, Rosée du soleil, <i>Drosera rotundifolia</i>	300
Écorce du Cusparia febrifuga (ou Bonplandia trifoliata), Angusture vraie, <i>Angustura</i> , <i>Angustura cortex</i>	58
Écorce de la racine du grenadier, <i>Granatum</i>	342
Électricité, <i>Electricitas</i>	306
Ellébore blanc, <i>Veratrum album</i>	769
Ellébore noir, <i>Helleborus niger</i>	358
Épine noire, Prunier épineux, Prunellier, <i>Prunus spinosa</i>	598
Épine-vinette, <i>Berberis vulgaris</i>	424
Eponge brûlée, <i>Spongia tosta</i>	699
Étain, <i>Stannum</i>	705
Éther nitrique, <i>Nitri spiritus dulcis</i>	528
Eugenia jame-rose, Jame-rosade, <i>Eugenia jambos</i>	344
Euphorbe officinal, <i>Euphorbium officinale</i>	342

Euphrasie officinale, <i>Euphrasia officinalis</i>	344
Fenouil d'eau, Ciguë aquatique, Phellandre aquatique, <i>Phellandrium aquaticum</i>	570
Fer, <i>Ferrum metallicum</i>	348
Férula (Gomme-résine de), <i>Asa foetida</i>	87
Fétide douce, <i>Ranunculus flammula</i>	646
Fève de Malac, <i>Anacardium orientale</i>	54
Fève de Saint-Ignace, <i>Ignatia amara</i>	375
Fève de Tonkin, <i>Tongo</i>	765
Figue infernale, <i>Iatropa curcas</i>	374
Foie de morue (Huile de), <i>Oleum jecoris morrhuae</i>	557
Foie de soufre, <i>Hepar sulfuris calcareum</i>	364
Fougère mâle, <i>Filix mas</i>	325
Fraisier, <i>Fragaria vesca</i>	334
Gaiac (résine de), <i>Guaiacum officinale</i>	354
Galvanisme, <i>Galvanismus</i>	334
Gatilier commun, <i>Vitex agnus castus</i>	28
Gentiane jaune, <i>Gentiana lutea</i>	337
Germandrée maritime, <i>Teucrium marum verum</i>	755
Gingembre, <i>Zingiber</i>	794
Ginseng, <i>Ginseng</i>	339
Gomme-résine de férula, <i>Asa foetida</i>	87
Graphite, Mine de plomb, <i>Graphites</i>	346
Gratiolle, <i>Gratiola officinalis</i>	352
Grenadier (écorce de la racine du), <i>Granatum</i>	342
Hellébore, <i>Voy. Ellébore</i>	
Huile animale de Dippel, <i>Oleum animale</i>	554
Huile de croton, <i>Croton tiglium</i>	275
Huile de foie de morue, <i>Oleum jecoris morrhuae</i>	557
Huile de pétrole, <i>Petroleum</i>	565
Hydriodate de potasse, <i>Kali hydroiodicum</i>	398
Indigo, <i>Indigo</i>	384
Iode, <i>Iodum</i>	382
Ipécacuanha, <i>Ipécacuanha</i>	386
Jalap, <i>Ialappa</i>	374
Jame-rosade, <i>Eugenia jame-rose</i> , <i>Eugenia jambos</i>	344
Jusquiame, <i>Hyoscyamus niger</i>	370
Kramer à trois étamines, <i>Krameria triandria</i> , <i>Ratanhia</i>	623
Kréosote, <i>Kreosotum</i>	399
Laitue vireuse, <i>Lactuca virosa</i>	447
Laurier-cerise, <i>Laurocerasus</i>	429
Laurier-rose, <i>Oleander</i>	551
Liseron des champs, <i>Convolvulus arvensis</i>	270
Lobélie, <i>Lobelia inflata</i>	435

Lycopode, Pied-de-Loup, <i>Lycopodium clavatum</i> .	438
Magnésie, <i>Magnesia carbonica</i> .	448
Manganèse, <i>Manganum</i> .	458
Matricaire-camomille, Camomille commune, <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Chamomilla vulgaris</i> .	205
Méon, Méum, <i>Vinca minor</i> .	779
Mercure, <i>Mercurius</i> .	466
Mercure corrosif ou sublimé, Deuto-chlorure de mercure, <i>Mercurius corrosivus s. sublimatus</i> .	478
Mercuriale vivace, <i>Mercurialis perennis</i> .	479
Mézéréon, Bois-gentil, <i>Daphne Mezereum</i> .	484
Millefeuille, <i>Millefolium</i> .	488
Mine de plomb, Graphite, <i>Graphites</i> .	346
Morelle furieuse, <i>Belladonna</i> , <i>Atropa Belladonna</i> .	412
Morelle noire, <i>Solanum nigrum</i> .	694
Morphine, <i>Morphium aceticum</i> .	489
Morue (huile de foie de), <i>Oleum jecoris morrhuae</i> .	557
Murex à pourpre, <i>Murex purpureus</i> .	495
Muriate d'ammoniaque, Sel ammoniac, <i>Ammonium muriaticum</i> .	51
Muriate de baryte, <i>Baryta muriatica</i> .	444
Muriate de fer, Chlorure de fer, <i>Ferrum chloratum</i> , <i>Ferrum muriaticum</i> .	325
Muriate de Magnésie, <i>Magnesia muriatica</i> .	452
Muriate d'or, <i>Aurum muriaticum</i> .	404
Muriate de soude, Sel de cuisine, <i>Natrum muriaticum</i> .	505
Musc, <i>Moschus</i> .	492
Muscade (noix), <i>Nux moschata</i> .	532
Nickel, <i>Niccolum carbonicum</i> .	546
Nitrate de potasse, Nitre, <i>Kali nitricum</i> , <i>Nitrum</i> .	548
Nitrate de soude, <i>Natrum nitricum</i> .	543
Nitre, Nitrate de potasse, <i>Nitrum</i> , <i>Kali nitricum</i> .	548
Noix commune, <i>Nux juglans</i> .	529
Noix muscade, <i>Nux moschata</i> .	532
Noix vomique, <i>Nux vomica</i> .	536
Opium, <i>Opium</i> .	558
Or, <i>Aurum foliatum</i> .	96
Or fulminant, <i>Aurum fulminans</i> .	404
Or pigment, Arsenic jaune de citron, <i>Arsenicum citrinum</i> .	86
Oreille-d'homme, Asaret d'Europe, <i>Asarum europæum</i> .	90
Oronge fausse, Champignon rouge, Agaric, <i>Agaricus muscarius</i> .	25
Ortie blanche, <i>Lamium album</i> .	428
Ortie grièche, <i>Urtica urens</i> .	766

Oxyde de zinc, <i>Zincum oxydatum</i>	788
Pain de pourceaux, Cyclame d'Europe, <i>Cyclamen europæum</i>	290
Parisette à quatre feuilles, Raisin de renard, <i>Paris quadrifolia</i>	562
Pédiveau vénéneux, <i>Caladium seguinum</i>	456
Pensée, <i>Viola tricolor</i>	780
Persil, <i>Petroselinum</i>	570
Pétrole (huile de), <i>Petroleum</i>	565
Phellandre aquatique, Fenouil d'eau, Ciguë aquatique, <i>Phellandrium aquaticum</i>	570
Phosphate de chaux, <i>Calcareo phosphorica</i>	469
Phosphore, <i>Phosphorus</i>	572
Pied-de-loup, Lycopode, <i>Lycopodium clavatum</i>	438
Pied-de-veau, <i>Arum maculatum</i>	87
Pierre magnétique, Deutoxyde de fer, <i>Ferrum magneticum</i>	322
Pin sauvage, <i>Pinus silvestris</i>	587
Pissenlit, Dent-de-lion, <i>Taraxacum</i> , <i>Leontodon taraxacum</i>	745
Pivoine, <i>Pæonia</i>	562
Platine, <i>Platina</i>	587
Plomb, <i>Plumbum</i>	593
Poivre de Cayenne, <i>Capsicum annum</i>	483
Polygale de Virginie, <i>Senega</i> , <i>Polygala Senega</i>	674
Pomme d'amour, <i>Solanum lycopersicum</i>	693
Pomme épineuse, Stramoine, <i>Stramonium</i> , <i>Datura Stramonium</i>	746
Pothos, <i>Pothos fœtida</i>	597
Poudre aux vers, Spigélie anthelmintique, <i>Spigelia anthelmia</i>	694
Prunellier, Épine noire, Prunier épineux, <i>Prunus spinosa</i>	598
Prunier épineux, Voy. <i>Prunellier</i>	
Pulsatille noirâtre, Anémone des prés, Coquelourde, <i>Pulsatilla nigricans</i> , <i>Anemone pratensis</i>	600
Putois (suc fétide du), <i>Mephitis putorius</i>	463
Quinquina, <i>China</i> , <i>Cinchona officinalis</i>	215
Raisin d'ours, <i>Uva ursi</i>	766
Raisin de renard, Parisette à quatre feuilles, <i>Paris quadrifolia</i>	562
Rave, <i>Raphanus sativus</i>	620
Renoncule bulbeuse, <i>Ranunculus bulbosus</i>	613
Renoncule âcre, <i>Ranunculus acris</i>	613
Renoncule rampante, <i>Ranunculus repens</i>	617
Renoncule scélérate, <i>Ranunculus sceleratus</i>	617
Résine (gomme-) de fêrula, <i>Asa fœtida</i>	87
Résine de gaïac, <i>Guaiacum officinale</i>	354
Rhubarbe, <i>Rhabarbarum</i> , <i>Rheum</i>	625

Romarin sauvage, <i>Ledum palustre</i> .	434
Rosage à fleurs blanches, <i>Rhododendron chrysanthum</i> .	627
Rosée du soleil, Drosère à feuilles rondes, <i>Drosera rotundifolia</i> .	300
Rue des jardins, <i>Ruta graveolens</i> .	644
Sabine, <i>Sabina</i> .	649
Safran cultivé, <i>Crocus sativus</i> .	272
Salsepareille, <i>Sassaparilla</i> .	660
Scille maritime, <i>Squilla maritima</i> .	703
Scrofulaire (Grande), <i>Scrophularia nodosa</i> .	664
Seigle ergoté, <i>Secale cornutum</i> .	665
Sel ammoniac, Muriate d'ammoniaque, <i>Ammonium muriaticum</i> .	54
Sel volatil d'Angleterre, Sous-carbonate d'ammoniaque, <i>Ammonium carbonicum</i> .	44
Sel de cuisine, Muriate de sel, <i>Sal culinare</i> , <i>Natrum muriaticum</i> .	505
Sel d'Epsom, Sulfate de Magnésie, <i>Magnesia sulfurica</i> .	456
Sel de Glauber, Sulfate de soude, <i>Natrum sulfuricum</i> .	513
Sel de tartre, Sous-carbonate de potasse, <i>Kali carbonicum</i> .	389
Sélénium, <i>Selenium</i> .	668
Séné, <i>Senna</i> .	674
Sépiâ, <i>Sepia succus</i> .	675
Sévadille, <i>Sabadilla</i> .	645
Silice, <i>Silicea</i> .	684
Soufre, <i>Sulfur</i> .	722
Sous-carbonate d'ammoniaque, Sel volatil d'Angleterre, <i>Ammonium carbonicum</i> .	44
Sous-carbonate de potasse, Sel de tartre, <i>Kali carbonicum</i> .	389
Sous-carbonate de soude, <i>Natrum carbonicum</i> .	500
Spigélie anthelminthique, Poudre aux vers, <i>Spigelia anthelmia</i> .	694
Staphysaigre, <i>Staphysagria</i> .	710
Strontiane, <i>Strontiana</i> .	720
Sublimé corrosif, Deuto-chlorure de Mercure, <i>Mercurius sublimatus corrosivus</i> .	478
Suc fétide du putois, <i>Mephitis putorius</i> .	463
Sulfate d'or, <i>Aurum sulfuricum</i> .	104
Sulfate de cuivre, <i>Cuprum sulfuricum</i> .	290
Sulfate de Magnésie, Sel d'Epsom, <i>Magnesia sulfurica</i> .	456
Sulfate de quinine, <i>Chininum sulfuricum</i> .	223
Sulfate de soude, Sel de Glauber, <i>Natrum sulfuricum</i> .	513
Sulfate de zinc, <i>Zincum sulfuricum</i> .	794
Sulfure d'antimoine, Antimoine cru, <i>Antimonium crudum</i> .	63
Sulfure rouge de mercure, <i>Cinnabaris</i> .	243

Sumac vénéneux, Arbre à poison, <i>Rhus toxicodendron</i> . . .	634
Sureau, <i>Sambucus nigra</i>	652
Tabac, <i>Tabacum</i> , <i>Nicotiana</i>	744
Tanaisie commune, <i>Tanacetum vulgare</i>	744
Tartre émétique ou stibié, <i>Tartarus emeticus</i> , <i>stibiatus</i> , <i>Antimonium tartaricum</i>	747
Térébenthine, <i>Terebinthina</i>	753
Thé de Chine, <i>Thea cæsarea</i>	757
Théridion, <i>Theridion curassavicum</i>	757
Thuia du Canada, <i>Thuia occidentalis</i>	759
Trèfle d'eau, <i>Menyanthes trifoliata</i>	462
Trigonocéphale à losanges, <i>Lachesis trigonocephalus</i>	405
Valériane officinale, <i>Valeriana officinalis</i>	766
Vernis de Chine, <i>Rhus vernix</i>	640
Vesce-de-loup des bouviers, <i>Bovista Lycoperdon</i>	436
Violettes de Mars, <i>Viola odorata</i>	779
Zinc, <i>Zincum metallicum</i>	782
Zinc oxydé, <i>Zincum oxydatum</i>	788

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DE LA PREMIÈRE PARTIE.

TOMES PREMIER ET DEUXIÈME.

